

**Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын
жишиг сорил-4**

Formatted: Width: 21 cm, Height: 29.7 cm

Сорилын зөв хариулт

1-C, 2-B, 3-B, 4-D, 5-A, 6-A, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A, 11-E, 12-B, 13-D, 14-C, 15-C, 16-B, 17-C, 18-C, 19-E, 20-D, 21-D, 22-E, 23-C, 24-D, 25-A, 26-D, 27-C, 28-B, 29-C, 30-A, 31-E, 32-B, 33-C, 34-C, 35-C, 36-B, 37-C, 38-C, 39-B, 40-B, 41-E, 42-C, 43-B, 44-C, 45-E, 46-C, 47-A, 48-D, 49-D, 50-C, 51-C, 52-C, 53-A, 54-C, 55-A, 56-A, 57-C, 58-B, 59-D, 60-B, 61-E, 62-B, 63-C, 64-C, 65-D, 66-B, 67-D, 68-A, 69-C, 70-A, 71-C, 72-B, 73-C, 74-A, 75-B, 76-E, 77-C, 78-D, 79-A, 80-D, 81-A, 82-B, 83-A, 84-C, 85-D, 86-A, 87-C, 88-C, 89-A, 90-B, 91-D, 92-B, 93-C, 94-D, 95-B, 96-B, 97-C, 98-A, 99-C, 100-B, 101-B, 102-D, 103-E, 104-A, 105-A, 106-E, 107-B, 108-B, 109-C, 110-C, 111-D, 112-D, 113-A, 114-C, 115-D, 116-C, 117-C, 118-A, 119-B, 120-D, 121-D, 122-C, 123-D, 124-C, 125-A, 126-E, 127-D, 128-A, 129-C, 130-B, 131-E, 132-D, 133-E, 134-A, 135-B, 136-D, 137-B, 138-C, 139-D, 140-C, 141-C, 142-B, 143-B, 144-B, 145-A, 146-A, 147-A, 148-E, 149-A, 150-D, 151-B, 152-C, 153-E, 154-A, 155-B, 156-A, 157-E, 158-A, 159-A, 160-B, 161-A, 162-B, 163-A, 164-C, 165-B, 166-D, 167-B, 168-E, 169-C, 170-E, 171-B, 172-C, 173-C, 174-A, 175-B, 176-C, 177-D, 178-C, 179-A, 180-A, 181-E, 182-C, 183-A, 184-B, 185-A, 186-D, 187-A, 188-C, 189-A, 190-C, 191-B, 192-A, 193-E, 194-E, 195-C, 196-C, 197-A, 198-C, 199-A, 200-B, 201-C, 202-B, 203-A, 204-A, 205-B, 206-B, 207-D, 208-D, 209-A, 210-B, 211-C, 212-D, 213-E, 214-D, 215-A, 216-A, 217-C, 218-C, 219-C, 220-C, 221-B, 222-C, 223-A, 224-B, 225-C, 226-C, 227-D, 228-C, 229-A, 230-D, 231-A, 232-A, 233-A, 234-A, 235-C, 236-A, 237-A, 238-A, 239-A, 240-E, 241-B, 242-C, 243-C, 244-E, 245-A, 246-E, 247-B, 248-B, 249-B, 250-E, 251-A, 252-B, 253-C, 254-E, 255-C, 256-D, 257-C, 258-C, 259-A, 260-A, 261-A, 262-A, 263-C, 264-C, 265-A, 266-E, 267-B, 268-C, 269-B, 270-D, 271-E, 272-E, 273-B, 274-B, 275-C, 276-A, 277-B, 278-A, 279-A, 280-C, 281-B, 282-E, 283-C, 284-A, 285-E, 286-B, 287-D, 288-A, 289-B, 290-D, 291-A, 292-A, 293-E, 294-C, 295-B, 296-E, 297-D, 298-C, 299-B, 300-C, 301-E, 302-A, 303-C, 304-C, 305-E, 306-A, 307-D, 308-C, 309-E, 310-D, 311-D, 312-E, 313-E, 314-B, 315-B, 316-C, 317-C, 318-A, 319-E, 320-A, 321-E, 322-C, 323-C, 324-C, 325-D, 326-A, 327-B, 328-D, 329-A, 330-B, 331-E, 332-A, 333-D, 334-D, 335-E, 336-A, 337-B, 338-D, 339-C, 340-A, 341-E, 342-D, 343-E, 344-B, 345-A, 346-E, 347-D, 348-B, 349-A, 350-B, 351-B, 352-C, 353-C, 354-C, 355-E, 356-D, 357-E, 358-C, 359-A, 360-A, 361-A, 362-D, 363-D, 364-E, 365-B, 366-C, 367-A, 368-A, 369-A, 370-C, 371-B, 372-D, 373-D, 374-C, 375-C, 376-B, 377-E, 378-D, 379-D, 380-B, 381-D, 382-B, 383-E, 384-A, 385-B, 386-A, 387-B, 388-A, 389-E, 390-C, 391-A, 392-E, 393-E, 394-D, 395-A, 396-C, 397-C, 398-B, 399-C, 400-E, 401-C, 402-E, 403-C, 404-D, 405-B, 406-A, 407-A, 408-E, 409-C, 410-A, 411-D, 412-E, 413-D, 414-A, 415-E, 416-C, 417-A, 418-A, 419-C, 420-C, 421-D, 422-B, 423-C, 424-E, 425-C, 426-A, 427-A, 428-B, 429-A, 430-C, 431-A, 432-C, 433-E, 434-E, 435-A, 436-C, 437-D, 438-A, 439-D, 440-D, 441-E, 442-D, 443-A, 444-C, 445-A, 446-A, 447-E, 448-C, 449-A, 450-B, 451-C, 452-E, 453-C, 454-D, 455-C, 456-A, 457-A, 458-A, 459-D, 460-C, 461-C, 462-C, 463-D, 464-D, 465-D, 466-E, 467-E, 468-E, 469-C, 470-E, 471-A, 472-E, 473-B, 474-C, 475-A, 476-A, 477-D, 478-A, 479-C, 480-A, 481-C, 482-C, 483-B, 484-E, 485-B, 486-A, 487-B, 488-B, 489-A, 490-C, 491-E, 492-C, 493-B, 494-A, 495-D, 496-B, 497-B, 498-E, 499-E, 500-A,

Нэг сонголттой тест (Зөвхөн 1 хариулт зөв байх) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.

/1./ Шинжилгээгээр бодисын үндсэн солилцоо +10, изотопоор бамбайд иодын хуриатлал 2 цагт 5-10%, 24 цагт 25-30%, цусны плазм дахь иод уургийн холбоо 3-5 мкг % байжээ. Бамбайн хэддүгээр зэрэглэл вэ?

- A. А. Озэрэг
- B. В. 1-р зэрэг
- C. С. 2-р зэрэг
- D. D. 3-р зэрэг
- E. E. 4-р зэрэг

/2./ Гэнэт өвдөлтийн дараагаар шарласан, элэг бага зэрэгтоморсон, цэсний хүүдий үл мэдрэгдэнэ, шээс хар хүрэн өнгөтэй, баас цайвар, билирубин бага нэмэгдсэн тохиолдолд ямар төрлийн шарлалтанд тохирох вэ?

- A. Цуллагын
- B. Бэглөрөлтийн
- C. Цусны
- D. Цус сэлбэсний
- E. Хавсарсан

/3./ Паразозфагеал ивэрхийн талаар ямар ойлголт буруу вэ?

- A. Амь насанд аюултай байж болно.
- B. Өвчүүний цаана хорсож их өвдөх
- C. Уг өвчин гэдэсний түгжрэлийг үүсгэнэ.
- D. Ходоодны хавчигдсан хэсэг цоорч, үжжил үүсгэж болно.
- E. Хэвтээ байдалд өвдөлт нэмэгдэнэ.

/4./ Кроны өвчтэй гэдсэндээ уруул хэлбэрийн бүрэн цоорхойтой 42 настай өвчтөнийг эмчлэх оновчтой аргыг заана уу?

- A. Колченоговын бэглэгчөөр цоорхойг бэглэх
- B. Сорогчийг хэрэглэх
- C. Эмийн эмчилгээ хийж, гуурсаар хооллох
- D. Цоорсон гэдэсний хэсгийг тайрч, гэдэсийг хооронд нь залгах
- E. Мельниковын аргаар гэдэсний 3/4-ийг тайрч цоорхойг оёх

/5./ Химиин түлэгдэл авсан улаан хоолой, ходоодонд гуурс тавих нь:

- A. Заавал тавина.
- B. Тодорхой хугацааны дараа тавина.
- C. Зөвхөн хүчилд түлэгдвэл тавина.
- D. Зөвхөн шүлтэнд түлэгдвэл тавина.
- E. Гуурставихыгхорилно.

/6./ Элэгний паразитын бус гаралтай элбэг тохиолддог уйланхай нь аль вэ?

- A. Төрөлхийн жинхэнэ уйланхай
- B. Хуурамч уйланхай
- C. Өвөрмөц
- D. Терөлжсөн гемангииом.
- E. Өвөрмөц бус

/7./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед өрөнхий унтуулга хийх аргын онцлог

- A. Уушгийг хиймэл амьсгалд түргэн шилжүүлэх
- B. Цээжний хөндийд урьдчилан гуурс тавих
- C. Судсаар наркоз хийх
- D. Хэсэг газрын мэдээг алдуулан, хагалгаа хийх
- E. Нугасны мэдээ алдуулт хийх

/8./ Хоёр хавтаст хавхлагын дутагдлын үеийн мэс заслын заалт:

- A. Дан агшилтын шуугиан
- B. Их ачааллын үед амьсгаадах
- C. Бага зэргийн ачааллын үед амьсгаадах, зүрхний оройд шуугиантай

/9./ Спонтанный пневмотораксыг оношлоход ямар шинжилгээ хэрэглэх вэ?

- A. Ирригоскопи
- B. Цээж гэрэлд харах
- C. Медиастеноскопи
- D. Торакотоми
- E. Лапароскопи

/10./ Голчийн үрэвсэл /медиастенит/ үүсэх гол шалтгаан нь юу вэ?

- A. Эрүү нүүрний идээт өвчин
- B. Улаан хоолойн хураагуур судас өргөсөх
- C. Ангиографи хийснээс
- D. Бамбай булчирхайн үрэвсэл
- E. Элэг цөсний замын идээт өвчин

/11./ Цочмог /стрессийн/ цоорсон шархлааны гол шинж тэмдэг нь аль вэ?

- A. Цоорсон нүхний хэлбэр дугуй
- B. Цоорсон нүхний хэлбэр жигд бус
- C. Цоорсон нүхний зах нь зөвлөрсөн
- D. Цоорсон нүхний зах нь хатуу
- E. Цоорсон нүхний зах нь зөвлөн дугуй хэлбэртэй

/12./ Холевын хүчлийн бэлдмэлийг хэрэглэж дууссаны дараа хэдий хугацаанд цөсний чулууны өвчин сэдэрч болохыг заана уу.

- A. Жилийн дараа
- B. 2-3 жилийн дараа
- C. 3-5 жилийн дараа
- D. 5-10 жилийндараа
- E. Огт сэдрэхгүй

/13./ Хэвлийн гялтантас/перитонит/-ын эхний шатны гол шинж нь аль вэ?

- A.. Хэвлийгээр байнгын маш хүчтэй өвдөх
- B. Тасралтгүйгээр бөөлжиж огиулах
- C. Доош суулгах
- D. Шеткина -Блюмберга шинж илрэх
- E. Өвчтөн тайван бус байх

/14./ Уушиг гэмтсэн цээжний битүү бэртэлтийн үед хийгдэх илүү тохиромжтой эмчилгээг заана уу?

- A. Эмийн эмчилгээ
- B. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- C. Яаралтай мэс засалд орох
- D. Өвчтөн зохиомол амьсгалд авах
- E. Ажиглалт

/15./ Папиллотомийг хаана хийх вэ?

- A.. 10;4 цагдээр
- B. 11 ;5 цагдээр
- C. 6;12 цагдээр
- D. 7;13 цагдээр
- E. 8;14 цагдээр

/16./ Зангилаа хэлбэртэй эутиреоидын бахлуур нь далд "лабораторийн" гипотериозтой дагалдах уу?

- A. Тийм
- B. Үгүй

/17./ Тодруулагч бодис нарийн гэдсэнд ямар хугацаагаар saatval механик түгжрэлд тооцох вэ?

- A. 2 цаг
- B. 4 цаг
- C. 6 цаг
- D. 8 цаг
- E. 10 цаг

/18./ Мэс заслын үед бамбай булчирхайн гадна хавдар мэт зүйл тодорхойлогджээ. Биопси хийхэд бамбай булчирхайн эд байжээ. Зөв оношийг заана уу.

- A. Бамбай булчирхайн эдийн эктопи
- B. Аберрант бамбай булчирхай
- C. Бамбай булчирхайн хорт хавдрын үсэрхийлэл
- D. Бамбай булчирхайн нэвчтэс үрэвсэл

Е. Бамбай булчирхайн нэвчтэстүйланхай

/19./ Мөханик шартай өвчтөнд ямар мэс засал хийх вэ?

- A. Холецистоэктомия
- B. Холецистостоми
- C. Лапарскопи
- D. Гепатостоми
- E. Холедохоеюностоми

/20./ 20настай эмэгтэйн бүдүүн гэдэсний полипозын эмчилгээний зохистой аргыгаана уу

- A. Жилд 2 удаа колоносиброскоп хийх
- B. Жилд 2 удаа колонофиброскоп ба иррограф хийх
- C. Полипийг коагуляцаар шарж жилд 2 удаа колонофиброскоп хийх
- D. Шулзуун гэдсийн ихэнхийг тайрч авч төгсгөлийг өөр замаар гадагшлуулах
- E. Өвөрмөц эмчилгээ хэрэггүй

/21./ Гуяны үүн хураагуур судасны тромбозын үед хэрэглэх хамгийн зохимжтой эмчилгээ аль нь вэ?

- A. Гепарин
- B. Хөндий венд шүүлтүүр суулгах
- C. Стрептокиназа
- D. Венийн тромбыг авах
- E. Антибиотикийн эмчилгээ

/22./ Рефлюкс эозофагитийн үед доорх шинжүүдээс аль нь илрэхгүй вэ?

- A. Горойлт
- B. Цээж гашуу оргих
- C. Гашуунаар хэхрэх
- D. Бөөлжилт
- E. Өвчүүний ард горойж өвдөх

/23./ Ямар шалтгааны улмаас улаан хоолой гэнэт хагарах вэ?

- A. Улаанхоолой дурандахүед
- B. Амсрын нарийсалтийг тэлэх үед
- C. Бөөлжих үед
- D. Ястай мах залгих үед
- E. Хүчинлүүхад

/24./ Бүрэн хавчигдсан гэдэсний гадагшлах гогцоог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана уу?

- A. Гадагшлах гогцооны урт 45-50 см
- B. Гадагшлах гогцооны урт 30-40 см
- C. Гадагшлах гогцооны урт 20-30 см
- D. Гадагшлах гогцооны урт 15-20 см
- E. Гадагшлах гогцооны урт 10 см

/25./ Хүзүүний орчимд улаан хоолойг гадагшлуулах оновчтой газрыг- заана уу.38

- A. Мөгөөрсөн хоолойноос зүүн тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн урдуур
- B. Мөгөөрсөн хоолойноос баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн урдуур
- C. Мөгөөрсөн хоолойн баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн

хойгуур

/26./ Элэгний баруун дэлбэнд хагалгаа хийх тохиромжтой хүрцийг заана уу.

- A. Хэвлэйг голын шугамаар
- B. Баруун хавирганы numaар
- C. 8 дахь хавирга хоорондын тувшинд хөндлөнгөөр
- D. Баруун талын цээж, хэвлэйг хавсран нээх
- E. Хэвлэлийн баруун хажуугийн дагуу шугамаар

/27./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед өвчтөний ерөнхий биеийн байдал хүнд, хөхрөлттэй, амьсгаадсан

- A. Ушигны том гэмтэл
- B. Улаан хоолойн гэмтэл
- C. Мөгөөрсөн хоолойн гол салаан гэмтэл

D. Уушигны няцралт

E. Олон хавирганы хугаралт

/28./ Үнхэлгийн хөндийд шингэн хуралдсан үед гэрэлд хараад зүрхний агшилтын байдал:

A. Хүчтэй болно

B. Сул болно

C. өөрчлөгдхөгүй

/29./ Ямар эмчилгээнээс бусдыг нь спонтанный пневмоторакс-д хэрэглэх вэ?

A. Ушиг оёх

B. Торакоцентез

C. Торакопластик

D. Плеврийн хатгалт хийх

E. Ушигны сегмент авах

/30./ Цочмог эмпием архагт шилжих шалтгаан юу вэ?

A. Олон тасалгаат идээт хөндий байх

B. Идээг бүрэн гадагшуулж авсанаас

C. Антибиотик эмчилгээг хангалттай хийснээс

D. Ушиг бүрэн тэлэгдсэнээс

E. Өвчтөний биеийн эсэргүүцэл сайн байснаас

/31./ 12 хуруу гэдэсний шарх урд хананд цоорох нь хэдэн хувь вэ?

A. 10-20%

B. 20-30%

C. 40-60%

D. 60-80%

E. 90%

/32./ Уушигны олон тооны цочмог буглааны үед өвчтөний бие хүнд гэдгийг аль шинжээр тодорхойлох вэ?

A. Идээт хордлого + ушигны өнгөц амьсгалын дутагдал

B. Идээт хордлого + голчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх

C. Идээт хордлого + цусны эргэлтийн зогсонги

D. Идээт хордлого + идээт цэрэнд бөглөрөх

E. Ушигны өнгөц амьсгалын дутагдал + голчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх

/33./ Папиллосфинктертоми, сфинктер пластикхийх заалт:

A. Хөхлөгийн хоргуй хавдар

B. Папиллит

C. Фатеровын хөхлөг нарийсах

D. Бөглөрөх

E. Холангит

/34./ Бамбай булчирхайн аутоиммуны гэмтэл гараххамгийн магадлал ихтэй шалтгаа*-нь юу вэ?

A. Бага тунгаар ионжлогдсон туяа хүнд нөлөөлөх

B. Гаднаас амаар хүний биенд гадны уураг ороход бие махбодь хариу урва-өгөх

C. Өөрийн бамбай булчирхайн уурагт өвчтөний бие махбодь хариу урвал өгөх

D. Өвчтөний дархлааны систем өөрчлөгдхөхөд Т-супрессорын идэвх буурч, Т-хелперын идэвх зонхилоно.

/35./ Гэдэсний түгжрэлийн үед хагалгааны дараах үхлийн дундаж тоон үзүүлэлтийг заана уу?

A. 20-22%

B. 18-20%

C. 13-18%

D. 10-13%

E. 0-10%

/36./ Зангилаат эутиреоид бахлуурын үед хийх мэс заслыг заана уу.

A. Зангилааг хуулж авах

B. Бамбай булчирхайт зангилааны хамт шаантаг хэлбэрээр авах

C. Бамбай булчирхайн нэгталыгавах

- D. Бамбай булчирхайг тохирох хэмжээгээр үлдээж авах
- E. Бамбай булчирхайг бүгдийгавах

/37./ Мөханик шарпалтын ЭХО шинж ямар байх өэ?

- A. Элзний эдийн ЭХО ойлт ихсэх
- B. Цөсний хүүдийн хана зузаарч том болно.
- C. Элгэн доторх Цөсний зам өргөснө.
- D. Цөсний ерөнхий цорго хэвийн байна.
- E. Цөсний хүүдийд чулуу харагдана.

/38./ Бүдүүн гэдсэнд аль гажиг нь зонхилон тохиолддог вэ?

- A. Болезнь Гиршпрунга
- B. Долихоколия
- C. Долихосигма
- D. Атрезия, стеноз
- E. Колопатия

/39./ Судас нарийгах үйлчилгээтэй эмүүдийг богино хугацаанд хэрэглэхэд үрэвслийн явцад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

- A. Үхжсэн эдүүд хурдан унах
- B. Шүүдсийг баагасгах
- C. Нэвдээст хурдан шимэгдэх

/40./ Кардийн ахализийн 1-Н үеийн хамгийн үр ашигтай эмчилгээг заана уу.

- A. Спазмолитик эм хэрэглэх
- B. Улаан хоолойн доод хэсгийн хуниасыг /сфинктер/ тэлэх
- C. Эзофагомиотоми
- D. Улаан хоолой-хodoодны уулзварын тайралт
- E. Антирефлюксын хагалгаа

/41./ Улаан хоолой гэмтэх үед гарах гол шинжийг нэрлэнэ үү?

- A. Юмзалгихад сааталтай
- B. Хоолой хоржигнож дуугарна.
- C. Халуурна.
- D. Бөөлжине.
- E. Хүзүүний арьсан дор хий хурна

/42./ Гэдэсний хавчуулагдсан гогцоо үхжсэн болох магадлал ихтэй шинж тэмдэгийг сонгоно уу?

- A. Хавчигдсан гогцоо, түүний сероз бүрхүүл нь бараан өнгөтэй
- B. Хавчигдсан гогцоо гүрвэлзэх хөдөлгөөнгүй болох
- C. Хавчигдсан гогцооны чацаархайн судас ажиллагаагүй болох
- D. Ивархийн уутан доторх ус нь булингартах
- E. Гэдэсний орох гогцоо нь ихээр тэлэгдсэн байна

/43./ Улаан хоолой хүзүүний хэсгийн гэмтлийн үед мэс засал хийх зохистой хэмжээг заана уу

- A. Шархыгоёно
- B. Шархыг оёж, гуурс тавина.
- C. Улаан хоолойг гадагшнуулна.

/44./ Элзний сегментийн /хэрчмийн/ тоог Cownduad-ынхаар заана уу.

- A. 12 сегмент
- B. 10 сегмент
- C. 8 сегмент
- D. 7 сегмент
- E. 6 сегмент

/45./ Цээжний нэвтэрсэн шархыг мэс заслаар эмчлэх нь:

- A. Гэмтсэн бүх давхаргыг оёх
- B. Арьсыг үлдээн буличинг оёх
- C. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- D. Ил аргаар гэмтлийг эмчлэх

Е. Цээжний хөндийг нээж шалгах

/46./ Гурван хавтаст хавхлагын дутагдлын гэрлийн шинж нь:

- A. Зүүн ховдол ба баруун тосгуур томорно
- B. Баруун ховдол, ушигны артери хэмжээгээр томорно
- C. Баруун ховдол ба баруун тосгуур томорно

/47./ Цээжний битүү гэмтэл нь ушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх хагалгааны хэлбэр

- A. Ушигны гэмтлийг оёх
- B. Гурвалжин хэлбэрээр ушигнаас зүсэж авах
- C. Ушигны дэлбээг тайрах
- D. Уушгийг бүтнээр нь авах
- E. Гэмтсэн хавиргыг бэхлэж боох

/48./ Цээжний ханын дотор хальсны үрэвслийн 3 үндсэн онцлог чанарыг нэрлэ.

- A. Хориглох үйл + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + сорох өндөр чадвар
- B. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + ушгаа хамгаалах чадвар
- C. Хориглох үйл + шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар
- D. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + сорох өндөр чадвар + төлжих чадвар
- E. Бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + төлжих чадвар + өвчинөөс уушгаа хамгаалах чадвар

/49./ 40-60 насны өвчтөнд хodoодны шарх цоорood 6 цаг болоогүй байвал ямар төрлийн мэс засал хийх нь тохиромжтой вэ

- A. Хodoод тайрах
- B. Цоорсон шархыг оёх
- C. Шархны ирмэгээс эсийн шинжилгээ авч цоорхойг оёх
- D. Цоорхойг шаантаг хэлбэрээр өөлөн авч оёх
- E. Цоорхойг шаантаг хэлбэрээр өөлөн авч оёод тэнэмэл мэдрэлийг таслах

/50./ Олон тооны цэсний чулуутай, цэсний ерөнхий суваг 2 см хүртэл өргөссөн хийх зохистой мэс ажилбарыг заана уу.

- A. 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхөлбөр зүсэх
- B. Цэсний ерөнхий суваг нээж, цоргонд гуурставих
- C. Дурангаар хөхөлбөр зүсэх
- D. Элзг, нарийн гэдэс холбох
- E. Ерөнхий цоргыг нарийн гэдэстэй залгах

/51./ Хэвллийн шулуун булчингийн хальсны уутанд цус хурахад илрэх анхны онцлог шинж аль нь вэ?

- A. Хоолны дур муудаж, дотор эвгүй оргих
- B. Бөөлжих
- C. Хэвллийн урд хананд овгор зүйл тэмтрэгдэх
- D. Даралт буурч, тахикарди илрэх
- E. Хэвллийгээр гэнэт хүчтэй өвдөх

/52./ Ушигны олон тооны цочмог буглааны эмийн эмчилгээний сайн үр дүн

- A. Эдгэрэлт
- B. Хордлого тайлгадах
- C. Өвчлөлийг архагт шилжүүлэх
- D. Үр дүн гаражгүй
- E. Шинж тэмдэг арилах

/53./ Цэсний хүүдийг авах мэс заслын дараагаар элэгний гаднах цэсний сувагт дахин цэсний чулуу үүсэхэд дурдсан шалтгаануудаас аль нь нөлөөлөхгүй

- A. Хоолны дэглэм бариягүй
- B. Цэсний хэвийн ажиллагаанд саад учрах
- C. Цэсний сувгийн төгсгөл ийн хэсэг нь нарийсаж, холангит өвчин дагалдах
- D. Цэсний сувгийн тайрсан үлдэгдэл урт байх
- E. Цэсний суваг доторх оёоны утас шимэгдээгүй байх.

/54./ Олонтой тохиолддог бамбай булчирхайн үрэвсэлт өвчинүүдэд дараах өвчинүүдээс аль нь хамаарах вэ?

- A. Хурц тиреоидит буюу струмит
- B. Гүвгэр тиреоидит де Кервена- Крайл
- C. Лифоматозон тиреоидит буюу Хашимот
- D. Ширхэнцэрт Риделягийн тиреоидит
- E. Гиперпаратиреоидизм

/55./ Хэвллийн урд хананд харьцуулсан хэмжилтүүд хийж цочмог түгжрэлийг оношлох арга нь хэнийх вэ?

- A. Обуховский
- B. Кивуля
- C. Баасанжав
- D. Валя
- E. Ичинхорлоо

/56./ Механик шар үүсгэдэг шалтгаан нь аль вэ?

- A. Фатерев хөхлөгт чулуу тээглэх
- B. Нойр булчирхайн цочмог эвдрэлт үрэвсэл
- C. Цөсний хүүдийн сунах
- D. Фатерев хөхлөгийн зогсонго
- E. Цөсний замын лямблиоз

/57./ Бүдүүн гэдэснээс их хэмжээгээр цус алдах гол шалтгаан нь аль вэ?

- A. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн үрэвсэх
- B. Цус багадалтын бүдүүн гэдэсний үрэвсэл
- C. Ходоодны амсрын эмгэг-бүдүүн гэдэсний цүлхэнгүүд
- D. Сиплодисплазия
- E. Бүдүүн гэдэсний хавдар

/58./ Миксом ихэвчлэн хаана байрладаг вэ?

- A. Зүүн ховдол
- B. Зүүн тосгур
- C. Баруун тосгур
- D. Зүүн ба баруун тосгур
- E. Баруун ховдол

/59./ Б.В.Петровскийн ангиллаар улаан хоолойн ахалази дөрвөн үе шаттай байдаг. Мэс заслын эмчилгээ хийх үе шатыг заана уу.

- A. Бүх үе шатанд
- B. 1-рүештанд
- C. 2-3—р үе шатанд
- D. 3 ба 4-р үе шатанд
- E. 4-рүештанд

/60./ Ямар шалтгаануудын улаан хоолойн далд гэмтэл үүсэх вэ?

- A. Шингэн ихээрүүснаас
- B. Эзофагоскопи
- C. Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа
- D. Бронхоскопи
- E. Химиин бодисоор түлэгдэх /хүчил, шүлт/

/61./ Элэгний буглааг паразитийн бус гаралтай уйланхайнаас ялгах онцлог шинж

- A. Чанд авиан шинжилгээнд эхонегатив бүтэц байх
- B. Эхонегативийн хэлбэр дүрс зөв бус
- C. Халуурахгүй
- D. Дагжиж, чиррэхгүй
- E. Идээт хордлогын шинж илрэх

/62./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үед аль эмчилгээ нь хамгийн зохистой вэ?

- A. Хүчилтэрэгчийн эмчилгээ
- B. Цээжний хөндийд хатгалт хийх
- C. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- D. Цээжний хөндийг нээх
- E. Цээжний хөндийг нээж нөхөн сэргээх хагалгаа хийх

/63./ Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн гэрлийн шинж нь:

- A. Зүүн ховдол томорно
- B. Зүүн тосгур томорно
- C. Баруун тосгур томорно
- D. Баруун ховдол томорно
- E. Ховдол, тосгуурууд томорно

/64./ Цээжний битүү гэмтэл уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх эмчилгээний арга нь:

- A. Ерөнхий эмчилгээ
- B. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- C. Яаралтай хагалгаа хийх
- D. Уушгинд хиймэл амьсгал хийх
- E. Цээжний хөндий дурандах

/65./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар шинж гардагүй вэ?

- A. өвдөх
- B. Өндөр халуурах
- C. Хавирга зайд өргөсөх
- D. Тогшиход хэнгэрэн чимээ сонсогдох
- E. Дамуазын шугам тодорхойлогдох

/66./ 18-25 насны өвчтөн 12 хуруу гэдэсний шархтай. Шарх нь 2 см-ээс илүүгүй хэмжээний нэвчтэстэй тэр нь цоород болжээ. Ямар мэс засал хийж болох вэ?

- A. Шархны ирмэгийг зүсч аваад оёх
- B. Тэнэмэл мэдрэлийг таслах, шархны ирмэгийг зүсч аван нугалуурыг нөхөн сэргээх
- C. Ходоодыг анхдагчаар тайрах
- D. Опель-Поликарповын аргаар цоорсон нүхийг оёх
- E. Ходоодны гарах хэсгийг 12 хуруу гэдэсний хамт тайрах

/67./ Цохилт, лазер долгионы аргаар цөсний чулууг бүрэн бутлах магадлалыгзаана уу.

- A. 20 доошихувь
- B. 20% - 40% хүртэл
- C. 40% - 60% хүртэл
- D. 40% - 50% хүртэл
- E. 80% - 100% хүртэл

/68./ Архаг парапротитийн үед илрэхгүй шинж нь аль вэ?

- A. Үе үе өтгөн хаагдах
- B. Хошного орчимд сорви, нүхтэй байна.
- C. Идээ шүүс гарна.
- D. Хурууны үзлэгт нэвчдэс тэмтрэгдэнэ.
- E. Тодотгочтой зураг авахад цоргоны зураг гарна.

/69./ Уушигны цооролттой цээжний битүү гэмтлийн шинж аль нь вэ?

- A. Өвдөлтийн хам шинж
- B. Амьсгалын дутагдал
- C. Гэмтсэн талд амьсгал сонсогдохгүй байх
- D. Өхөн эдэд хийхурна
- E. Амьсгал тасалдах

/70./ Илрэхий байгаа бөглөрөлтийн шарыг оношлох оношлогооны дөхөмтэй аргыг нэрлэнэ

ҮҮ:

- A. Иендрассик, Эберлейны аргаар ерөнхий билирубин болон фракцыг шинжлэх
- B. Хэт авианы шинжилгээ
- C. Компьютерийн рентгентомографи
- D. Дурангаар серег панкреатикохолангидографи
- E. Дурангаар нойр булчирхай, цөсний сувгийн зураг авах

/71./ Бамбай булчирхайг заавал авах шаардлагатай өвчнийг заана уу.

- A. 4-р зэргийн баихуур, бамбай булчирхай хэт томорсон хэлбэр
- B. 5-р зэргийн баихуур, эутиреоид хэлбэр
- C. Бамбай булчирхайн хорт хавдар 3-р шатандаа
- D. Бамбай булчирхайн хортхавдар 1-2 -р шатандаа

Е. Урьдчилсан бамбай булчирхайн хорт хавдар гэж оношлосон

- /72./ Гэдэсний цочмог түүжрэлийн элбэг тохиолддог шинж тэмдэгийг сонгоно уу? v
- A. Хүйсний орчимд овойн, эргэж хэвдээ орохгүй байх
 - B. Гэдэсний өвдөлт эрчилсэн хэлбэртэй байх
 - C. Өтгөн ба хий хаагдах
 - D. Биеийн халуун 38.2 хэм хүртэл нэмэгдэх

- /73./ Тиреотоксикоз өвчний аль шинж тэмдэг нь олон тохиолдох вэ?

- A. Бамбай булчирхай томорно
- B. Экзофталм
- C. Зүрх өвдэх, зүрхний чичирхийлэл, хэм алдагдах
- D. Гар хавагнаж, салганах
- E. Судасны цохилт хэт олшрох

- /74./ Цөсний цочмог үрэвслийн хамгийн тод шинж тэмдгийг сонгоно уу.

- A. Ортнерын шинжтэмдэг
- B. Мерфийн шинжтэмдэг
- C. Цагаан эс өндөр түвшинд хүрэх
- D. Чугуевын шинж тэмдэг
- E. Шарлах

- /75./ Бүдүүн гэдэсний ур, полипозыг оношпох магадлал сайтай аргыг заана уу?

- A. Ректороманоскопи
- B. Хромоколоноскопи
- C. Ирригографи
- D. Чацаархайн судасны ангиографи
- E. Септографи

- /76./ Зүрхний доторх тромбозын эмгэг жамын гол хүчин зүйл:

- A. Тухайн гажгаасаа нөхцөлдсөн зүүн тосгуурын цусны зогсонгошил
- B. Мерцани хэм алдагдал
- C. Ревматизм давтан сэдрэх
- D. Гажиг олон жилээр үргэлжлэх
- E. Нэг ба хоёр зөв

- /77./ Цагаан мөгөөрсөн хоолой байнга агших эслиоспазмын эмчилгээ:

- A. Нойрсуулах эмчилгээ
- B. Эмийн эмчилгээ
- C. Улаан хоолойтэлэх /кардиодиплетаци/
- D. Физик эмчилгээ
- E. Рашаан, шавар эмчилгээ

- /78./ Залгих үйл ажиллагаа алдагдаж, хахаж цацах нь аль үед вэ?

- A. I үе-хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх үед
- B. II үе-хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий руу түлхэгдэх үед
- C. III үе-хоол улаан хоолойн 8 ба 1/3-аар дамжих үед
- D. Хоол ходаодны орох хэсэгт дамжих үед
- E. Аль ч үед залгих чадахгүй болох

- /79./ Хавчигдсан гэдэсний гогцоог тайрч авсны дараа гэдэсний аль залгаас нь ашигтай вэ?

- A. Төгсгөл хажуугийн залгалт
- B. Хажуу-хажууний залгалт
- C. Хажуу-төгсгөлийн залгалт
- D. Төгсгөл-төгсгөлийн залгалт
- E. Чихжэж залгах

- /80./ Улаан хоолой залгиурын том цүлхэнгийн үед байдаггүй шинж:

- A. Хоолойд гадны биет байгаа юм шиг санагдана.
- B. Улаан хоолойд юм горойж тээглэх
- C. Хүзүүнд овгор зүйл бий болох
- D. Гулигуулна.
- E. Хахаж цацна.

- /81./ Элэпний буглааны үед бодит үзлэгээр дараах шинжээс бусад нь илэрнэ

- A. Субфебриль температур
- B. Гепатомегали
- C. Тахикарди
- D. Чичрэх

/82./ Цочмогоор цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдах үед эмийн эмчилгээ үр дүн өгөөгүй тохиолдолд аль аргыг нь хэрэглэх вэ?

- A. Эмийн
- B. Плеврийн хөндийд хатгалт хийж гадагш нь холбох
- C. Торакотоми
- D. Торакопластика
- E. Бусад

/83./ Гурван хаваст хавхлагын нарийслийн үед дээд хөндий венийн хэмжээ (диаметр) өөрчлөгдөх үү?

- A. Өргөсөө
- B. Нарийсна
- C. Өөрчлөгдөхгүй

/84./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед өвчтөний ерөнхий биеийн байдал хүнд, хөхрөлтэй, амьсаадсан

- A. Ушигны том гэмтэл
- B. Улаан хоолойн гэмтэл
- C. Мөгөөрсөн хоолойн гол салаан гэмтэл
- D. Ушигны няцралт
- E. Олон хавирганы хугаралт

/85./ Цээжний гялтангийн үрэвслийг зонхилон үүсгэдэг шалтгааныг заана уу

- A. Гаднаас халдварт орох
- B. Цус - буюу тунгалагийн халдварт
- C. Үжлийн халдварт
- D. Зэргэлдээ эрхтэнээс халдварт дамжих
- E. Мөгөөрсөн хоолойгоорхалдварт орох

/86./ Шарх хажуугийн хананд цоорсонг шинжлэх хамгийн мэдээлэл сайтай рентгены аргыг нэрлэнэ үү?

- A. Давхар тодруулгын арга
- B. Өвчтөнийг босоо байрлалтай тодрууллагч гастрографи хийх
- C. Өвчтөнийг баруун хажуу байрлалтай тодрууллагч гастрографи хийх
- D. Өвчтөний зүүн хажуу байрлалтай тодрууллагч гастрографи хийх
- E. Хэвллийн хөндийн тойм харах

/87./ Хенохолевын хүчлийн бэлдмэлүүдийн нөлөөгөөр цөсний чулуубүрэн хайлдаг магадлалыг заана уу.

- A. 20 доош хувь
- B. 20% - 40% хүртэл
- C. 40% - 60% хүртэл
- D. 60% - 80% хүртэл
- E. 80% - 90% хүртэл

/88./ Цочмог парапроктитийн эмчилгээ аль нь вэ?

- A. Сульфаниламидын бэлдмэлүүдээр эмчлэх
- B. Хатгалт хийж эмчлэх
- C. Мэс заслын эмчилгээ
- D. Фистулэктоми
- E. Хордлого тайлах шинж тэмдгийн эмчилгээ

/89./ Ушигны буглаа цоороогүй үеийн шинж тэмдэг

- A. Өндөр халуурч чичрүүлнэ
- B. Биеийн байдал хөнгөн байна
- C. Биед хордлогын шинж угуй
- D. Их хэмжээний идээтэй цэр гарна

Е. Цагаан эсийн тоо эрс олширино

/90./ Фатеров хөхлөг хаана байрладаг вэ?

- A. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас 2см доор
- B. 12 хуруу нугалаа гэдэсний уруудах хэсгийн ар гадна гадаргууд
- C. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас доош 8 см-т
- D. 12 хуруу нугалаа гэдэсний уруудах хэсгийн төгсгөлд
- E. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас 4см-ийн доор

/91./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийг эмчлэхэд хийх хүрдэц нь аль вэ?

- A. Трансабдоминальный
- B. Трансплевральный
- C. Том ивэрхийтэй үед трансабдоминальный, бага ивэрхийтэй үед трансплевральный
- D. Том ивэрхийтэй үед трансплевральный, бага ивэрхийтэй үед трансабдоминальный
- E. Улаан хоолойн үрэвсэл дагалсан үед трансплевральный

/92./ Хагалгаа хийгээгүй гэдэсний түгжрэлийн үед өвчтөн ямар байдалд шилжих вэ?

- A. Алкалоз /шүүлжих/
- B. Ээнэгшлээ алдсан
- C. Ацидоз /хүчилжих/
- D. Эсийн гаднах алкалоз

/93./ Эндемийн баалуур үүсгэх үндсэн шалтгааныг нэрпэнэ үү.

- A. Хүрээлэн орчинд химиин болон ургамлын гаралтай струмоген байх
- B. Пуберратуе
- C. Йодоор бие махбодь дутгдах
- D. Хүний бие махбодид интратиреоидын солилцоо алдагдах
- E. Сэтгэл санааны хүнд дарамт

/94./ 50 настай эмэгтэй халуунтай, биетийн өнгө шар, баруун хавирганы нумаар базалжөвдөнө гэсэн зовиуртай хэвтсэн. Энэ ямар эмгэг байж болох вэ?

- A. Амёбный абсцесс
- B. Острый гепатит
- C. Острый панкреатит
- D. Холангит
- E. Острый гастродуоденит

/95./ Бүдүүн гэдэсний полип, полипоз нь бүдүүн гэдэсний бусад ямар эмгэгүүдтэй зонхилон хавсран тохиолдох вэ?

- A. Кляйнфельдын хам шинж
- B. Пейтца-Егерсийн хам шинж
- C. Гарднерын хам шинж
- D. Канадын хам шинж
- E. Ювенилын полипоз

/96./ Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой гажгийн үед артери вений цус холилдох үед хаана ачаалал үүсэх вэ?

- A. Зүүн ховдлын агшилтын ачаалал
- B. Зүүн ховдлын супралтын ачаалал
- C. Зүүн ховдлын хавсарсан ачаалал
- D. Ачаалал байхгүй
- E. Баруун ховдлын ачаалал

/97./ Ахалази кардиоспазмын эмгэгжамыг нэрлэ.

- A. Юм залгисны дараа амсар агших
- B. Улаан хоолойн булчин байнга агших
- C. Улаан хоолой амсырын булчин супрахгүй болох эсвэл дутуусулах
- D. Ходоод агшилтгүй болох /атони/

/98./ Гиссийн өнцөг гэдэг нь:

- A. Улаан хоолойн нэг хажуугийн хана нь ходоодны том махиаг давахад үүссэнөнцөг
- B. Улаан хоолойн нэг хажуугийн хана нь ходоодны жижиг махиаг шилжихэд үүссэн өнцөг

/99./ Улаан хоолой гэмтэх үед гаражгүй хүндрэл нь:

- A. Голчийн үрэвсэл

- В. Цус алдалт
- С. Элэгний буглаа
- Д. Улаан хоолой сорвижин нарийсах
- Е. Цээжний гялтанийн идээт үрэвсэл

/100./ Баруун талын суврэгсэд дагуу доргиоход өвдөлт илрэх шинж:

- А. Боткины шинж
- Б. Орднерын шинж
- С. Крюковын шинж
- Д. Мерфийн шинж
- Е. Барлоугийн феномен

/101./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үеийн доорх хүндрэлүүд аль нь амь насанд аюулий вэ?

- А. Арьсан доор хий хуралдах
- Б. Дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд цочмог хазайх
- С. Хатгаа даамжирах
- Д. Цээжний гялтан хальсны үрэвсэл даамжрах
- Е. Ушигны дэлбэн шалчийх

/102./ Гол судас – ушигны артерийн том хэмжээний цоорхойн үед ушигны артер дээр II авиа дараах байдалтай байна

- А. Өөрчлөгдхүй
- Б. Суларна
- С. Салаална
- Д. Акценттай болно
- Е. Шуугиангүй

/103./ Цээжний нэвтэрсэн шархыг мэс заслаар эмчлэх нь:

- А. Гэмтсэн бүх давхаргыг оёх
- Б. Арьсыг үлдээн булчинг оёх
- С. Цээжний хөндийд гурс тавих
- Д. Ил аргаар гэмтлийг эмчлэх
- Е. Цээжний хөндийг нээж шалгах

/104./ Цээжний баруун ар талаас нээхэд харагдах ушигны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын дарааллыг заа

- А. Мөгөөрсэн хоолой – ушигны тараагуур судас + ушигны дээд хураагуур судас + ушигны доод хураагуур судас
- Б. ушигны тараагуур судас - Мөгөөрсэн хоолой + ушигны доод хураагуур судас + ушигны дээд хураагуур судас
- С. ушигны доод хураагуур судас – ушигны дээд хураагуур судас +Мөгөөрсэн хоолой ушигны тараагуур судас
- Д. ушигны доод хураагуур судас – ушигны дээд хураагуур судас +ушигны тараагуур судас + Мөгөөрсэн хоолой
- Е. Ушигны доод хураагуур - ушигны дээд хураагуур судас + ушигны тараагуур судас+мөгөөрсэн хоолой

/105./ 12 хуруу гэдэсний 2 см хэмжээний цооролтой каплээш шархлаанд хийх мэс ажилбарын зохистой хэмкээг заана уу?

- А. Шархлааг зүсч авах, тэнэмэл мэдрэлийг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- Б. Шархлааг оёх
- С. Ходоодны гарах хэсгээр тайрч тэнэмэл мэдрэлийг таслах
- Д. Хамраар дамжуулан ходоодонд хоёр гурс тавих
- Е. Ходоодыг хэмнэлттэй тайрах

/106./ Цэсний өрөнхий цоргын чулууг ретроград холангографийн шинжилгээгээсхэдэн хувь хүртэл оношлох боломжтой вэ?

- А. 20%-40%хүртэл
- Б. 40% - 60% хүртэл
- С. 60% - 80% хүртэл
- Д. 80% - 90% хүртэл

E. 90% -100% хүртэл

/107. / Цочмог парапротитын шинж тэмдэг биш нь:

- A. Шулуун гэдэс орчим өвдөх
- B. Шулун гэдэснээс цус гоожих
- C. Халуурах, хоолонд дуршилгүй болох
- D. Өтгөн хатах, дүлүүлэх
- E. Шээс хаагдах

/108. / Уушигны хатгааны зонхилон тохиолдох эмнэл зүй – морфологийн хэлбэрийг тодорхойл

- A. Уушигны цусан хатгалгаа
- B. Голомтот хатгалгаа
- C. Завсарын уушигны хатгалгаа
- D. Вирус – халдварын хатгалгаа
- E. Мөөгөнцөрт уушигны хатгалгаа

/109. / Элэгний суваг ба цөсний ерөнхий суваг нь 2см урттай сорвижин нарийссан үед хийх мэс заслын зохистой хувилбар нь:

- A. Элгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах
- B. Элгийг өлөн гэдэстэй залгах
- C. Элэгний ба цөсний ерөнхий цоргын сорвижсон нарийсалтыг зүсэж авах
- D. Цөсний гэрийг өлөн гэдэстэй залгах
- E. Цөсний ерөнхий сувгийг тайрч хиймэл суваг залгах

/110. / Өрц ullaан хоолойтой нийлэх улаан хоолойн гарах хэсгийн ивэрхийг илүү үнэн бодитой оношлох оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү.

- A. Өвчиний намтар түүхийг цуглуулах
- B. Тогших, чаннах арга
- C. Олон байрлалын рентген тодотгогч бодисын шинжилгээ
- D. Ходоод дурандах
- E. Ангиографийн шинжилгээ

/111. / Наалдаст түгжрэлийн үед гэдэс хаймсуурдах хамгийн оновчтой аргыг тэмдэглэнэ үү?

- A. Ю.М.Дедерерийн гастроомор
- B. Н.Д.Житнюковор илеостомоор
- C. С.М.Долецкоор шулун гэдсээр
- D. Цекостомоор
- E. Хамраар, ходоод, 12 хуруу нугалаа гэдсээр

/112. / 42 настай өвчтөнд "тиреотоксикозын хүнд хэлбэр" гэдэг онош тавигджээ. Эмчилгээний оновчтой тактикийг заана уу.

- A. Яаралтай мэс засал хийх
- B. Эмийн хавсарсан эмчилгээ
- C. Эмээр эмчлэх, оршин суугаа газраар нь булчирхайн эмч хяналтандаа авах
- D. Эмээр эмчлэн, бамбай булчирхайг авах
- E. Эмээр эмчлэн, бамбай булчирхайг тайрах

/113. / Бэтгийн мэс заслын үед бэтгийг суллаад фиброз бүрхүүлийг хуулах мэс засал үлдэц хөндийд дренаж тавив. Мэс заслын дараа дренажаар шар ногоон ялгадас гарах болов. Ямар хүндрэл гарсан бэ?

- A. Цөсний цоорхой үүсэх
- B. Үлдэц хөндиййд идээлэх
- C. Перитонит
- D. Буглаа
- E. Цус алдалт

/114. / Цүлхэнгүүдийн элбэг тохиолдолд шинж тэмдгийг заана уу?

- A. Ходоодны доод хэсэгт өвдөх, дотор муухайрах
- B. Хэвлэлийгээр өвдөх+гэдэс дүүрэх
- C. Зүүн талд үе үе өвдөх+гэдэс дүүрэх
- D. Гэдэсний замаас их хэмжээний цус алдах
- E. Олон удаа бие засах+үе үе гэдсээр өвдөх+гэдэс дүүрэх

/115. / Зүрхний баруун тосгуурт дараах судаснаас аль нь холбогдохгүй вэ?

- A. Дээд хөндийн вен
- B. Доод хөндийн вен
- C. Коронар синусын вен
- D. Зурхний хос биш вен
- E. Зурхний том биш вен

/116./ Хэрвээ улаан хоолой гэмтэж, голч үрэвссэн бол улаан хоолойг яах вэ?

- A. Гэмтэлтэй хэсгийг мэс заслын үед оёх
- B. Гэмтлийтг оёод хамраар зонд тавих
- C. Хамраар нь зондтавих
- D. Гэмтлийтг оёод ходоодонд гуурс тавих
- E. Оёхгүйгээр улаан хоолойд зонд тавих

/117./ Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн цооролтыг эмчлэх аргыг сонгоно уу.

- A. Ходоодонд байнгын зонд тавьж, антибиотик эмчилгээ хийх
- B. Хэвтрийн дэглэм
- C. Хүзүүний хүрцээр мэс засал хийж, цоорхойг оёж, урд голчид гуурс тавьж антибиотик эмчилгээ хийх
- D. Мэс засал хийж, улаан хоолойг тайрч, бүдүүн гэдсээр орлуулан залгаж, антибиотик эмчилгээ хийх
- E. Дурангийн тусламжтай нүхийгбөглөх

/118./ 12 хуруу гэдэсний бөглөрөл сааталд аль хагалгааг гь хийх вэ?

- A. Дуоденоюнал буланг чөлөөлж доошишуулах /стронгийн хагалгаа/
- B. Ходоодыг 12 хуруу гэдэстэй залгах Бильрот 2-ын хагалгаа
- C. Дуоденоюноанастомоз /Витебсийн арга/
- D. Дуоденоюноанастомоз /Ру-гийн арга/
- E. Хамраар байнгийн хаймсуур тавих

/119./ Улаан хоолойн өргөссөн хураагуур судсаас цус алдах үеийн оношлогооны хамгийн оногдуулж аль нь вэ?

- A. Бари уултаж рентгенд харах
- B. Улаан хоолой дурандах
- C. Целиакус судсаар ангиографи хийх
- D. Дэлүүний эдэд манометри хийх

/120./ Элэгний буглаа үүсэхэд халдварт аль замаар зонхилон дамжих вэ?

- A. Нойр булчирхайн замаар
- B. Хаалган венэр
- C. Тунгалгийн замаар
- D. Цөсний замаар
- E. Ходоод, тэдэсний замаар

/121./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдаад хийг гадагш зайлцуулах эмчилгээ үр дүн өгөхгүй бол яах ёстой вэ?

- A. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- B. Идэвхтэй соруулалтын тогтолцоонд шилжүүлэх
- C. Хагалгаа хийх
- D. Өвчтөнийг мэргэшсэн эмнэлэгт шилжүүлэх

/122./ Гол судасны өгсөх хэсэг аль тохиолдолд өргөсөх вэ?

- A. 2 хавтаст хавхлагын нарийсал
- B. Гол судасны дутагдал
- C. Гол судасны нарийсал
- D. 2 хавтаст хавхлага ба гол судасны хавхдагын нарийсал
- E. 2 хавтаст хавхлага ба гол судасны хавхдагын нарийсал

/123./ Амбулаторийн нөхцөлд цээжний хөндийг нэвт хатгаж, уушиг гэмтсэн тохиолдолд үзүүлэх анхны тусламж

- A. Шархыг дарж боолт хийх
- B. Ариутгасан боолт хийх
- C. Хүзүүний ваго-симпатик хориг хийх
- D. Биеийн байдал дордох үед үе уушгийг үлээлгэх

Е. Маш түргэн хугацаанд өвчтөнийг гэмтэл-мэс засалд хүргэж өгөх

/124./ Парадоксал амьсгал аль пневмоторакс – д гардаг вэ?

- A. Хаалттай
- B. Нээлттэй
- C. Хавхлагат
- D. Хагас нээлттэй
- E. Хязгаарлагдмал

/125./ 30 настай өвчтөнд зөөлөн захтай 12 хуруу гэдэсний шархлаа нь цоорчээ. Ямар мэс засал хийх вэ?

- A. Цоорсон нүхийг оёх
- B. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн 2 ба 3-зэргэлэлийг отлох
- C. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн 2-р зэрэглэлийг отлох
- D. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн баганын хэсгийг отлох
- E. Ходоод тайрах

/126./ Цөсний замын чулууг Цөсний эураг авалтаар хэдэн хувь хүртэл оноошлох боломжтой вэ?

- A. 20-с доош хувь
- B. . 20% - 40% хүртэл
- C. 40% - 60% хүртэл
- D. 60% - 80% хүртэл
- E. 80% - 90% хүртэл

/127./ Хүндээр бие засах үед хошногт маш хүчтэй өвдөлт илрэх нь аль эмгэгийн байх вэ?

- A. Цочмог шамбарам
- B. Шамбарамын судасны бөглөрөл
- C. Шамбарамын зангилаа хавчигдах ба унжих
- D. Шулуун гэдэсний амсрын салст язрах
- E. Цочмог парапроктит

/128./ Ушигны цочмог хатгаагаар залуу ба дунд насандаа аль хүйс нь зонхилон өвчлөдөг вэ?

- A. Эрэгтэй
- B. Эмэгтэй

/129./ Цөсний ерөнхий суваг нь анатомын хувьд хэдэн хэсгээс бүрдэх вэ?

- A. 4
- B. . 3
- C. 2
- D. 5
- E. 6

/130./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний хүндрээгүй гулсамтгай ивэрхийн үед мэс заслын эмчилгээг аль хувиар хийхийг заана уу?

- A. Өвчтөнүүдийн 10%-иасбага хувьд
- B. Өвчтөнүүдийн 20-40%-д
- C. Өвчтөнүүдийн 41-60%-д
- D. Өвчтөнүүдийн 61-80%-д
- E. 81-ээс их хувьд

/131./ Гэдэсний цочмог түгжрклийн 3-р үед /төсгөлийн үе/ дараах шинжүүдээс аль нь үл хамарагдах вэ?

- A. Тархмал гялтангийн үрэвсэл
- B. Цусны хөдлөлзүйн өөрчлөлт тод илрэх
- C. Усгүйжих шинж
- D. Хэл хуурайших
- E. Хэл чийгтэх

/132./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийг эмчлэхэд хийх хүрдэц нь аль вэ?

- A. Трансабдоминальный
- B. . Трансплевральныий

- C. Том ивэрхийтэй үед трансабдоминальный, бага ивэрхийтэй үед трансплевральный
- D. Том ивэрхийтэй үед трансплевральный , бага ивэрхийтэй үед трансабдоминальный
- E. Улаан хоолойн үрэвсэл дагалдсан үед трансплевральный

/133./ Буруутдорхойполтыгсongo

- A. Бэтгийн хитин бүрхүүл хамгийн идэвхтэй давхраа бөгөөд үүнээс шинээр сколексууд үүсдэг.
- B. Фиброзон бүрхүүл нь бэтгэний үйл анхайн үндсэн бүрхүүл нь биш
- C. Бэтгийн сколексууд бэтгийн шингэнээртэжээгдэн охин бэтгүүдийг үүсгэнэ
- D. Бэтгийн шимэгч хүний биед нас гүйцсэн хэлбэрээрээ байдаггүй
- E. Хагалгааар фиброз бүрхүүлийг заавал авна.

/134./ Бүдүүн гэдэсний тархмал нэвчэст үрэвслийг эмчлэх оновчтой арга нь :

- A. Салазопиридазин+трихопол+преднизолон
- B. Трихопол+преднизолон+азатиоприн
- C. Колэктоми+нарийн гэдэсний төгсгөлийг шулуун гэдэстэй холбох
- D. Алсалсан залгаас
- E. Цекостоми

/135./ Тэнэгч мэдрэл зүрхрүү ирэхдээ:

- A. Симпатик мэдрэлийн ширхэгээр
- B. Парасимпатик мэдрэлийн ширхэгээр
- C. Симпатик ба парасимпатик мэдрэлийн ширхэгээр

/136./ Голчийн дээд хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн тЦ вэ?

- A. Шарханд чихээс тавих
- B. Шарханд контур гарган гуурс оруулан үзүүрийг нь гадагшлуулах
- C. Шархан дундуур гоожуурга тавих
- D. Гоожуураар шарханд угаалга хийх
- E. Антибиотик эмчилгээ хийх

/137./ Улаан хоолойн Ахалазид аль нь хамаарахгүй вэ?

- A. Цээжний хөндийн улаан хоолойн ганглионаар эс нь алга болох бу өөрчлөгдсөн байна.
- B. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн даралт хэвийнхээсээ доогуу
- C. Энэ өвчин 30-50 насны хооронд зонхилон тохиолдоно.
- D. Өвчтөн халуун хоол залгихасаа хүйтэн хоол залгихад хөндүүрлэнэ.
- E. Улаан хоолойн хорт хавдраар өвчлөх эрсдэл 7 дахин их байна.

/138./ Ходоодны гарах хэсгийн тэнцвэртэй байгаа нарийсалтай, 12 хуруу гэдэсний шархлаанд хийх мэс заслын оновчтой аргыг заана уу?

- A. Тэнэмэл мэдрэлийн 2-р зэрэглэлийн салааг сонгон таслах
- B. Тэнэмэл мэдрэлийн шархлаанд зүсэлт хийх
- C. Тэнэмэл мэдрэлийн 3-р салааг сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- D. Тэнэмэл мэдрэлийн 2-р зэрэглэлийн салааг сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- E. Ходоод тайрах

/139./ Залгих үйл ажиллагаа алдагдаж, хахаж цацах нь аль үед вэ?

- A. I үе-хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх үед
- B. II үе-хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түүхэгдэх үед
- C. III үе-хоол улаан хоолойн 8 ба 1/3-аар дамжих үед
- D. Хоол ходоодны орох хэсэгт дамжих үед
- E. Аль ч үед залгиж чадахгүй болох

/140./ Цанх өвчийн шинж:

- A. Огих
- B. Гэдэсдүүрэх
- C. Хэвлэй хүчтэй өвдэх
- D. Шээсхорогдох
- E. Суулгах /цацга алдах/

/141./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдсан эмгэгийг эмчлэх арга:

- A. Тайван байлгаж, шимэгдүүлэх эмчилгээ хийх

- B. Цээжний хөндийд пункц хийж, хийг соруулах
- C. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- D. Хагалгаа хийх

E. Цээжний хөндийг дурандах

/142./ Гол судасны нарийсал дараахаас бусад үед үүснэ

- A. Ревматизм
- B. Тэмбүү
- C. Атеросклероз
- D. Красной волчанки
- E. Халдварын эндокардит

/143./ Цочмогор цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдах үед эмийн эмчилгээ үр дүн
егөөгүй тохиолдолд аль аргыг нь хэрэглэх вэ?

- A. Эмийн
- B. Плеврийн хөндийд хатгалт хийж гадагш нь холбох
- C. Торакотоми
- D. Торакопластика
- E. Бусад

/144./ Хавхлагат пневмотораксын онцлог юу вэ?

- A. Тэр талын ушиг бүрэн шалчийдаг
- B. Голт, зурх байрнаасаа нөгөө тал руугаа шилждэг
- C. Эрүүл ушиг дарагдаггүй
- D. Пневмоторакс үүсдэг
- E. Амьсгал, зурх судасны дутагдал гардаггүй

/145./ Мэс заслын дараагаар нугалуур 12 хуруу гэдэсний шархлаа сэдрэх гол шалтгааныг
нэрлэнэ үү.

- A. Ходоодны хэмнэлттэй тайралт
- B. Тэнэмэл мэдрэлийг бүрэн таслаагүйгээр
- C. 12 хуруу гэдэсний үлдэц дээр ходоодны гарах хэсгийг үлдээснээс
- D. Ходоод, гэдэсний залгаас нарийсах
- E. Гастроэнтеростомия

/146./ 2 см урттай элэнний сувгийн нарийсалд ямар мэс засал хийх нь зүйтэй вэ?

- A. Нарийсалтай хэсгийгтайрч хоёр үзүүрийг хооронд нь залгах
- B. Цөсний хүүдийг нарийн гэдэстэй залгах
- C. Элэг, нарийн гэдэс залгах
- D. Цөсний ерөнхийсувгийг нарийн гэдэстэйзалгах
- E. Элэг, 12 нугалаа гэдсийг холбох

/147./ Шамбранны мэс заслын эмчилгээний дараа аль хүндрэл нь тохиолдох вэ?

- A. Шулнуун гэдэсний амсар нарийсах
- B. Шулнуун гэдэсний салст унжих
- C. Шулнуун гэдэсний цоорхой
- D. Уушиний arterийн /хураагуур судасны/ бөглөрөлт
- E. Ялгадас гарах үед өвдөлт өгөх

/148./ Ямар өвчний үед өрөнхий эргэлтийн цус багасах вэ?

- A. Бөөрний хам шинж
- B. Бөөрний хурц үрэвсэл
- C. Зүрхний дутмагшил
- D. Цус багадалт
- E. Зүрхний гаралтай шок

/149./ Холедохоеюно залгаас найдлагатай сайн болоогүй гэж үзвэлдекомпрессийн гуурсыг
яаж тавих вэ?

- A. . Цөсний хүүдийн тайрагдсан цоргоор
- B. Холедоход Т хэлбэрийн гоожуурга тавих
- C. . Ру-гээр авсан гэдэсний үзүүрээр
- D. Спасокукоцкийн гуурсаар
- E. Вишневскийн аргаар

/150./ Өрцний ивэрхийн үүсэх шалтгааныг заана уу?

- A. Өрцний улаан хоолойн нүх өргөн байх
- B. Ходоодны холбоосын дутуу бэхэлгээ
- C. Богино улаан хоолой
- D. Хэвллийн доторх даралт гэнэт ихэссэн
- E. Ye ye бөөлжих

/151./ Гэдэсний механик цочмог түгжрэлийн үеийн гол шинж нь аль нь вэ?

- A. Хүйсний орчмоор овойх
- B. Хэвллийд хүчтэй базалж өвдөх
- C. Өтгөн ба хий хагас хаагдах
- D. Бөөлжихгүй байх
- E. Биеийн халуун 37.5-38.5°C

/152./ Өрц улаан хоолойтой нийлэх улаан хоолойн гарах хэсгийн ивэрхийг илүү үнэн бодитой оношлох оношлогооны аргыг нэрлэнэ үү.

- A. Өвчний намтар түүхийг цуглуулах
- B. Тогших, чанах арга
- C. Олон байрлалын рентген тодотгогч бодисын шинжилгээ
- D. Ходоод дурандах
- E. Ангиографийн шинжилгээ

/153./ Элэгний паразит бус гаралтай уйланхайн эмчилгээ нь аль вэ?

- A. Антибиотик эмчилгээ
- B. Шавар эмчилгээ
- C. Элгийг уйланхайтай нь хамт тайрах
- D. Чанд авианы шинжилгээний хяналтанд хатгалт хийх
- E. Цистоэнтеростоми

/154./ Фиброколоноскопи болон ректороманоскопийн шинжилгээний үед бүдүүн гэдэсний салст бүрхүүлд ялзрах, хавагнах, цус шүүрэлт илэрдэг өвчнийг нэрлэнэ үү?

- A. Кроны өвчин
- B. Цусан суулга
- C. Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэл
- D. Бүдүүн гэдэсний сурьеэ
- E. Лимфогрануломатоз

/155./ Ховдлын булчингаар импульс ямар хугацаанд тархах вэ?

- A. 0.2 мс
- B. 0.4 мс
- C. 0.6 мс
- D. 0.8 мс
- E. 2 см

/156./ Голчийн дээр байрлалын идээг нээх хүрц:108

- A. Хүзүүний хэсгээр
- B. Өвчүүгээр
- C. Цээжний хөндийгээр

/157./ Ахалази үүсэх эмгэг жам аль нь вэ?

- A. Улаан хоолойн үрэвслээс
- B. Улаан хоолойн доод сфинктерийн даралт өөрчлөгдсөнөөс
- C. Юм залгихад анхдагч давалгаа доошоо чиглэлтэй үүсч кардийг нээдэг үйл ажиллагаа алдагдсанас
- D. Хэвллийн доод даралт өөрчлөгдсөнөөс
- E. Улаан хоолойн ханын анатоми өөрчлөгдсөнөөс

/158./ Тэнэмэл мэдрэлийг таслах аргыг хэрэглэхээс гадна, 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд нэхэн сэргээх аль арга нь тохиромжтойг заана уу?

- A. Финнийн аргаар нугалуурыг нэхэн сэргээх
- B. Нугалуурыг үлдээж 12 хуруу гэдсийг нэхэн сэргээх
- C. Табулын аргаар хodoод 12 хуруу гэдсийг холбох
- D. Гейнеке – Микуличийн аргаар нугалуурыг нэхэн сэргээх

Е. Дурьдсан бүх аргууд адил

/159./ Улаан хоолойн нарийсалт гэдэг нь:

- A. Голч нь 1/3-ээс ихээр багасах
- B. Голч нь 1/4-ээс ихээр багасах
- C. . Голч нь 1/2-оос ихээр багасах

/160./ Хөндий болон үүдэн хураагуур судасны хоорондын төрөлхийн ямар холбоонууд байдагвэ?

- A. Дээд чацархайн хураагуур болон ходоодны амсарын хураагуур судасны
- B. Ходоод, дэлүүний хураагуур судасны хооронд
- C. Сэмж, гэдэсний хураагуур судасны хооронд
- D. Хэвллийн ханын болон хүйсний хураагуур судасны хооронд
- E. Шулупун гэдэс, хүйсний хураагуур судасны хооронд э?

/161./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурахын хүндэрсэн шинж тэмдэг:

- A. Ушигны гялтангийн шок
 - B. Амьстгал дутагдах шинж тэмдэг
 - C. Хучилтөрөгч дутагдах, цусны эргэлтийн үйл ажиллагаа алдагдах
 - D. Өвдөлт
 - E. Цээжний хөндийн дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх үйл ажиллагааны хямрал
- /162./ Гэдэсний түгжрэлгүйгээр ханаараа хавчигдсан гэдэсний гогцог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана уу?
- A. Хавчуулагдсан газраас хоёр тал руу 5 см-ээр
 - B. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 10 см-ээр
 - C. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 15 см-ээр
 - D. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 20 см-ээр
 - E. Тайлалгүйгээр хавчуулагдсан гэдсээ дотогш нь оруулах

/163./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үеийн дундаж эдгэрэх хугацаа:

- A. 2-3 өдөр
- B. 1-2 долоо хоног
- C. 3-4 долоо хоног
- D. 5 сар ба түүнээс дээш
- E. 62 сар

/164./ 12 хуруу гэдэсний доод арын хананд байрлах эрхтэн рүү цоорсон шархлааны үед ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ?

- A. Бильрот 1-ийн дагуу ходоод тайрах
- B. Бильрот 2-ын дагуу ходоод тайрах
- C. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдсийг гүүр хэлбэрээр нөхөн сэргээх
- D. Шархлааг авч, нугалуур хэсгийг нээж хаагаад тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрах
- E. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдэст хэсэгчилсэн нөхөн сэргээлт хийх

/165./ Хавхлагат пневмотораксын онцлог юу вэ?

- A. Тэр талын ушиг бүрэн шалчийдаг
- B. Голт, зүрх байрнаасаа нөгөө тал руугаа шилждэг
- C. Эрүүл ушиг дарагдаггүй
- D. Пневмоторакс үүсдэг
- E. Амьстгал, зүрх судасны дутагдал гардаггүй

/166./ Лимфедем ямар төрлүүдтэй вэ?

- A. Анхдагч
- B. Хоёрдогч
- C. Холимог
- D. Анхдагч ба хоёрдогч
- E. Бүгд

/167./ Ушигны 1, 2 – р сегмент урагдаж гэмтсэн үед хийх эмчилгээ

- A. Уушгийг дан оёогоор оёх
- B. П хэлбэрийн оёогоор оёх
- C. Гурвалжин хэлбэрээр уушигнаас зүсэж авах
- D. Уушигны нэг дэлбэнг тайрах
- E. Уушгийг бүтнээр нь авах

/168./ Элэгний гэмтлийн ярвигтай хүндрэлүүдийн нэг нь гемофили юм. Мен чанар нь юундайх вэ?

- A. Меллори-Вейсийн хам шинж
- B. Ходоод, 12 нугалам гэдэсний олон улаалтууд
- C. Элгэнд булэгнэлт бий болгох явц огцом багасах
- D. Өргөссөн венийн цус алдалтын үед хаалган вен бөглөрөх
- E. Элэгний эдийн судас гэмтсэнээс цөсний замаар дамжин хоол боловсруулах цус алдах

/169./ Мэс заслын үед, цөсний замын эмгэгийтгэг оношлоход аль шинжилгээгя

- A. Лапароскопи
- B. Холедоскопи
- C. Холедохографи
- D. Холангiomанометр
- E. Судсаархолецистохолангииографи

/170./ 2.5 см болон түүнээс том хэмжээтэй арван 12 хуруу гэдэсний шархлаанд хийх оновчтой мэс заслыг заана уу?

- A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх
- B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- C. Тэнэмэл мэдрэлийн сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- D. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслан, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- E. Ходоодны гарах хэсгийг тайрч, тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгээр таслах

/171./ Бүрэн хавчигдсан гэдэсний орох гогцог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана уу?

- A. Урт нь 45-50 см
- B. Урт нь 35-40 см
- C. Дарагдсан ховилын хэмжээнд
- D. Урт нь 15-20 см
- E. Урт нь 10 см хүртэлх

/172./ Цээжний битүү гэмтлийн үед өвчтөний биеийн байдал хүнд, хөхрөлт илэрч, сөөнгөтөн хүзүүний арьсан дор хий үүсчээ. Ямар гэмтэл болохыг тодорхойл.

- A. Уушиг их хэмжээгээр урагдсан
- B. Улаан хоорой гэмтсэн
- C. Мөгөөрсөн хоорой эхний хэсгээрээ тасарсан
- D. Уушиг няцарсан
- E. Олон хавирга хугарсан

/173./ 2 см хүртэл хэмжээтэй цөсний ерөнхий сувганд байх цөөн тооны чулууг мэс ажилбараар хэрхэн авах вэ?

- A. 12 хуруу гэдэс дамжиж хөхлөгийг отплох
- B. Цөсний ерөнхий суваг нээж + сувгаар гуурс тавих
- C. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх
- D. Цөсний суваг нүхлэх+Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй холбох
- E. Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй холбох

/174./ Өрц хөдөлгөөнгүй болсон үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу.

- A. 10%-аасбага
- B. 20-40%
- C. 41-60%
- D. 61-80%
- E. 81%-иасдээш

/175./ Уушигны олон тооны цочмог буглааг антибиотикоор эмчлэх зорилгыг хэлнэ үү?

- A. Өвчтөнийг эдгээх
- B. Уушиг авах хагалгаанд өвчтөнийг бэлдэх

- C. Уушгийг нээх төрлийн хөнгөвчилсэн мэс засалд өвчтөнийг бэлдэх
- D. Хордлого тайлах

E. Өөр эмчилгээ хийх боломжгүй

/176./ 75 настай эрэгтэй механик шаралттай эмнэлэгт хэвтсэн, Механик шаралтын шалтгааны олохын тулд аль шинжилгээний аргыг сонгох вэ?

- A. Дурангаар ретроград холангипанкреатографи /EPCR/
- B. Элгэнд гаднаас нь хатгаж холангографи хийх
- C. Хэт авиа
- D. Компьютер-томографи
- E. Тэмдэгт атомын шинжилгээ

/177./ Гэдэсний амьдрах чадваргүй эргэлзээтэй шинж тэмдэг нь:

- A. Чацаархайн судасны лүгшилт зогссон
- B. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн зогссон
- C. Даралтын ховилын хэсэгт гүнзгий өөрчлөлт орсон байх
- D. Сероз бүрхүүлийн ёнгөө өөрчлөгдхөх
- E. Гэдэсний хана хэт зузаарах

/178./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед өрөнхий унтуулга хийх аргын онцлог

- A. Уушгийг хиймэл амьсгалд түргэн шилжүүлэх
- B. Цээжний хөндийд урьдчилан гуурс тавих
- C. Судсаар наркоз хийх
- D. Хэсэг газрын мэдээг алдуулан, хагалгаа хийх
- E. Нугасны мэдээ алдуулт хийх

/179./ Уушиг тайрахад байж болох хэмжээ

- A. Хоёр уушигнаас арав хүртэлх сегмент
- B. Хоёр уушигнаас авсан хоёр хүртэлх сегмент
- C. Нэг уушиг
- D. Нэг уушигнаас найм хүртэлх сегмент
- E. 2 уушигнаас 8 хүртэлх сегмент

/180./ Нарийн гэдэсний түгжрэлийн эгзэйтэй хугацаа:

- A. 2 цаг
- B. 6 цаг
- C. 12 цаг
- D. 24 цаг
- E. 48 цаг

/181./ Н.Баасанжав, Б.Батболд нарын аргаар Цөсний өрөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй залгахад хэрхэн зүсэх вэ?

- A. Цөсний өрөнхий сувгийг-хөндлөн, 12 хуруу гэдсийг-тууш зүснэ.
- B. Цөсний өрөнхий сувгийг - ташуу, 12 хуруу гэдсийг - тууш зүснэ.
- C. Цөсний өрөнхий сувгийг - тууш, 12 хуруу гэдсийг-хөндлөн зүснэ.
- D. Цөсний өрөнхий суваг ба 12 хуруу гэдсийгхөндлөн зүснэ.
- E. Цөсний өрөнхий суваг ба 12 хуруу гэдсийг дуграг зүснэ.

/182./ Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат үрэвслийн үед гэрлийн шинжилгээнд шинж нь илрэх вэ?

- A. Гэдэсний нарийсалт
- B. Гэдэсний пассаж алдагдах
- C. Салстын рельеф тэнэгэр болох
- D. Гэдэсний гаустр алдагдах
- E. Хэлбэр дүрс нь өөрчлөгдхөх

/183./ Өрцний ивэрхийн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу.

- A. 10%-аасбага
- B. 20-40%
- C. 41-60%
- D. 61-80%
- E. 81%-иасдээш

/184./ 2 хавтаст хавхлагын дутагдлын нөхөн сэргээх хагалгааг дараахаас бусад үед хийж болно

- A. Фиброз цагирагийн диллятаци
- B. Өмнөд хавтасны 2/3 –с илүү хордын урагдал
- C. Хордын утасах
- D. Өмнөд хавтасны нэг хордын урагдал
- E. Нэг хавтас нь байхгүй байх

/185./ Голчийн дээр байрлалын идээг нээх хүрц: 108

- A. Хүзүүний хэсгээр
- B. Өвчүүгээр
- C. Цээжний хөндийгээр

/186./ Буруу тодорхойлолтыг сонгох. Сүрьеэгийн гаралтай хэвлийн гялтангийн үрэвслийн шалтгаан:

- A. Ихэвчлэн хоёрдогчоор үүснэ.
- B. Халдвэр гэдэс, цус болон тунгалгаар дамжина.
- C. Энэ нь архаг явцтай.
- D. Зөвхөн эмийн эмчилгээ хийгдэнэ.
- E. Заримдаа түгжрэл өгнө.

/187./ Цөсний сувагт нойр булчирхайн цорго нийлж, өрөнхий цорго болон 12 хуруу гэдэст нээгдэх нь хэдэн хувь вэ?

- A. 70-80%
- B. 75-85%
- C. 90-95%
- D. 40-50%
- E. 25-35%

/188./ 30настай эмэгтэйд үе үе толгой өвдөх, хөлрөх шинж илэрсэн. Түүний ээж нь бөөрний чулуутай байсан бөгөөд бамбай булчирхайн өмөнгөөр нас барсан гэсэн мэдүүлэгтэй. Эмэгтэйд бодит үзлэгээр бамбайн зангилаа тэмтрэгдэж байсан боловчбамбай булчирхайн үйл ажиллагааны алдагдлын шинж илрээгүй. Өвчтөнд бамбай булчирхайн хагалгаа хийхийн өмнө ямар шинжилгээ хийх шаардлагатай вэ?

- A. Бамбай булчирхайд сканировани хийх
- B. Бамбай булчирхайд эхосонографи хийх
- C. Теройд гормоныг чөлөөлөгч болон теройд гормоныг идэвхжүүлэгч гормонытувшинг тодорхойлох
- D. Кальц, фосфор, протеин, алкагейн фосфатазийн хэмжээ тодорхойлох
- E. 24 цагийн шээсэнд катехоламин, метанефрин тодорхойлох

/189./ Өвчтөн хоногт 10-15 удаа хүндээр бие засдаг, баасанд нь салс, цус, идээ агуулагдана, үе мөч нь өвдөнө, 38 хэм хүртэл халуурна. Өвчин хүрц байдлаар эхэлж, 4 сар үргэлжилж байгаа. Энэ өвчний илүү магадлалтай онош нь аль

- A. Бүдүүн гэдэсний шархлаат ердийн үрэвсэл
- B. Бүдүүн гэдэсний Кроны өвчин
- C. Хүрц цусан суулга
- D. Бүдүүн гэдэсний нэвчилт ур
- E. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн

/190./ Постстромбофлебитийн хам шинжийн үед хөлийн аль хэсэгт шархлаа үүсэх вэ?

- A. Гуянд
- B. Шилбэний гадна дунд хэсэгт
- C. Хөлийн тавхайд
- D. Шилбэний дотор, доод гуравны нэгд
- E. Шилбэний гадна доод 1/3 – д

/191./ Ямар шалтгаануудын улмаас улаан хоолойн далд гэмтэл үүсэх вэ?

- A. Шингэн ихээрүуснаас
- B. Эзофагоскопи
- C. Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа
- D. Бронхоскопи

Е. Химийн бодисоор түлэгдэх /хүчил, шүлт/

/192./ Ушигны хатгаа нь нянгийн, вирусийн, риккетсиоз, микоплазм, мөөгөнцөр, физик ба химийн нөлөөлөл, холимог ба тодорхой бус шалтгаантай байдаг уу?

А. Тийм

Б. Үгүй

/193./ Элэгний поликистозын/уйланхай өвчин/үедхийххагалгаанытохиромжтойхэмжээг сонгоно уу?

А. Элгийг анатомийн бус тайрах

Б. Элгийг анатомаар нь тайрах

С. Мулзлан авах /Эпуклеаци/

Д. Гадна оёдол тавих-гуурс тавьж гадагшлуулах

Е. Уйланхайгүүлөөлөн, хальсыг үлдээх

/194./ 2 хавтас хавхлагын дутагдлын эмнэл зүйн гол шинж

А. Амьсгаадалт

Б. Тахикарди

С. Зүрх орчим өвдөх

Д. Ушигны хаван, цустай цэр

Е. Нэг ба хоёр зөв

/195./ Мэс заслын аль эмчилгээ нь задгайлах арга вэ?

А. Бэтгийг элэгний хэсэгтэй цугтайрч авах

Б. Бэтгийн үйл анхайг нээж, суллаад хитин бурхүүлийг хусаж, арчин, чихээс тавих

С. Бэтгийн хөндийг цэвэрлэн, гуртставьж, гадагш гаргаж оёх

Д. Бэтгийн хитин бурхүүлийг хусаж, үлдэц хөндийг устгах

Е. Бэтгийн хөндийд сэмж чихэж оёх

/196./ Өндөр настай өвчтөний ходоодны бага махиан эхлэх хэсэгт байрлалтай шархлааг эмчлэх мэс ажилбарыг сонгоно уу?

А. Ходоодны инэнхий тайрах

Б. Сонгомол байдлаар тэнэмэл мэдрэлийг таслах

С. Сонгомол байдлаар тэнэмэл мэдрэлийг таслаж, гарах хэсгийг нээж, шархыг авч оёх

Д. Ходоодыг шантаг хэлбэрээр тайрах

Е. Ходоодны гарах хэсгийг тайрч, тэнэмэл мэдрэлийн үндсэн салааг таслах

/197./ Хэвлэлийн гялтангийн цочмог үрэвслийн үе шат:

А. Урвалжуе

Б. Зогсонгошлын үе

С. Үжлийн үе

Д. Эдгэрэлтийн үе

Е. Түүжрэлийн үе

/198./ 12 хуруу гэдэсний дээд арын хананд байрласан шарх нь зэргэлдээ эрхтэндээ цоорсон үед, ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ?

А. Бильрот 1-ийн дагуу ходоод тайрах

Б. Бильрот 2-ын дагуу ходоод тайрах

С. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу нугалаа гэдсийг гүүр хэлбэрээр нөхөн сэргээх

Д. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, нугалуур хэсгийг нээж, шархыг оёж хаах

Е. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдэст хэсэгчилсэн

/199./ Хашимотын аутоиммуны бахлуур нь далд "лабораторийн" гипотериозтой дагалдах уу?

А. Тийм

Б. Үгүй

/200./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үед аль эмчилгээ нь хамгийн зохистой вэ?

А. Хүчилтөрөгчийн эмчилгээ

Б. Цээжний хөндийд хатгалт хийх

С. Цээжний хөндийд гуурс тавих

Д. Цээжний хөндийг нээх

Е. Цээжний хөндийг нээж нөхөн сэргээх хагалгаа хийх

/201./ Дурдсан шинж тэмдгийн аль нь доод үе мөчний тромбофлебитэд хамаарах вэ?

- A. Тухайн тус газрын халуун нэмэгдэх
- B. Үе мөч хөндүүр болох
- C. Амьсгалахад хүнд байх
- D. Үе мөчний хэмжээ багасах
- E. Үе мөч хавдах

/202./ Ушигны цочмог хатгааны үед үрэвслийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойл

- A. 4 долоо хоногоос илүүгүй
- B. 6 долоо хоногоос илүүгүй
- C. 6 – 8 долоо хоног
- D. 8 долоо хоногоос илүү
- E. 9 – 10 долоо хоног

/203./ Элэгнийзүүн дэлбэнд хагалгаа хийх тохиромжтой хүрцийг заана уу.

- A. Хэвллийг голын шугамаар
- B. Баруун хавирганы нумаар
- C. 8 дахь хавиргаа хоорондын түвшинд хөндлөнгөөр
- D. Баруун талын цээж, хэвллийг хавсран нээх
- E. Зүүн хавирганы нумаар

/204./ Бэтэг хагарсан үед аль хүндрэл нь байх вэ?

- A.. Перитонит
- B. Хэвллийд чөлөөт шингэн хүрах
- C. Элэгний дутагдал
- D. Идээт гялтангийн үрэвсэл
- E. Хаалган венийн даралт ихсэнэ.

/205./ 1 см болон түүнээс бага хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд хэрэглэх мэс заслын оновчтой аргыг заана уу?

- A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах
- B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүслэг хийх
- C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- D. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах, шархлаанд зүслэг хийх нугалуурыг нөхөн сэргээх
- E. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх

/206./ Цээжний хөндийд дотроос нь хий хуралдсан үеийн доорх хүндрэлүүд аль нь амь насанд аюулий вэ?

- A. Арьсан доор хий хуралдах
- B. Дунд, завсарлагчийн эрхтэнүүд цочмог хазайх
- C. Хатгаа даамжирах
- D. Цээжний гялтан хальсны үрэвсэл даамжрах
- E. Ушигны дэлбэн шалчийх

/207./ Зүрхний цахилгаан идэвхийг ямар аргаар шинжлэх вэ?

- A. Баллистокардиографи
- B. Фонокардиографи
- C. Эхокардиографи
- D. Зүрхний цахилгаан бичлэг
- E. Аль нь ч биш

/208./ Элэгний паразит бус уйланхайн буруу тодорхойлолтыг сонго.

- A. Клиник явц шинж тэмдэг тодорхой
- B. Ихэвчлэн тараах хүндрэл: цусхарвах, идээлэх, хагарах
- C. Элэг, нойр булчирхай, дээрх гэдэс дарагдаж шарглалт үүсэх
- D. Оношлох багаж дутмаг нөхцөлд ердийн гэрэлд харж оношлоно.
- E. Гол оношлогоог чанд авиаагаартогооно

/209./ 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд мэс засал хийхдээ ямар аргыг сонгохоо заана уу?

- A. Шархлаанд зүслэлт хийх оёх
- B. 12 хуруу гэдсийг тайрах

С. Дурьдсан аргуудын аль нь болно

D. 12 гэдсийг зүсэх

E. Шархлаанд хүрэх шаардлагагүй

/210./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үед цээжний хөндийгөөс хий соруулах тохиromжтой арга нь:

A. Идэвхтэй вакум соруул

B. Идэвхгүй хавхлагт соруул/Бюолау/

C. Идэвхгүй хавхлагагүй соруул

/211./ Судас бөглөрлийн шинж илэрдэг Педжета – Шреттерийн хам шинж аль судсанд вэ?

A. Бугалганы хураагуур судас

B. Гүрээний гаднах хураагуур судас

C. Эгэмний хураагуур судас

D. Нүүрний хураагуур судас

E. Хөлийн хураагуур судас

/212./ Цээжний хөндийд хий хуралдах нь амьдралд хэр аюултай вэ?

A. Аюулгүй

B. Амиа алдах магадлал 10% хүртэл

C. Амиа алдах магадлал 25% хүртэл

D. Амиа алдах магадлал 50% хүртэл

E. Амиа алдах магадлал 100% хүртэл

/213./ Цээжний гялтан хальсны идээт үрэвслийн үед илрэх шинж:

A. Ханиалгахгүй

B. Өвчтөний байрлал идэвхтэй

C. Уруул ам хөхрөнө

D. Чагнахад ширүүн амьсгал сонсогдоно

E. Рентгенээр гялтанд шингэн тодорхойлогдоно

/214./ Фатерийн хөхлөгийг олох арга

A. Дээрх гэдсийг кохерийн аргаар суллана

B. Холедохотоми хийнэ

C. Сэтгүүрээр хөхлөгийг түлхэж овойлгоно

D. Дээрх гэдсийг 1.5 см зусэж нээнэ

E. Дээрх гэдсийг сэтгүүрдэнэ.

/215./ Бүдүүн гэдэсний полип ба полипозийн шинж аль нь вэ?

A. Бүдүүн гэдсээс хязгаарлагдмал цус алдарт

B. Өтгөн нэг хэсэг хатаж, нэг хэсэг гүйлгэнэ

C. Хундрэл мэдэгдэхгүй

D. Баастай хамт салст гарах

E. Хийгээр дүүрсэн бүдүүн гэдэс тэмтрэгдэнэ

/216./ Улаан хоолойн нарийсалт гэдэг нь:

A. Голч нь 1/3-ээс ихээр багасах

B. Голч нь 1/4-ээс ихээр багасах

C. Голч нь 1/2-оос ихээр багасах

/217./ Ямар шалтгааны улмаас улаан хоолой гэнэт хагарах вэ?

A. Улаанхоолой дурандахүед

B. Амсрын нарийсалтийг тэлэх үед

C. Беөлжих үед

D. Ястай мах залгих үед

E. Хүчил уухад

/218./ Гол судас – уушигны артерийн хооронд үүссэн цоорхойн оношлогооны чухал арга

A. Зүрх сэтгүүрдэх

B. Баруун вентрикулографи

C. Аортографи

D. Зүүн вентрикулографи

E. Флевографи

/219./ Цээжний баруун урд талаас нээхэд харагдах ушигны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын дарааллыг заа.

- A. Мөгөөрсөн хоолой - ушигны тараагуур судас + ушигны дээд хураагуур судас+ ушигны доод хураагуур судас
- B. Ушигны тараагуур судас - мөгөөрсөн хоолой + ушигны доод хураагуур судас+ ушигны дээд хураагуур судас
- C. Ушигны доод хураагуур судас- ушигны дээд хураагуур судас + мөгөөрсөн хоолой+ ушигны тараагуур судас
- D. Ушигны доод хураагуур судас-ушигны дээд хураагуур судас + ушигны тараагуур судас+ мөгөөрсөнхоолой

/220./ Парапротитийн халдварт орохгүй зам нь аль вэ?

- A. Шулнуун гэдэсний салстын бичил гэмтэл
- B. Хошногоны булчирхай
- C. Цусны замаар
- D. Гадны гэмтэл
- E. Шулнуун гэдсээр

/221./ Цэсний ерөнхий сувгийн интрамураль хэсгийн уртыг заана уу.

- A. 10-15 мм
- B. 10-20 мм
- C. 8-12 мм
- D. 20-25мм
- E. 25-30 мм

/222./ Олонтой тохиолддог бамбай булчирхайн үрэвсэлт өвчинүүдэд дараах өвчинүүдээс аль нь хамаарах вэ?

- A. Хурц тиреоидит буюу струмит
- B. Гүвгэр тиреоидит де Кервена- Крайл
- C. Лифоматозон тиреоидит буюу Хашимот
- D. Ширхэнцэрт Риделягийн тиреоидит
- E. Гиперпаратиреоидизм

/223./ Бүдүүн гэдэсний цүлхэнгийн зохистой эмчилгээ нь:

- A. Спазмолитик+хоолны дэглэм
- B. Бүдүүн гэдэсний булчинг дагууд нь ба хөндлөнгөөр нь зүсэх
- C. Цүлхэнг оёх
- D. Цүлхэнг тайрах
- E. Алсалсан залгалт

/224./ Зүүн титмийн arterи дараах хэсгээс бусад зурхний бүх хэсгийг цусаар хангадаг.

- A. Ховдол хоорондын таславчийн дээд 2/3-г
- B. Баруун ховдлын өмнөд хана
- C. Тосгуур хоорондын таславч
- D. Зүүн тосгуур, зүүн ховдлын өмнөд ба арын ихэнх хана
- E. Зүүн ховдлын орой

/225./ Улаан хоолойн дисфаги /хахаж цацах нь/ нь залгихын аль үед нь ажиглагдах вэ?

- A. Хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх I үед
- B. Хоол залгиураас улаан хоолойн хөндий руу түлхэгдэх II үед
- C. Хоол улаан хоолойгоор дунд ба доод 1/3-ийн хэсгээр дамжих III үед
- D. Хоол хodoодны амсарт орох үед
- E. Аль ч үед алдагдахыг хэлнэ.

/226./ Зүрхэн дээр хийгдэх хагалгаа нь юунаас хамаарч үр дүнд хурэх вэ?

- A. Мэдээгүйжүүлгийг зөв явуулах
- B. Хагалгааг гэмтэл bagatay хийх
- C. Цусны хөдлөл зүйн эмгэгийг бүрэн засах
- D. Хагалгааны дараах үр дүнтэй эрчимт эмчилгээ

/227./ Буруу тодорхойлолтыг сонго.

- A. Элэнний буглаа нь нянгийн болон паразитийн шалтгаантай байна.
- B. Бэтэг идээлсний улмаас буглаа үүсч болно.

С. Мухар олгойн, цөсний хүүдийн болон гэдэсний үрэвслээс халдвяруу дамжих болно.
Д. Эмчилгээний үндсэн зарчим нь мэс заслын бөгөөд буглааг нээж угаагаад улмаар биттуулж оёно.

Е. Олон тооны жижиг буграа нь мэс заслаар эмчлэх бололцоо муу 90% - ийн үхэлтэй.

/228./ Гол судасны нарийслийг оношлохын тулд ямар шинжилгээ шийдвэрлэх үүрэгтэй вэ?

- A. Дээд, доод үе мөчний даралт өөрчлөгдөх
- B. Эхокардиографи
- C. Аортографи
- D. Зүрхний цахилгаан бичлэг

/229./ Элэгний гун бус ба бага зэргийн шархнаас венийн цус алдахад доорхагалгааны аль арга нь тохиromжтой вэ?

- A. Шархыг оёх
- B. Шархыг өргөсгөж, судсыг боох
- C. Шарханд чихээс/тампон/хийх
- D. Самбайалчуурааршархандчихээсхийх
- E. Эмийн эмчилгээ хийж, ажиглах

/230./ 60 настай өвчтөнд каплээс захтай 12 хуруу гэдэсний шархлаа нь цоорчээ. Ямар мэс засал хийх вэ?

- A. Шархлаа оёно
- B. Тэнэмэл мэдрэлийг 2 ба 3-р зэрэглэлийг огтолж шархлааг зүсч авна
- C. Тэнэмэл мэдрэлийг 2-р зэрэглэлийг огтолж шархлааг зүсч авна
- D. Шархлаа зүсч аваад нугалуур нөхөн сэргээж, тэнэмэл мэдрэлийн багана ба 2-р зэрэглэлийн салааг огтлох
- E. Ходоод тайрах

/231./ Цочмог парапротитын үеийн зөв биш эмчилгээ нь:

- A. Зөвхөн эмийн эмчилгээ
- B. Идээг нээх
- C. Шарлагын хийх
- D. Идээт голомтод хатгалт хийж антибиотикаар угаах
- E. Ванн-д суулгах

/232./ 12 хуруу гэдэсний шархлааны хамгийн элбэг тохиолдох шинж тэмдгийг заана уу?

A. Өлөн үед өвдөлт өгнө. Хоол идсэний дараагаар аюулхай ба баруун суврэгсэд дор өвдөлт арилна

- B. Аюулхай орчимд хорсоно
- C. Идсэн хоол хүнсээрээ бөөлжкинэ
- D. Хошноогоос ягаан цус гарна
- E. Баруун суврэгсэдийн дор байнга өвдөнө

/233./ Улаан хоолойн нүхээр зонхиilon ямар эрхтэн ивэрдэг вэ?

- A. Ходоодны ёроол хэсэг
- B. Ходоодны дээд амсар
- C. Том сэмж
- D. Нарийн гэдэс
- E. Бүдүүн гэдэс

/234./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурахын хүндэрсэн шинж тэмдэг:

- A. Уушигны гялтангийн шок
- B. Амьсгал дутагдах шинж тэмдэг
- C. Хүчилтөрөгч дутагдах, цусны эргэлтийн үйл ажиллагаа
- D. Өвдөлт
- E. Цээжний хөндийн дунд завсарлагчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх үйл ажиллагааны хямрал

/235./ Зүрхний парасимпатик мэдрэлжүүлэлт:

- A. Хэл запгиурын мэдрэл
- B. Өрцний мэдрэлээр
- C. Тэнэгч мэдрэлээр
- D. Хэлэн доорх мэдрэлээр

Е. Улаан хоолойн мэдрэлээр

/236./ Облитерирующий эндоартеритийн үед захын цусны эргэлтийг аль шинжилгээний агаар нь тодорхойлох вэ?

- A. Артериографи
- B. Капилляроскопи
- C. Электротермометри
- D. Осиллографи
- E. Захын судасны лугшилтыг тодорхойлох

/237./ Цанх өвчинд багтах эмгэг нь:

- A. Чацаархайн судас бөглөрөх, бүлэнтэх
- B. Гэдэсний саажилт
- C. Цөсний зогсонго, шарлалт
- D. Мухар олгойн архаг үрэвсэл
- E. Цагаан цоройн ивэрхий

/238./ Элэгний идээт буглааны үед аль хагалгааг хийх вэ?

- A. Хэтавианы шинжилгээний хяналт дор буглаагхатгах ба гуурс
- B. Давтан хатгалтаар идээг гадагшлууланхөндийгугаах
- C. Элгийг тайрах
- D. Хэсэг газарт антибиотикийн эмчилгээ хийх
- E. Лазерийн туяагаар шарах

/239./ Ходоод, 12 хуруу гэдсэнд шархлаа нь ихэвчлэн хаана байрладаг вэ?

- A. 12 хуруу гэдэсний эхний хэсэгт
- B. Ходоодны орох хэсэгт
- C. Ходоодны гарах хэсэгт
- D. Ходоодны их махианы хэсэгт
- E. Ходоодны бага махианы хэсэгт

/240./ Гэнэт цээжний хөндийд дотроосоо хий хурах шалтгаан

- A. Уушигны архаг үрэвсэл
- B. Уушигны буглаа
- C. Цээжний гялтангийн наалдац салах
- D. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл, уушигны баттраа
- E. Уушигны уйланхайнууд

/241./ Облитерирующий эндоартеритад ямар мэс засал хийх вэ?

- A. Тромбоэтоми
- B. Артериоэктоми
- C. Поясничная симпатэктоми
- D. Флебэктоми
- E. Фасцоэктоми

/242./ Элэгний альвеококкозын үед аль хагалгаагнь хийх вэ?

- A. Уйланхайг бүлтлэн авах/эпуклеаци/
- B. Альвеококтоми
- C. Тайрч альвеококкийн хамт авах
- D. Фенестраци-альвеококкийг авч, хальсыг үлдээх
- E. Альвеококкийгэсэглэн авах

/243./ 12 хуруу гэдэсний шарх цоорсон үед хэвллийн баруун талын булчин чангардаг юутай холбоотой вэ?

- A. Рефлексээр
- B. Гэдэсний саажилт
- C. Хэвллийд хий орсоноос
- D. Пенетраци болсоноос
- E. Бусад

/244./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэх вэ?

- A. Ханиалгаж их цэр гарах
- B. Барабанны палочек-н шинж
- C. Тогшиход хөндийд дуттай байх

Д. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржинүүр

Е. Гэрэлд орой нь уушигны угруу чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагдах

/245./ Гол судас ба хоёр хавтаст хавхлагын нарийслын үед баруун урд ташуу байрлалд бари уулган улаан хоолойг хараад зүүн тосгуурын түвшинд байрлал нь өөрчлөгдөх үү?

А. Улаан хоолой нь бага радиусын нумаар хойшоо хазайна.

Б. Их радиусын нумаар хазайна

С. Байрлал нь өөрчлөгдхөгүй

/246./ Кардиоспазм үүсгэдэггүй шалтгаан нь аль вэ?

А. Сэтгэл санааны ужигдарамт-стресс

Б. Улаан хоолойн мэдрэлийн төрөлхийн гаж хөгжил

С. Рефлексийн гаралтай дисфункци

Д. Улаан хоолойн агшилтийн зохицуулга алдагдах /дискординаци/

Е. Улаан хоолойгоос цус алдах

/247./ Гол судасны нүхний нарийслын үеийн шинж

А. Гол судас нь нийтдээ өргөснө

Б. Гол судасны өгсөх хэсэг нь өргөснө

С. Гол судас нийтдээ нарийсна

Д. Гол судасны диаметр өөрчлөгдхөгүй

Е. Зөвхөн нарийслын дараа өргөснө

/248./ Шулуун гэдсэнд трецин үүсэхэд ямар фактор нь нөлөөлөх вэ?

А. Шулуун гэдэсний сфинктерийн анатомийн онцлог:

Б. Өтгөн хатах

С. Полипоз

Д. Цочмог парапроктит

Е. Бусад

/249./ 12 хуруу гэдэсний шарх цоороход өвдөлт нь хүчтэй биш байдгийг аль хүчин зүйлээр тайлбарлах вэ?

А. Цоороптын хэмжээ нь бага байдаг

Б. Ходоодтой харьцуулахад 12 хуруу гэдэсний агуулагдахуун нь үзүүлэх хөнөөлөөрөө бага

С. 12 хуруу гэдсэнд агуулагдах эзүйл нь бага

Д. Цооролт нь далд хэлбэрээр тохиолдох нь олон

Е. Цоорсон нүхээр гэдэсний агуулагдахуун бага гарна

/250./ Цөсний ерөнхий сувагт чулуу тээглэн 2 см-ээс илүү хэмжээгээр тэлэгдсэн тохиолдолд аль мэс заслын арга нь зохижмжтой вэ?

А. 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхлөгийг зүсэх

Б. Цөсний суваг нээж + сувагт гуурс тавих

С. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх

Д. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй залгах

Е. Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах

/251./ Өрц гэмтсэнд харуулах гол шинж тэмдгийг заана уу.

А. Гемоторакс /Цээжинд цусхуралдах

Б. Гемоневмоторакс

С. Дотор цус алдалт

Д. Цусаар шээх

Е. Гемофили

/252./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийн хамгийн их тохиолддог хүндрэлий-заана уу?

А. Ходоод гэдэсний цус адалт

Б. Рефлюкс-эозфагит

С. Ивэрхийн доторх зүйлүүдийн үхжил

Д. Ходоод гэдэсний доторх агуулагдахууны шилжилт /пассаж/ алдагдах

Е. Зурхний хэмнэл алдагдах

/253./ Хашимот-ын бичил эсийн гол шинж нь:

А. Сууриараа ургана.

Б. Тиреоцит жигд бус нэмэгдэнэ.

С. Лимфын эд томорно.

/254./ Улаан хоолойн ЭКГ-н бичлэгээр насанд хүрсэн хүмүүст өмнөд шүднээс ямар зайд хамгийн өндөр "Р" шүд байх вэ?

- A. 15-20см
- B. 20-25см
- C. 25-30см
- D. 30-35см
- E. 35-40см

/255./ Ахалази кардиоспазмын эмгэгжамыг нэрлэ.

- A. Юм залгисны дараа амсар агших
- B. Улаан хоолойн булчин байнга агших
- C. Улаан хоолой амсын булчин супрахгүй болох эсвэл дутуусулах
- D. Ходоод агшилтгүй болох /атони/

/256./ Ямар arteri нь булчин доорх arteri болон үргэлжилдэг вэ?

- A. Эгмийн доорх arteri
- B. Эгмийн дээрх arteri
- C. Нурууны arteri
- D. Бугалганы arteri
- E. Хүзүүний хэндлэн arteri

/257./ Хаалган венийн даралт ихсэх хам шинжийн зонхилох шалтгааныг заана уу.

- A. Бадда - Киорийн хам шинж
- B. . Киарийн өвчин
- C. Элгэн доторх цусны урсгалын saataltай элэгний хатуурал
- D. Сентын турвал эмзэг
- E. Элэгний өмнөх цусны урсгалын saatал

/258./ Орос улсад зүрх-судасны мэс заслын хүрээлэн хэдэн онд байгуулагдсан бэ?

- A. 1948
- B. 1954
- C. 1956
- D. 1960
- E. 1962

/259./ Элэг хоногт хэдий хэмжээний цөс ялгаруулах вэ?

- A. 800-1200 мл
- B. 900-1300 мл
- C. 1000-1500 мл
- D. 1600-2200 мл
- E. 2300-3000 мл

/260./ Мондорын турвал нь ходоод арван хоёр хуруу гэдэсний цооролттой шархны эмнэл зүйг тодорхойлно. Энэ турвалд орорхгүй шинж тэмдэг аль вэ?

- A. Өвчин эхлээд өвдэлт өгсний дараагаар нэг удаа бөөлжих
- B. Хэвллийн дээд хэсэгт хутгалдаж байгаа юм шиг хүчтэй өвдөх
- C. Хэл хуурайших, ундаасах
- D. Хэвллийн урд ханын булчингууд чангараах самбар шиг хатуу болно
- E. Хэвллийн хөндийд хий хуралдсан шинж тэмдэг / тогшиход элэгний дүлий чимээ арилсан, рентген шинжилгэээр өрцний дор хий тодорхойлогдоно

/261./ 12 хуруу гэдэсний том хөхлөгийн амсарын голчийн хэвийн хэмжээг заана уу?

- A. 3-3.5 мм
- B. 1.0 мм
- C. 2.0 мм
- D. 2.5 мм
- E. 4-4.5 мм

/262./ Өрцний ивэрхийн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу.

- A. 10%-аасбага
- B. 20-40%
- C. 41-60%

D. 61-80%

E. 81%-иасдээш

/263./ Эндемийн бахлуур үүсгэх үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү.

A. Хүрээн орчинд химиин болон ургамлын гаралтай струмоген байх

B. Пуберратуе

C. Йодоор бие махбодь дутагдах

D. Хүний бие махбодид интратиреоидын солилцоо алдагдах

E. Сэтгэл санааны хүнд дарамт

/264./ Хэм алдалтын анализ хийхийн тулд ЭКГ-н урт хугацааны бичлэг хийхийг /ЭКГ мониторирование/ хэн анх гаргасан бэ?

A. Gilson

B. Hinkle

C. Holter

/265./ Зүүн тосгуурын миксом нь аль гажгийн үедтохиолдох вэ?

A. 2 хавтаст хавхлагын нүх нарийсан үед

B. 2 хавтаст хавхлагын дутагдал үүссэн үед

C. Зүүн атриовентрикуляр нүхний нарийсал ба дутагдал

/266./ Химиин түлэгдэл авснаас хойш 1-2 долоо хоногийн дараагаар улаан хоолойг хэр олон удаа сэтгүүрдэх вэ?

A. Өдөрт 3 удаа

B. Өдөрт 2 удаа

C. Өдөр бүр

D. Өдөр өнжөөд

E. Гурван хоногт 1 удаа

/267./ Гол судас ба хоёр хавтаст хавхлагын нарийслын үед баруун урд ташуу байрлалд бари уулган улаан хоолойг харахад хэрхэн хазайх вэ?

A. Бага радиусын нумаар

B. Их радиусын нумаар

C. Улаан хоолой нь хазайхгүй

/268./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан эмгэгийн эмчилгээ үр дүн өгөхгүй байгаа шалтгааныг ямар шинжилгээгээр зөв илрүүлж чадах вэ?

A. Цээжний хөндийн тойм рентген зураг

B. Ушигны зураг авах

C. Ушиг дурандах

D. Цээжний хөндийг дурандах

E. Хэт авиан шинжилгээ

/269./ Нугалуур 12 хуруу гэдэсний нарийслийн үед ямар заалтаар тэнэмэл мэдрэлийг таслах вэ?

A. Ээнэгшилтэй нарийсалт

B. Хагас ээнэгшилийн нарийсал

C. Агших үйл ажиллагаа нь хадгалагдаж буй ээнэгшлээ алдсан нарийсал

D. Ходоодны шархлаатай нугалуур, 12 хуруу гэдэсний нарийсал

E. 12 хуруу гэдэсний илэрхий нарийсал

/270./ Цөсний өрөхийн суваг идээлсэн болон беглэрсөний улмаас шарласан үед з-ибиотик тарих зохистой хугацааг заана уу.

A. Мэс засал хийлгэхээс 3-4 хоногийн өмнө

B. Мэс засал хийлгэхээс 1-2 хоногийн өмнө

C. Мэс засал хийлгэхээс нэг хоногийн өмнө

D. Мэс засал хийлгэхээс нэг цагийн өмнө

E. Мэс засал дуусмагц

/271./ Шамбарам үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл юу вэ?

A. Хэвлэйн дотоод даралт ихдэх

B. Удаан гүйлгэх

C. Өтгөнөө тасалж гаргах

D. Хэвлэлийн эрхтэний өвчинүүд

Е. Удаан явган явах

/272./ Ушигны тараагуур судасны тромбоэмбилийг оношпоход доорх аргуудын аль нь илүү үр дүнтэй вэ?

- A. Ушигны зураг авах
- B. Зүрхний цахилгаан бичлэг
- C. Рентген зураг авалт
- D. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн зураг авах
- E. Ангиопульмонографи

/273./ Холедохоеюноанастомоз нь бусад залгааснаас давуу талтай нь:

- A. Рефлюксхолвнгит үүсдэггүй.
- B. Дээрх гэдэс татагдах, деформац болохгүй
- C. Гэдэс ходоодны зам хангалттай тусгаарлагдана.
- D. Залгаасны нүх нарийсана.
- E. Хэвлийд наалдац үүсэх магадлалтай.

/274./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний үед ивэрхийн агуулагдахуунд үжжил хэрхэнүүсэх вэ?

- A. Өвчтөнүүдийн 10-аасбага хувьднь
- B. Өвчтөнүүдийн 20-40 хувьд нь
- C. Өвчтөнүүдийн 41-60 хувьд нь
- D. Өвчтөнүүдийн 61-80 хувьд нь
- E. Өвчтөнүүдийн 81-иасдээш хувьд нь

/275./ Гэдэсний ямар түүхрэлийн үед доошоо цус гарах вэ?

- A. Парез болоход
- B. Динамик
- C. Чихэлдэх
- D. Гэдэс ороолдох
- E. Гэдэсний инфант

/276./ Улаан хоолойн нүхээр зонхилон ямар эрхтэн ивэрдэг вэ?

- A. Ходоодны ёроол хэсэг
- B. Ходоодны дээд амсар
- C. Том сэмж
- D. Нарийн гэдэс
- E. Бүдүүн гэдэс

/277./ Элэгний хатууралын үед улаан хоолой болон түүний амсрын хураагуур судас өргөссөний улмаас цус алдаж нас барах гол шалтгаануудыг заана уу.

- A. Цус алдсанаас шоконд орох
- B. Элэг бөөрний дутмагшил
- C. . Цус алдалтын дараах цус багадалт
- D. Элэг хатууралтаас үүсэх хямралууд
- E. Элэгний даамжирсан дутагдал

/278./ Бүдүүн гэдэсний баруун хэсгийг цусаар хангах судас нь аль вэ?

- A. Дээд чацаархайн тараагуур судас
- B. Доод чацаархайг тараагуур судас
- C. Ташааны дотуур баруун тараагуур судас
- D. Ташааны дотуур зүүн тараагуур судас
- E. Гэдэсний гол судас

/279./ Тосгуур ховдлын зангилааны булчингаар импульс ямар хугацаанд тархах вэ?

- A. 0.2 мс
- B. 0.4 мс
- C. 0.6 мс
- D. 0.8 мс
- E. 4 мс

/280./ Цээжний голчийн идээ үүсэх шалтгаан нь аль вэ?

- A. Улаан хоолойн гэмтэл
- B. Цээжний бэртэл

С. Хүзүүний идээт үрэвсэл

Д. Цусаар халдвэр дамжих

Е. Тунгалааг зангилаа задрах

/281./ Кардийн ахализийн 1-Н үеийн хамгийн үр ашигтай эмчилгээг заана уу.

А. Спазмолитик эм хэрэглэх

Б. Улаан хоолойн доод хэсгийн хуниасыг /сфинктер/ тэлэх

С. Эзофагомиотоми

Д. Улаан хоолой-ходоодны уулзварын тайралт

Е. Антирефлюксын хагалгаа

/282./ Ходоодны гарах хэсэг нь нарийсан ээнэгшилээ алдсан 12 хуруу гэдэсний шархлаанд хийх оновчтой мэс заслын аргыг заана уу?

А. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах

Б. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслаж, нугалуурыг нөхөн сэргээх

С. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслаж, нугалуурыг нөхөн сэргээх

Д. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах

Е. Ходоодны 2/3-г тайрах

/283./ Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн цооролтыг эмчлэх аргыг сонгоно уу.

А. Ходоонд байнгын зонд тавьж, антибиотик эмчилгээ хийх

Б. Хэвтрэйн дэглэм

С. Хүзүүний хүрцээр мэс засал хийж, цоорхойг оёж, урд голчид гуурс тавьж антибиотик эмчилгээ хийх

Д. Мэс засал хийж, улаан хоолойг тайрч, бүдүүн гэдсээр орлуулан залгаж, антибиотик эмчилгээ хийх

Е. Дурангийн тусламжтай нүхийгбөглөх

/284./ Элэг доторх хаалган венийн дараалт ихэссэний улмаас улаан хоолойн хураагуурсудаснаас цус алдаж буй үед хийх зохистой мэс засал нь юу вэ?

А. Улаан хоолойн хураагуур судсыг оёх

Б. Хаалган венийгдоод хөндий вени-тэй залгах

С. Дэлүү авах

Д. Улаан хоолойн хураагуур судсанд хатууруулах эмчилгээ хийх

Е. Улаан хоолойд Блекморын гуурставих

/285./ Гэнэт цээжний хөндийд дотроосоо хий хурах шалтгаан

А. Уушигны архаг үрэвсэл

Б. Уушигны буглаа

С. Цээжний гялтангийн наалдац салах

Д. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл, уушигны багтраа

Е. Уушигны үйланхайнууд

/286./ Гол судасны хавхлагын дутагдлын үед эгц байрлалд зүүн ховдлын нумны байдал өөрчлөгдхөх үү?

А. Дугуйрсан байдалтай

Б. Уртассан, нум нь дугуй биш

С. Өөрчлөгдхөгүй

/287./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдаад хийг гадагш зайлцуулах эмчилгээ үр дүн өгөхгүй бол яах ёстой вэ?

А. Цээжний хөндийд гуурс тавих

Б. Идэвхтэй соруулалтын тогтолцоонд шилжүүлэх

С. Хагалгаа хийх

Д. Өвчтөнийг мэргэшсэн эмнэлэгт шилжүүлэх

/288./ Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх хагалгааны хэлбэр

А. Уушигны гэмтлийг оёх

Б. Гурвалжин хэлбэрээр уушигнаас зүсэж авах

С. Уушигны дэлбээг тайрах

Д. Уушгийг бүтнээр нь авах

Е. Гэмтсэн хавиргыг бэхлэж боох

/289./ Холедохолитазийн үед цөсний өрөнхий цоргонд тавих хамгийн тохиromжтой хэлбэрийн гуурс аль нь вэ?

- A. Обуховскийн
- B. Т-хэлбэрийн
- C. Цөсний цоргоор нь дамжуулан
- D. Киарын
- E. Полиэтиленовийн

/290./ Лимфедемийн оношлогоонд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь

- A. Гэмтсэн мөчний рентгенографи
- B. Артериографи
- C. Флебографи
- D. Лимфангиографи
- E. Ультразвуковой допплерографи

/291./ Гэдэсний цочмог түгжрэлийн тэгс оношлох арга нь аль вэ?

- A. Хэвлэлийн тойм харалт
- B. Бүдүүн гэдсийг дурандах
- C. Тодотгогч бодисын тусламжтай гэдэсний хэндий замуудыг тодорхойлох
- D. Ходоод, нарийн гэдэсний дээд хэсгийг дурандах
- E. Хэвллийг нээж шалгах

/292./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний гулсамтгай ивэрхийн шинж тэмдгийг заана

- A. Өвчүүний араар хорсож битүүвдэх
- B. "Хуурамч" зүрх цухалдах
- C. "Шнур-ботинк"-ийн шинж
- D. Хязгаардмал цус алдалт
- E. Юм залгиж, чадахгүй байх

/293./ Элэгний шархнаас ихээр цус алдахад ямар хагалгааг хийх нь тохиromжтой вэ?

- A. Шархыг оёх
- B. Шарханд, чихээсхийх
- C. Шархыг өргөсгөж, судсыг боох
- D. Элэгний өөрийнх нь артерийн судсыгбоох
- E. Элэгний гэмтсэн хэсгийгтайрах

/294./ Бүдүүн гэдэснээс цус хамгийн их алддаг шалтгаан нь аль вэ?

- A. Дивертикулит
- B. Бүдүүн гэдэсний цусан хангамж багассан үрэвсэл
- C. Дивертикулэз
- D. Сиплодиспази
- E. Бүдүүн гэдэсний хавдар

/295./ Хэвийн үед Гисс-Пуркинье-гийн ширхэгээр импульс ямар хугацаанд дамжих вэ?

- A. 10-30 мс
- B. 30-60 мс
- C. 60-90 мс
- D. 90-120 мс
- E. 120-с их мс

/296./ Ямар шинж цочмог голчийн үрэвсэлд илрэхгүй вэ?

- A. Халууры чичруулэх
- B. Зүрх дэлсэх, амьсгаадах
- C. Толгой гэдийх үед ихэсдэг, өвчүүний арын өвдөлт
- D. Гэрэлд хараад голчийн сүүдэр өргөссөн
- E. Гэрэлд хараад голчийн сүүдэр нарийсах

/297./ Б.В.Петровскийн ангиллаар улаан хоолойн ахалази дөрвөн үе шаттай байдаг. Мэс заслын эмчилгээ хийх үе шатыг заана уу.

- A. Бүх үе шатанд
- B. 1-рүешшатанд
- C. 2-3—р үе шатанд
- D. 3 ба 4-р үе шатанд

E. 4-рүешатанд

/298./ 12 хуруу гэдэсний шархлааны улмаас эрхтэн үлдээх мэс засал хийсний дараагаар засахад төвөгтэй хүндэрлүүдийг заана уу?

- A. Шархлааны дахих
- B. Дэмпнингийн хам шинж
- C. Тэнэмэл мэдрэл тасалсаны дараахи чацга алдалт
- D. Цэс чулуужих өвчин
- E. Ходоодны ханын үхжилт

/299./ Улаан хоолойн Ахалазид аль нь хамаarahгүй вэ?

- A. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн ганглионар эс нь алга болох бу өөрчлөгдсөн байна.
- B. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн даралт хэвийнхээсээ доогуур
- C. Энэөвчин 30-50 насны хооронд зонхилон тохиолдоно.
- D. Өвчтөн халуун хоол залгихаасаа хүйтэн хоол залгихад хөндүүрлэнэ.
- E. Улаан хоолойн хорт хавдараар өвчлөх эрдэл 7 дахин их байна.

/300./ Улаан хоолойн вен өргөссөнөөс хаалган венийн даралт ихсэх ба цус алдахи хийх мэс ажилбарын зохистой хэлбэрийг сонгоно уу.

- A. Улаан хоолойн хураагуур судсыг оёх
- B. . Дэлүүний байршалыг сонгох
- C. Хаалган хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судастай залгах
- D. Дэлүү авах
- E. Сэмжийг элгэнд бэхлэх

/301./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэх вэ?

- A. Ханиалгаж их цэр гарах
- B. Барабаны палочек-н шинж
- C. Тогшиход хөндий дутай байх
- D. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр
- E. Гэрэлд сорой нь уушигны угуру чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагдах

/302./ Гол судасны хавхлагын нарийслын үед зүүн ховдлын нумны байдал нь:

- A. Дугуйрсан байдалтай
- B. Дугуй биш байдалтай
- C. Өөрчлөгдхөгүй

/303./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үед эмчилгээ амжилтгүй болох шалтгаан:

- A. Эмчилгээг оройтуулж эхлэх
- B. Уушигны эд их эвдрэлтэй байх
- C. Уушигны эмзэгний өөрчлөлтүүрэвсэл, уушиг тэлэгдэх өвөрмөц үрэвслүүд
- D. Эмчилгээг буруу сонгох
- E. Уушиг жигд бусаар тэнийх

/304./ Цээжний битүү гэмтэл уушигны гэмтэлтэй хавсарсан үед хийгдэх эмчилгээний арга нь:

- A. Ерөнхий эмчилгээ
- B. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- C. Яаралтай хагалгаа хийх
- D. Уушгинд хиймэл амьсгал хийх
- E. Цээжний хөндий дурандах

/305./ 12 хуруу гэдэсний дээд арын хананд байрлалтай эрхтэн рүүгээ цоорсон шархлааг ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ?

- A. Бильрот 1-ээр ходоод тайрах
- B. Бильрот 2-оор ходоод тайрах
- C. Тэнэмэл мэдрэлийг тайрч, гэдэст гүүр хэлбэрийн нөхөн сэргээлт хийх
- D. Тэнэмэл мэдрэлийг тайрч, нугалуур хэсгийг нээж, шархыг оёх
- E. Тэнэмэл мэдрэлийг тайрч, 12 хуруу гэдсэнд үечилсэн нөхөн сэргээлт хийх

/306./ . Цэсний ерөнхий цоргоны зонхилон залгаас хийдэг хэсэг нь:

- A. Супрадуоденаал
- B. Элзгний

- C. Нойр булчирхайн
- D. 12 хуруу гэдэсний
- E. Ходоодны

/307./ Шулувун гэдэснээс цус алдах, тэлэгдэх, цооролт үүсэх, өмөн үүд шилжих хүндрэлүүд нь бүдүүн гэдэсний аль өвчний үед тохиолдох вэ?

- A. Бүдүүн гэдэсний өмөн үү
- B. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн үүсэх өвчин
- C. Гэдэсний хижиг
- D. Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц биш шархлаат үрэвсэл
- E. Пейтц-Егерсийн хам шинж

/308./ Ахчдагч лимфедем нь аль вэ?

- A. Лимфийн судасны аплази
- B. Лимфийн судасны гипоплази
- C. Лимфийн судасны гиперплази
- D. Лимфийн судасны аплази ба аплази ба гипоплазм
- E. Бүгд

/309./ Цэсний суваг төгсгөл хэсэгтээ нарийч, цэсний ерөнхий сувалны голч 2 см-ээсөргөссөн үед хийх тохиромжтой мэс засал нь аль вэ?

- A. А 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхлөгийг зүсэх
- B. Цэсний ерөнхий суваг нээж, сувгаар гуурс гадагшлуулах
- C. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх
- D. Цэсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй залгах
- E. Цэсний ерөнхий цоргыг 12 хуруу гэдэстэй залгах

/310./ Ихэвчлэн тохиолддог өрцний ивэрхийний төрлийг заана уу.

- A. Жинхэнэ ивэрхий
- B. Хуурамч ивэрхий
- C. Төрөлхийн ивэрхий
- D. Өрцний улаан хоолойн нүхний ивэрхий
- E. Гэмтлийн дараах ивэрхий

/311./ Хэвлэний гялтангийн цочмог үрэвслийн хожуу шатанд аль шинж нь илрэх вэ?

- A. Гэдэс дүүрэх
- B. Хэвлэлий тэлэгдэх
- C. Гэдэсний гурвэлзэх хөдөлгөөн ихсэх
- D. Гэдэсний гурвэлзэх хөдөлгөөн арилах
- E. Олон удаа бөөлжих

/312./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний зонхилон тохиолддог хүндрэлийг заана уу?

- A. Ходоод гэдэсний цус адалт
- B. Рефлюкс-эозфагит
- C. Ивэрхийн агуулагдахууны үхжил
- D. Ходоод гэдэсний доторх агуулагдахууны шилжилт /пассаж/ алдагдах
- E. Зүрхний хэмнэл алдагдах

/313./ Элгэн дээрх хоригт аль өвчин нь орох вэ?

- A. Элэгний хавдар
- B. Хаалган венийн саатал
- C. Зурхэнд орох хэсэгт доод хөндий венийн нарийсал
- D. Зурхний зүүн талын дутагдал
- E. Үүдэн венийн саатал

/314./ Ходоодонд тодруулагч бодис ямар хугацаагаар saatval түгжрэл гэж үзэж болох вэ?

- A. 1-2цаг
- B. 3-4 цаг
- C. 5-6 цаг
- D. 8-10 цаг
- E. 10 цагаас дээш

/315./ Хэвийн үед синусийн зангилаанаас тосгур ховлдын зангилаа руу импульс нь ямар хэмжээтэй байх вэ?

- A. 5-9 мс
- B. 9-45 мс
- C. 45-60 мс
- D. 60-120 мс
- E. 120-140 мс

/316./ Архаг эмпиемийн шинж тэмдэг:

- A. Ханиалгахгүй, халуурахгүй
- B. Цээжний хэлбэр өөрчлөгдхүй
- C. Хавирга завсрын зайд нарийсна.
- D. КТГ-д плеврийн хананд шингэн байна.
- E. Арысан дор хий хурна.

/317./ Цагаан мөгөөрсөн хоолой байнга агших эслиоспазмын эмчилгээ:

- A. Нойрсуулах эмчилгээ
- B. Эмийн эмчилгээ
- C. Улаан хоолойтэлэх /кардиодиплетаци/
- D. Физик эмчилгээ
- E. Рашиан, шавар эмчилгээ

/318./ 1 см болон түүнээс том хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний хүндрээгүй шархлаанд хийх оновчтой мэс заслыг заана уу?

- A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах
- B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүслэг хийх
- C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүслэлт хийх нугалуурыг нөхөн сэргээх
- D. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуур нөхөн сэргээх
- E. Ходоодны гарах хэсгийг тайрах, тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах

/319./ Ахалази үүсэх эмгэг жам аль нь вэ?

- A. Улаан хоолойн үрэвслээс
- B. Улаан хоолойн доод сфинктерийн даралт өөрчлөгдсөнөөс
- C. Юм залгихад анхдагч давалгаа доошоо чиглэлтэй үүсч кардийг нээдэг үйл ажиллагаа алдагдсанаас
- D. ДХэвлэлийн доод даралт өөрчлөгдсөнөөс
- E. Улаан хоолойн ханын анатоми өөрчлөгдсөнөөс

/320./ Насанд хүрсэн өвчтөний хаалган венийн даралт ихсэх хам шинжийн зон шалтгааныг сонгоно уу.

- A. Дэлүү томрох
- B. Гиперспленизм
- C. Улаан хоолой, хэвллийн урд хана, шулнуун гэдэсний хураагуур судас зач-У бүдүүрэх
- D. Улаан хоолойн хураагуур судаснаас цус алдах

/321./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэх өвчний үед ямар шинж илрэх вэ?

- A. Ханиалгаж их цэр гарах
- B. Барабанны палочек-н шинж
- C. Тогшиход хөндийд дуутай байх
- D. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр
- E. Гэрэлд орой нь уушигны угруу чиглэсэн гурвалжин суудэр харагдах

/322./ Орос улсад зүрх-судасны мэс заслын хүрээлэнг хэн үндэслэсэн бэ?

- A. Б.А.Петровский
- B. В.И.Бураковский
- C. А.Н.Бакулов
- D. В.С.Савельев
- E. С.А.Колесников

/323./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдсан эмгэгийг эмчлэх арга:

- A. Тайван байлгаж, шимэгдүүлэх эмчилгээ хийх
- B. Цээжний хөндийд пункц хийж, хийг соруулах
- C. Цээжний хөндийд гуурс тавих

D. Хагалгаа хийх

E. Цээжний хөндийг дурандах

/324./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед уушгийг гэмтээсэн шинж тэмдэг нь:

A. Өвдөлт

B. Амьсгалах ажиллагаа алдагдах

C. Гэмтсэн талд амьсгалын чимээ сонсогдохгүй байх

D. Гэмтсэн талд хуурай хэрчигнуур сонсодох

E. Гэмтсэн талд нойтон хэрчигнуур сонсодох

/325./ 12 хуруу гэдэсний зогсонгишилтой шархлааны үед ходоод тайрах оновчтой аргыг заана уу?

A. Бильрот-1-ээр тайрах

B. Биолърот-2-оор, Гофмейстер-Финстерерээр

C. Бальфур-аар

D. Ру-гээр

E. Райхель-Попия-гаар

/326./ Цөсний цочмог үрэвслийг голчлон үүсгэдэг шалтгаан нь:

A. Цөсний хүүдийн цоргын бөглөрөл

B. E. Coli халдвэр

C. Паразитын халдвэр

D. Цөсний хүүдийн олон жижиг чулуу

E. Сальмонеллын халдвэр

/327./ Шулцуун гэдэсний цоорхой нь хуниасын дотор ба хуниасын гадна байрласан үед хагалгааны төрлийг заана уу.

A. Габриэлийн зүсэлт

B. Селивановын зүсэлт

C. Блинничевын хагалгаа

D. Ганн-Манннын хагалгаа

E. Борисын хагалгаа

/328./ Гүрээний венийн цүлхэн үүсэх нь:

A. Гэмтлийн

B. Төрөлхийн

C. Олдмол

D. Гэмтлийн ба олдмол

E. Бүгд

/329./ Дарагдсан хэлбэрийн гэдэсний түгжрэл аль нь вэ?

A. Узлообразование /зангирах/

B. Гэдэс нь наалдаж түгжрэх

C. Гэдэсний саажилт

D. Гэдэс агших

E. Гэдэсний хөндий хавдраар бөглөрөх

/330./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний үед ивэрхийн агуулагдахуунд үхжил хэрхэнүүсэх вэ?

A. Өвчтөнүүдийн 10-аасбага хувьднь

B. Өвчтөнүүдийн 20-40 хувьд нь

C. Өвчтөнүүдийн 41-60 хувьд нь

D. Өвчтөнүүдийн 61-80 хувьд нь

E. Өвчтөнүүдийн 81-иасдээш хувьд нь

/331./ Хэрвээ та элэг тайрах төхникийг эзэмшээгүй байхад элэгнийшархнаас хүчтэй цусалдалт тохиолдвол аль аргыг нь сонгох вэ?

A. Шархыг оёх гэж орлдоно.

B. Шархыг өргөгөж, судсыг боох

C. Элэгний өөрийнх нь артерийн судсыг боох

D. Шарханд чихээс хийх

Е. Баруун хавирганд элгийг нягт дарж өрц ба хэвлийн арын гялтан хальсанд П хэлбэрийн оёдлоор бэхлэх

/332./ Хоёрдогч хожуу үүсэх наалдаст түгжрэл хэдийд үүсэх вэ?

- A. 10-15 хоногт
- B. 16-20 хоногт
- C. 21-25 хоногт
- D. 26-30 хоногт
- E. 30-аас дээш хоногт

/333./ Хоногийн зүрхний тасралтгүй бичлэг хийх үед /хоногт 50 экстрасистол гарах нь хэвийн/ ховдлын экстрасистол эрүүл залуу хүмүүсийн хэдэн хувьд нь байдаг вэ?

- A. 0%
- B. 5%
- C. 25%
- D. 50%
- E. 100%

/334./ Цээжний ханын дотор хальсны үрэвслийн 3 үндсэн онцлог чанарыг нэрлэ.

- A. Хориглох үйл + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + сорох өндөр чадвар
- B. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + уушгаа хамгаалах чадвар
- C. Хориглох үйл + шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар
- D. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + сорох өндөр чадвар + төлжих чадвар
- E. Бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + төлжих чадвар + евчнөөс уушгаа хамгаалах чадвар

/335./ Залуу эмэгтэйд шингэн зүйл залгихад сааталтай, буцаж гулигуулж байв. Эзофагоманометрийн үед улаан хоолойн доод хуниас ажиллагаагүй байв. Ямар онош тавих вэ?

- A. Улаан хоолойн хорт хавдар
- B. Пламмер-Винсоны синдром
- C. Рефлюкс-эзофагит
- D. Өрцний дээд талын улаан хоолойн дивертикул
- E. Ахалази карди

/336./ 12 хуруу гэдэсний хүндрээгүй шархлаанд хийх оновчтой мэс заслыг заана уу?

- A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- B. Тэнэмэл мэдрэлийг захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх
- C. Ходоодыг тайрах
- D. Шархлаанд зүсэлт хийх, тэнэмэл мэдрэлийг багана хэсгээр таслах
- E. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах

/337./ Ахалази кардийн эмчилгээний үндсэн зарчмыг заана уу.

- A. Ходоод, гэдэсний рефлюксыг устгах
- B. Сорвижсон эдэд улаан хоолойн дагуу эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх
- C. Сорвижсон эдэд улаан хоолойд хөндлөнгөөр эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх.
- D. Сорвижсон эдийгзүсах
- E. Сорвин өөрчлөгдсөн улаан хоолойг тайрах

/338./ Доод мөчний хураагуур судасны цусны урсгалын зогсонготой ужиг шархыг эмчлэх арга нь:

- A. Даралттай боолт
- B. Шархны ирмэгийг өөлж аваад оёх
- C. Арьсанд нөхөн сэргээх мэс засал хийх
- D. Хураагуур судасны цусны урсгалыг сэргээх
- E. Тосон боолтоор эмчлэх

/339./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг эмчилж болох аргыг заана уу.

- A. Эмийн эмчилгээ
- B. Агаар эмчилгээ
- C. Мэс заслын эмчилгээ

/340./ Орос улсад зүрхний олдмол гажгийн хагалгааг анх хэн хийсэн бэ?

А. А.Н.Бакулов
В. А.А.Вишневский
С. Б.А.Петровский
Д. Е.Н.Мешалкин
Е. П.А.Куприянов

/341./ Цээжний хөндий дотроосоо хий хуралдахыг оношлоход мэдүүлгийн ач холбогдол

- А. Ушигны хурц үрэвсэл
- Б. Ушигны архаг үрэвсэл
- С. Биений хүчний ачаалал
- Д. Шалгаан нь тод бус
- Е. Хүчтэй ханиалга, ушигны доторх даралт ихсэх

/342./ Мэс заслын тасагт цээжний хөндий ушиг гэмтсэн тохиолдолд гүйцэтгэх эмчилгээ:

- А. Шокийн эсрэг эмчилгээ
- Б. Цээжний хөндийд гуурс тавих
- С. Мэс заслын бус эмчилгээ
- Д. Яяралтай хагалгаа хийх

/343./ Мэс заслын өмнө ходоод, арван хоёр хуруу гэдэсний цоорсон шархыг эвдрэлтэй цочмог мухар олгойн үрэвсэлээс ялгаж чадсангүй. Ямар мэс заслын ямар хүрдэц сонгох вэ?

- А. Хэвлэйн дээд голын зүслэг
- Б. Хэвлэйн дээд голын зүслэгийг аймхай мөгөөрс хүртэл уртасган өргөтгөх
- С. Хэвлэйн хажуугийн зүслэгийг хавирганы нум хүртэл өргөтгөх
- Д. Мак-Бурнен, Дьяконов-Волковчийн аргаар хэвлэлийг нээж, цооролттой шархлааг олж илрүүлэхийн тулд хэвлэлийн дээд голын зүслэг нэмж хийх
- Е. Хэвлэйн голын өргөтгөсөн урт зүслэг

/344./ Цэсний замын сфинктерийн үйл ажиллагааг зохицуулах эмийг нэрлэ.

- А. Но-шпа
- Б. Церукал
- С. Фүразолидон
- Д. Феноп
- Е. Холезин

/345./ Шулзуун гэдэсний эргэн тойрны аппаратын бүтцийн өөрчлөлттэй хошногоны сфинктерийн /шулзуун гэдэсний амсар/ дутагдлыг мэс ажилбараар эмчлэх тохиромжтой аргыг нэрлэнэ үү.

- А. Урд талын сфинктеролеваторопластика
- Б. Хажуугийн сфинктеролеваторопластика
- С. Хойд талын сфинктеролеваторопластика
- Д. Сфинктероглютеопластика
- Е. Глютеопластика

/346./ Гүн хураагуур судасны бүлэнт үрэвслийн үед ямар шинж гарахгүй вэ?

- А. Хөлийн шилбэ хавагнах
- Б. Хөлийн эрээн булчин хөндүүрлэж өвдөх
- С. Судас дагуу нэвчдэс үүсч улайх
- Д. Протромбины индекс ихсэх
- Е. Халуурна

/347./ Литотрипсийн цохилтын долгион нь цэсний чулуу хэдий тоотой, ямар хэмжээтэй байвал үр дүнгээ өнө гэдгийг заана уу.

- А. Цэсний чулуу тоо, хэмжээнээсээ ул хамаарна.
- Б. 1 см хүртэл хэмжээтэй олон чулуу
- С. 4 см хүртэл хэмжээтэй ганц нэг чулуу
- Д. 3 хүртэл тоотой, 2 см хүртэл хэмжээтэй цэсний чулуу
- Е. Цэсний зогсонгошлоос үүссэн олон тооны чулуу

/348./ Өрц гэмтсэн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу.

- А. 10%-аасбага
- Б. 20-40%
- С. 41-60%

D. 61-80%

E. 81%-иасдээш

/349./ Наалдаст түгжрэлийн эхэн үед ямар шинж илрэхгүй вэ?

A. Хэвлэгээр байнга өвдөх

B. Хэвлэгээр базалж өвдөх

C. Бөөлжих

D. Гэдэс дүүрэх

E. Хий, өтгөн гарахгүй болох

/350./ Өрцний ивэрхийн зонхилон тохиолддог клиник шинж тэмдгийг заана уу.

A. Аюулхайд цанхайх, өвдөх

B. Хоол идсэний дараа амьсгaa давхцах

C. Хоол идсэний дараа хүчтэй ханиалгах

D. Юм залгик чадаахаа болих

E. Хоол идсэний дараа бөөлжих

/351./ Элэгний амёбийн буглааны үед ямар хагалгаа хийх нь тохиромжтой вэ?

A. Абсцессотоми

B. Буглаанд давтан хатгалтхийн, хөндийгугаах

C. Элгийгтайрах

D. Хэсэггазрын антибиотикийн эмчилгээ

E. Буглааг гэртэй нь хамт авах

/352./ Гэдэсний түгжрэлийг онцлох шинжилгээний илүү мэдээлэл бүхий арга нь аль вэ?

A. Хэвлэйн хөндийн тойм рентген зураг авалт ба харалт

B. Бүдүүн гэдэс дурандах

C. Тодотгогч бодисын тусламжтай гэдэсний замыг шинжлэх

D. Ходоод дурандах

E. Судсаар тодотгогч бодистой шинжлэх

/353./ Хэвийн ЭКГ-д ямар холболтонд "P" шүд ажиглагдах вэ?

A. I , II, V1, V2

B. II, III, AVF, V6

C. II, III, AVF, V1

/354./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар шинж гардаггүй вэ?

A. Цээжээр өвдөх

B. Хавирга завсарын зайд өргөсөх

C. Тогшиход хэнгэрэн чимээ сонсогдох

D. Дамуазын шугам тодорхойлогдох

/355./ Голчийндоод хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн хийх вэ?

A. Шарханд чихээс тавих

B. Гоожуурга тавьж сорогчоор соруулах

C. Шархан дундуур гоожуурга тавих

D. Шарханд дундуур гуурсаа явуулан үзүүрийг нь гадагшлуулах

E. Шархыг гуурсаар угааж, соруулах

/356./ 12 хуруу гэдэс гэмтсэн үед түүнд үзлэг хийхдээ яах ёстой вэ?

A. 12 хуруу гэдсэнд үзлэг хийхдээ хөндлөн хүрээ гэдсийг доош нь болгоно

B. Бага сэмжийг зүснэ

C. Ходоод-хүрээ гэдэсний холбоосыг зүснэ

D. Кохерын аргаар 12 хуруу гэдсийг ялгана

E. Чацаархайн судаснаас баруун тийш 12 хуруу гэдсийг ил гартал хөндлөн хүрээ гэдэсний чацаархайг зүснэ

/357 / Кардиоспазм үүсгэдэггүй шалтгаан нь аль вэ?

A. Сэтгэл санааны ужигдарамт-стресс

B. Улаан хоолойн мэдрэлийн төрөлхийн гаж хөгжил

C . Рефлексийн гаралтай дисфункци

D. Улаан хоолойн агшилтийн зохицуулга алдагдах /дискординаци/

E. Улаан хоолойгоос цус алдах

/358./ Дурдсан өөрчлөлтүүдээс аль нь туяаны энтерколитын хүндрэл үүсэхэдшийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх вэ?

- A. Салст бүрхүүлийн эвдрэл
- B. Салстын доорх бүрхүүлийн суурийн зузааралт
- C. Давшигийн васкулит
- D. Лимфийн фолликулын гипоплази
- E. Кринт буглаа үүсэх

/359./ Зураг дээр уушигны аль дэлбэнд мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг хайх хэрэгтэй вэ?

- A. Доод хэсэгт
- B. Дээд хэсэгт
- C. Бух хэсэгт

/360./ Цөсний өрөнхий сувгийн 12 хуруу гэдэсний хэсгийн уртын хэмжээг заана уу.

- A. . 25-30 мм
- B. 20-25 мм
- C. 15-20 мм
- D. 10-15 мм
- E. . 5-9 мм

/361./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурхын даамжирах нөхцөл:

- A. Биеийн хүчиний ачаалал
- B. Уушигны архаг өвчин хурцдах
- C. Гэнэтийн цочрол хямрал
- D. Шалтгаан нь тод бус
- E. Гэмтэл

/362./ Амбулаторийн нөхцөлд цээжний хөндийг нэвт хатгаж, уушиг гэмтсэн тохиолдолд үзүүлэх анхны тусламж

- A. Шархыг дарж боолт хийх
- B. Ариутгасан боолт хийх
- C. Хузүүний ваго-симпатик хориг хийх
- D. Биеийн байдал дордох үед үе үе уушигийг үлээлгэх
- E. Маш түргэн хугацаанд өвчтөнийг гэмтэл-мэс засалд хүргэж өгөх

/363./ Ходоод, арван хоёр нугалаа гэдэсний тодорхой бус цооролтой бүдэг шинжүүд аль нь вэ?

- A. Хүчтэй биш өвдөлт
- B. Өвчүүний араар зөөлөн өвдөх
- C. Хэвллийн урд ханын булчингийн чангараалт
- D. Гэдэс дүүрсэн цочролын шинж тэмдэг
- E. Хэл хатах, ундаасах

/364./ Цөсийг авсаны дараах хам шинж нь юунаас хамаарах вэ?

- A. Элэгний хавдар
- B. Гепатит
- C. Элэгний цирроз
- D. Элэгний том үйланхай
- E. Цөсний сувгийн урттайрдас

/365./ Хошногоны амсрын язралтын тохиромжтой эмчилгээний аргыг заана уу.

- A. Молотковын хагалгаа
- B. Хажуугийн далд сфинктеротоми /шулзуун гэдэсний агших амсрын тай язралтыг зүсэх
- C. Язралтыг зүсэх-Аминевийн аргаар салст бүрхүүлийг доош болгох
- D. 10-12 өдрийн туршид өдөр бүр цэвэрлэх бургуй тавих + метил-урацилтай лаа, эсвэл алоэзил, гипозолтой бичил бургуй
- E. Спирт-новокайны хориг

/366./ Облитерирующий эндоартеритийн үед илрэхгүй шинж нь аль вэ?

- A. Эрээн булчингаар өвдөх
- B. Хөл хөхрөх
- C. Хөл халуун оргих
- D. Ye үе дотогох

Е. Тараагуур судасны лугшилт сул

/367. / Химиийн түлэгдэл авсан улаан хоолой, ходоодонд гуурс тавих нь:

- A. Заавал тавина.
- B. Тодорхой хугацааны дараа тавина.
- C. Зөвхөн хүчилд түлэгдвэл тавина.
- D. Зөвхөн шүлтэнд түлэгдвэл тавина.
- E. Гурставиыхориллоно.

/368. / Наалдац нь ямар эдээр үүсдэг вэ?

- A. Сийрэг холбогч эдээр үүссэн
- B. Булчинлаг эдээр үүссэн
- C. Судасны холбогч эдээр үүссэн
- D. Судасгүй холбогч эдээр үүссэн
- E. Холбогч эдгүй үүссэн

/369. / Өрц гэмтсэнэйг харуулах гол шинж тэмдгийг заана уу.

- A. Гемоторакс /Цээжинд цусхуралдах/
- B. Гемопневмоторакс
- C. Дотор цус алдалт
- D. Цусаар шээх
- E. Гемофили

/370. / Элэнгийн уйланхай оношлох өвөрмөц аргыг сонгоно уу.

- A. Каццонийн урвал
- B. Тоймлосон рентгений шинжилгээ
- C. . Хэт авианы шинжилгээ
- D. Трансумбиликалийн портогепатограф
- E. Изотопын хуулбарлал

/371. / Зүүн ховдолд агшилтын даралт өндөр болох нь аль тохиолдолд вэ?

- A. 2 хаваст хавхлагын дутагдал
- B. Гол судасны хавхлагын нарийсал
- C. 2 хаваст хавхлагын нарийсал
- D. Гол судасны хавхлагын дутагдал
- E. 2 хаваст ба гол судасны хавхлагын нарийсал

/372. / Цээжний гялтанийн үрэвслийг зонхилон үүсгэдэг шалтгааныг заана уу.

- A. А Гаднаасхалдварт орох
- B. Цус - буюу тунгалагийн халдварт
- C. Үжлийн халдварт
- D. Зэргэлдээ эрхтэнээс халдварт дамжих
- E. Мөгөөрсөн хоолойгоорхалдварт орох

/373. / Голчийн дээд хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн тохируулах вэ?

- A. Шарханд чихээс тавих
- B. Шарханд контур гарган гуурс оруулан үзүүрийг нь гадагшлуулах
- C. Шархан дундуур гоожуурга тавих
- D. Гоожуураар шарханд угаалга хийх
- E. Антибиотик эмчилгээ хийх

/374. / 12 хуруу гэдэсний хүндрээгүй шархлаанд аль мэс заслыг хийх вэ?

- A. Селективная проксимальная vagotomy+пилоропластик
- B. Селективная проксимальная vagotomy+шархыг өөлж авах
- C. Шархыг өөлж, столовая vagotomy
- D. 12 хуруу гэдсийг тайрах
- E. Селективная проксимальная vagotomy

/375. / Барийг 12 хуруу гэдэс рүү шууд хаймсуурын тусламжтай оруулахад хэвийн үед хэдэн цагийн дараа мухар гэдсэнд хүрэх вэ?

- A. 1.5 цаг хүртэл
- B. 2.5-2 цаг хүртэл
- C. 3-4 цаг

D. 5-6 цаг

E. 7-8 цаг

/376./ Рентген шинжилгээгээр илрэх мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн шинжийг заана уу.

A. Ушигны голомтот сүүдэржилт илрэх

B. Ушигны угиин бүтэц өргөсөх

C. Ушигт мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлүүд

D. Өрцний хөдөлгөөн хязгаарлагдах

E. Ушигны захын хэсгүүд шалчийх

/377./ Кохерын аргаар 12 хуруу гэдсийг хангалттай ялгах хэмжүүрийг заана уу

A. 12 хуруу гэдэс, Цөсний ерөнхий цоргыг бүхэлд нь ялган гаргах

B. 12 хуруу нугалаа гэдэсний арын гадаргуугаар ил гаргах.

C. Цөсний ерөнхий сувгийн хойт хэсгийг ил гаргах

D. 12 хуруу нугалаа гэдсийг бүхэлд нь ялган гаргах

E. Доод хөндий венийн судсыг ил гаргах

/378./ Гэнэт цээжний хөндийд дотроосоо хий хурах шалтгаан

A. Аюулгүй

B. Амия алдах магадлал 10% хүртэл

C. Амия алдах магадлал 25% хүртэл

D. Амия алдах магадлал 50% хүртэл

E. Амия алдах магадлал 100% хүртэл

/379./ 26 настай эмэгтэйд бамбай булчирхай нь томорсон. Пункци хийж эдийн шинжилгээ авахад эдээс нь амилойд илэрсэн. Бамбай булчирхай томорсон талын хүзүүний тунгалгийн булчирхайнууд тэмтрэгдэхүйц болсон. Уг өвчтөнд эмчилгээний зөв тактикийг сонго.

A. Бамбай томорсон зангилааг бүлтэлж, хүзүүвчиний хамт авч томорсон тунгалгийн булчирхайгтуух

B. Бамбайн томорсон зангилаа, хүзүүвч, эрүүл талын хагасыг авч томорсон тунгалгийн булчирхайгтуух

C. Бамбайн томорсон зангилаа, хүзүүвчийг авч хүзүүний тунгалгийн булчирхай томорсон талын бүх булчирхайг шулж авах

D. Бамбай булчирхайг бүхэлд нь авч, тунгалгийн булчирхай томорсон талын хүзүүний тунгалгийн булчирхайнуудыг шулж авах

E. Бамбай булчирхайг авч, тунгалгийн булчирхайг үлдээх

/380./ Цөсний хурц үрэвслийн улмаас цөс нь хагарч, хэвлэлийн хөндий руу тарсан үед аль шинж нь илрэх вэ?

A. Арьс салст шарплаж, элэгтоморч өвчтөн сепсисийн байдалд шилжих

B. Хэвллийн гялтангийн түгзэмэл үрэвсэл

C. Хэвллийн баруун сүвэрэгдэсийн булчин чангаран, халуун нэмэгдэхгүй цөсний хүүдий тэмтрэгдэнэ.

D. Баруун хавирган доорх хэсгийн гялтангийн үрэвслийн шинж илэрнэ.

E. Хоёрдогч холангит, панкреатит, мөханик шарлалт илрэх

/381./ Хэрвээ өвчтөний ялгадас гарах үед хошногоны орчимд өвдөлт өгч байвал хам эхэнд ямар өвчний тухай бодох вэ?

A. Цочмог шамбрам

B. Шамбрамд өртсөн зангилаануудын бөглөрөлт

C. Мөн зангилаануудын хавчигдах ба урвах

D. Хошногоны амсрын цочмогязралт

E. Шулзуун гэдэсний орчмын өөхөн эдийн цочмог үрэвсэл

/382./ Хураагуур судасны бүлээнт үрэвслийн дараах хам шинжийн үед ямар шинж илрэх вэ?

A. Арьсан дээр хөх түүралт үүсэх

B. Хөлийн шилбээр хавалнах

C. Арьсан доорх хураагуур нарийсах

D. Арьсны өнгө өөрчлөгдэхгүй цороо

E. Арьсан дээр шархлаа үүсэхгүй

/383./ Цөсний чулууг компьютер-томографийн шинжилгээгээр хэдэнхувь хүртэлоношлох боломжтой вэ?

- A. 20%-40% хүртэл
- B. 40% - 60% хүртэл
- C. 60% - 80% хүртэл
- D. 80% - 90% хүртэл
- E. 90%-100% хүртэл

/384./ Хүзүүний орчимд улаан хоолойг гадагшлуулах оновчтой газрыг- заана уу.

- A. Мөгөөрсөн хоолойноос зүүн тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийи урдуур
- B. Мөгөөрсөн хоолойноос баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн урдуур
- C. Мөгөөрсөн хоолойн баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн булчингийн

хойгуур

/385./ Хэвллийн гэдэс хоорондын наалдаст өвчнийг оношлох шинжилгээний үндсэн арга нь аль вэ?

- A. Хэвллийг гэрэлд тойм харах
- B. Гэдэс ходоодны замаар пассаж үзэх
- C. Эзофагогастродуоденоскопи
- D. Прозерини сорил хийх
- E. Хэвллий дурандах / лапароскопи /

/386./ Өрц хөдөлгөөнгүй болсон үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу.

- A. 10%-аасбага
- B. 20-40%
- C. 41-60%
- D. 61-80%
- E. 81%-иасдээш

/387./ Элэгний бэтэгний үед хагалгаа хийх тохиромжтой хэмжээг заана уу.

- A. Уйланхайг бүлтлэн авах/эпуклеаци/
- B. Далд аргаар бэтгийг авах
- C. Уйланхайг ялгаж отглох-элгийг тайрч үйл анхайтай хамт авах
- D. Уйланхайг нээж, үлдэгдэл хөндийг устгах
- E. Уйланхайг нээж, үлдэгдэл хөндийг устгах

/388./ Гэдэсний түгжрэлийн үед бие махбодид юу алдсантай холбоотой ихээхэн хэмжээгээр угсуйжилт явагддаг вэ?

- A. Гуравдагч зайнд секвестраци болох /хатуурал/
- B. Шээс ялгарлалт элбэгших
- C. Эсийн орчноос шингэн алдагдах
- D. Эс хоорондын орчноос шингэн алдагдах
- E. Бөөлжих

/389./ Хиймэл хавхлагатай өвчтөнд үүсэх хүндрэл

- A. Тромбоз ба тархмал эмболи
- B. Парапротезын фистул ба протезын үйл ажиллагаа алдагдах
- C. Халдварын эндокардит
- D. Цус шүүрэмтгий болох/цусны бүлэгнэлт өөрчлөгдөх
- E. Бүгд

/390./ Голчийн доор байрлалын идээг нээх хүрц:

- A. Хүзүүний хэсгээр
- B. Өвчүүгээр
- C. Цээжээр нээх
- D. Хэвллийгээр нээх
- E. Цээж хэвллийгээр нээх

/391./ 12 хуруу гэдэсний шархлаа зонхилон цоорох байрлал нь аль вэ?

- A. Урд хана
- B. Урд-дээд хана
- C. Арын хана
- D. Арын доод хана
- E. Арын дээд хана

/392./ Залуу эмэгтэйд шингэн зүйл залгихад сааталтай, буцаж гулигуулж байв. Эзофагоманометрийн үед улаан хоолойн доод хуниас ажиллагаагүй байв. Ямар онош тавих вэ?

- A. Улаанхоолойн хорт хавдар
- B. Пламмер-Винсоны синдром
- C. Рефлюкс-эзофагит
- D. Өрцний дээд талын улаан хоолойн дивертикул
- E. Ахалази карди

/393./ Сүрьеэгийн гаралтай хэвлийн гялтангийн үрэвслийн үед аль хэлбэр нь гэдэсний цорхой үүсгэх вэ?

- A. Шүүдэст хэлбэр
- B. Наалдаст хэлбэр
- C. Нэвчдэст
- D. Олон зангилаатхэлбэр
- E. Хавсарсан хэлбэр

/394./ Хүндэрсэн мөгөөрсэн хоолойн тэлэгдлийн эмнэл зүйн шинж аль вэ?

- A. Өвчин тогтмол хурцдах + хөөсөрхөг цэр гарах
- B. Өвчин тогтмол хурцдах + идээт цэр гарах
- C. Өвчин тогтмол хурцдах + биеийн ачааллын үед амьсгаадах
- D. Өвчин тогтмол хурцдах + идээт хордлого
- E. Өвчин тогтмол хурцдах + уушгинд зогсонги илрэх

/395./ Орчин цагийн сонгомол төхөөрөмжкашиглажхэставиагаар шинжилгээхийхэд хэвийн ажиллагаатай цэсний хүүдийн давтамжийн илрүүлэлтийг заана уу.

- A. 97-99%
- B. 95-98%
- C. 92-96%
- D. 90-94%
- E. 93-95%

/396./ Мөгөөрсэн хоолой тэлэгдэлд ушиг тайрах хэмжээг тодорхойлох үндсэн хэмжүүр юу болох вэ?

- A. Гадаад амьсралын нөөц
- B. Клиникийн үндсэн шинжийн өгөгдөл
- C. Тодотгогч бодистой хийсэн гуурсан хоолойн зургийн өгөгдөл
- D. Мэс заслын үед ушигны байдлыг тодорхойлох
- E. Рентген шинжилгээний өгөгдөл

/397./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан эмгэгийн эмчилгээ үр дүн өгөхгүй байгаа шалтгааныг ямар шинжилгээзэр зөв илрүүлж чадах вэ?

- A. Цээжний хөндийн тойм рентген зураг
- B. Ушигны зураг авах
- C. Ушиг дурандах
- D. Цээжний хөндийг дурандах
- E. Хэт авиан шинжилгээ

/398./ 30настай эмэгтэйд субтотал тироидэктоми хийснээс 12 цагийн дараа өвчтөн цочролын байдалд орж амьсгал нь боогдсон. Үзэхэд тахикарди илэрсэн, хүзүүний урд хэсэгт овойсон, хагалгааны шархны боолт хуурай байв. Энэ тохиолдолд яаралтай ямар арга хэмжээ авах вэ?

- A. Амаар нь цагаан мөгөөрсэн хоолойд гуурс тавих
- B. Хагалгааны шархыг нээх
- C. Цусан дахь кальцийг тодорхойлох
- D. Морфинтарих
- E. Хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах

/399./ Бэлгэрэлтийн /механик/ шарпалтыг илрүүлэх хамгийн сайн оновчтой шинжилгээний аргыг сонгоно уу.

- A. . Цусны биохимийн шинжилгээ
- B. Хураагуур судасны холографи

С. Дурангийн тусламжтайгаар цөсний сувгийн зургийг авах

D. Хэт авианы шинжилгээ

E. Компьютерно-томографийн шинжилгээ

/400./ Өвөрмөц бус гаралтай гэдэсний шархлааны үед гэдэсний аль хэсэг нь зонхилон гэмтэх вэ?

A. Мухар гэдэс

B. Сигма гэдэс

C. Цутгалан гэдэс

D. Хэндлөн гэдэс

E. Уруудах гэдэс

/401./ 48 настай эмэгтэйд эгэм доорх венд катетр тавьсаны дараа амьсгаадсан. Энэ ямар хүндрэлийн шинж вэ?

A. Хийн эмболи

B. Пневмони

C. Катетр тавьсан талд пневмоторакс үүссэн

D. Эгэм доорх arteri гэмтсэн

E. Эгэм доорх вен гэмтсэн

/402./ Цөсний замын чулуг хэт авиан шинжилгээгээр хэдэн хувь хүртэл оношлох боломжтой вэ?

A.. 20%-40% хүртэл

B. 40% - 60% хүртэл

C. . 60% - 80% хүртэл

D. 80% - 90% хүртэл

E. 90% -100% хүртэл

/403./ Улаан хоолойн тулэнхийн сорвижилт нарийсалтанд гэдсээр нь пластик хийдэг арга нь аль вэ?

A. Бирхер

B. Накаяма

C. Герцен

D. Петровский

E. Бек

/404./ Крон ёвчний сонгодог хэлбэрт мэс ажилбарын оролцооны хэмжээ ямар байх вэ?

A. Өргөн тайралт

B. Гемоколиетомия

C. Гемоколиетомия+ чацаархайн лимфийн булчирхайг авах

D. Тайралтыг оновчтой хийх

E. Будүүн гэдсээр дамжуулан урт гуурс тавих

/405./ Өрц гэмтсэн үед амьсгал бүтэх магадлалыг заана уу.

A. 10%-аасбага

B. 20-40%

C. 41-60%

D. 61-80%

E. 81%-иасдээш

/406./ Элгэнд элбэг тохиолддог паразитын гаралтай голомтот эмгэгийг заана уу.

A. Эхинококкоз

B. Дифиллоботриоз

C. Энтеробиоз

D. Альвеококкоз

E. Амебиоз

/407./ Гэдэсний наалдаст түгжрэлийн үндсэн шинж нь:

A. Хагалгааны дараах сорви

B. Дунших маягаар гэдэс өвдөх

C. Дотор муухайрч огиулан бөөлжих

D. Өтгөн ба хий хаагдах

E. Гэдэс дүүрэх ба хэвллийн урд хана тэгш биш болох

/408./ 2 хаваст хавхлагын дутагдлын үеийн агшилтын шуугианы хүч аль тохиодолд нэмэгдэх вэ?

- A. Гүн амьсгаа авах үед
- B. Вальсальвын сорилын үед
- C. Амьсгалaa түгжих үед
- D. Нэмэгдэхгүй
- E. Амьсгалaa хамаарахгүй

/409./ Парадоксал амьсгал аль пневмоторакс – д гардаг вэ?

- A. Хаалттай
- B. Нээлттэй
- C. Хавхлагат
- D. Хагас нээлттэй
- E. Хязгаарлгадмал

/410./ Цээжний голчийн үрэвслийн үед гарах үндсэн шинж нь:

- A. Хордлого
- B. Голчийн эрхтэнүүд гэмтэх
- C. Судас ба мэдрэл үрэвсэл, нэвчтэсээр дарагдах
- D. Амьсгал хямрах
- E. Зурхний үйл ажиллагаа алдагдах

/411./ Шархлаа өвчиний сэдрэлийн үед ямар морфологийн өөрчлөлт гарах вэ?

- A. Гастродуоденит идэвхжих
- B. Шархлаа ба гастродуоденит
- C. Рефлюкс-эзофагит
- D. Салстын цочмог үрэвсэл
- E. Галстродуоденит намжих үе

/412./ Голчийндоод хэсгийн идээг нээсний дараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн хийх вэ?

- A. Шарханд чихээс тавих
- B. Гоожуурга тавьж сорогчоор соруулах
- C. Шархан дундуургоожуурга тавих
- D. Шарханд дундуур гуурсаа явуулан үзүүрийг нь гадагшлуулах
- E. Шархыг гуурсаар угааж, соруулах

/413./ Хэвлэлийн гялтанийн үрэвслийн буруу тодорхойлолтыг сонго

- A. Гялтанийн үрэвсэл нь ихэвчлэн 2-14 насанд тохиолдоно.
- B. Ихэвчлэн халдварт цусны ургсалаар дамжин хэвллийн гялтанг үрэвс
- C. Эмэгтэй хүүхдэд утреэгээр дамжин халдвартаж болно.
- D. Зөвхөн эмийн эмчилгээ хийгдэнэ.
- E. Их өндөр халуурдаг.

/414./ Хүндрээгүй мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн эмнэл зүйн шинж аль вэ?

- A. Салст цэртэй ханиад + өвчин үе үе хурцдах
- B. Салст цэртэй ханиад + өвчиний явц бүдэг
- C. Идээт цэртэй ханиад + өвчин үе үе хурцдах
- D. Идээт цэртэй ханиад + өвчиний явц бүдэг
- E. Цэвэр цус гарах + өвчиний явц бүдэг

/415./ Өвчтөн 40 настай эмэгтэй. Уушигны сүрьеэз өвчинеэр олон жил өвдсөн. Сүүлийн жилүүдэд гэдэс байнга дүүрч, үе үе хий өтгөн гарахгүй болдог болсон. Мухар гэдсэнд 5x6 см овгор хавдар мэт зүйлтэй, 38°C хүртэл халуурна. Гэдэс хагас түүрэлтэй, турж эцнэ. 1 .Онош тодруулах шинжилгээ нь:

- A. ЭХО
- B. Рентген
- C. Ходоод гэдэс
- D. Лапароскопи
- E. Ирригоскопи

/416./ Тиреотоксикоз өвчиний аль шинж тэмдэг нь олон тохиолдох вэ?

- A. Бамбай булчирхай томорно
- B. Экзофтальм

- C. Зүрх өвдөх, зүрхний чичирхийлэл, хэм алдагдах
- D. Гар хавагнаж, салганах
- E. Судасны цохилт хэт олшрох

/417./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурсан үеийн дундаж эдгэрэх хугацаа:

- A. 2-3 өдөр
- B. 1-2 долоо хоног
- C. 3-4 долоо хоног
- D. 5 сар ба түүнээс дээш
- E. 62 сар

/418./ Өтгөн хатах, гэдэс дүүрэх, хэвлэй орчим өвдөх, бие супрах зэрэг нь аль өвчний үед гарах магадлал өндөртэй вэ?

- A. Гиршпунгийн өвчин
- B. Бүдүүн гэдэсний өмнө үү
- C. Бүдүүн гэдсэнд ур ургах
- D. Кологен колостаз
- E. Шулуун гэдэсний колостаз

/419./ Посттромбофлебитийн хам шинж:

- A. Хөл хатах
- B. Хөл цайх
- C. Хөл хавдах
- D. Өнгөц вен бүдүүрэх
- E. Доголдох

/420./ Цөсний цочмог чулуужилт үрэвсэлд мэс ажилбар хийх зохицой хугацааг заана уу.

- A. Онош тавьсны даруйд
- B. Өвчний эхний хоногт
- C. Өвчилснөөс хойш эхний хоёр хоногт
- D. Өвчилснөөс хойш эхний гурав хоногт
- E. Өвчилснөөс хойш эхний долоо хоногт

/421./ Улаан хоолойн цүлхэнгийн ангилалд аль нь хамаардаг вэ?

- A. Гэмтлийн
- B. Үрэвслийн
- C. Нэвчтэст
- D. Татагдсан /тракционный/
- E. Холимог

/422./ Гэдэсний цочмог түгжрэлийн 2-р үеийн гол шинжийг заана уу?

- A. Өвдөлт
- B. Цусны хөдлөлзүйн илэрхий өөрчлөт
- C. Хэвлэлийн өмнөт хана жигд бус болох
- D. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдэх
- E. Гэдэсний гүрвэлзэх хөөлгөөн зогсох

/423./ Голчийн доор байрлалын идеэг нээх хүрц:

- A. Хүзүүний хэсгээр
- B. Өвчүүгээр
- C. Цээжээр нээх
- D. Хэвлэлийгээр нээх
- E. Цээж хэвлэлийгээр нээх

/424./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хуралдахыг оношлоход мэдүүлгийн ач холбогдол

- A. Ушигны хүрц үрэвсэл
- B. Ушигны архаг үрэвсэл
- C. Биеийн хүчний ачаалал
- D. Шалгаан нь тод бус
- E. Хүчтэй ханиалга, ушигны доторх даралт ихсэх

/425./ Цөсний ерөнхий сувгийн төгсгөлийн хэсгийн 2 см хүртэл урттай нарийсалд хийх зохицой мэс засал нь:

- A. Нарийслалтай хэсгийг тайрч хоёр үзүүрийг хооронд нь залгах

- B. Цөсний хүүдийг нарийн гэдэстэй холбох
- C. Дурангийн тусламжтай хөхөлбөрийг зүсэх
- D. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй залгах
- E. Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах

/426./ Дээр байрлалтай түгжрэлийг шинж нь:

- A. Тасралтгүй бөөлжих
- B. Бие угсүйжих
- C. Хэвлэлий эрс томорч хэнгэргэн чимээтэй болох
- D. Өвчин эхлэнгүүт хий ба өтгөн хаагдах
- E. Хэвллийд чөлөөт шингэн тодорхойлгдох

/427./ Цээжний голчийн үрэвслийн үед гарах үндсэн шинж нь:

- A. Хордлого
- B. Голчийн эрхтэнүүд гэмтэх
- C. Судас ба мэдрэл үрэвсэл, нэвчтэсээр дарагдах
- D. Амьсгал хямрах
- E. Зүрхний үйл ажиллагаа алдагдах

/428./ 60настай эмэгтэйн их сэмжинд 6 см орчим үүсгэвэртэйг оношложээ. Аль онош нь илүү оновчтой вэ?

- A. Гемангиома
- B. Леймиом
- C. Липом
- D. Карциномын метастаз
- E. Нейрофибром

/429./ Цээжний хөндийд дотроосоо хий хурхын даамжирах нөхцөл

- A. Биеийн хүчний ачаалал
- B. Уушигны архаг өвчин хурцдах
- C. Гэнэтийн цочрол хямрал
- D. Шалтгаан нь тод бус
- E. Гэмтэл

/430./ Бүдүүн гэдэсний ямар өвчин олон удаа өтгөнтэй салс ялгарах ба гипокали бэлдогвэ?

- A. Гарднерийн хам шинж
- B. Пейтц-Эггерсийн хам шинж
- C. Цэлмэнт аденом
- D. Ювенилийн полип
- E. Псевдополиз/хуурамч полип ургах/

/431./ Мэс заслын үед цөсний ерөнхий сувгийн доторх saatlyg үнэлж дүнэх хамгийн оновчтой аргыг сонгоно уу.

- A. Цөсний сувгийн зураг авах
- B. Цөсний сувгийн даралт хэмжих
- C. Цөсний ерөнхий сувгийг дурандах
- D. Мэс ажилбарын үед хэт авиаагаар шинжлэх
- E. Сувгуудыг сэтгүүрдэх

/432./ Улаан хоолойн түлэнхийн сорвижилт нарийсалтанд гэдсээр нь пластик хийдэг арга нь аль вэ?

- A. Бирхер
- B. Накаяма
- C. Герцен
- D. Петровский
- E. Бек

/433./ Аль нь гэдэсний түгжрэлийг үүсгэх вэ?

- A. Хэвллийн хөндийн наалдац
- B. Гэдэс чихэлдэх
- C. Цөсний чулзуу
- D. Хавдар
- E. Бүгд

/434./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар эмчилгээнээс бусдыг хэрэглэх вэ?

- A. Үрэвслийн эсрэг эмчилгээ
- B. Хатгалт
- C. Торакоцентез
- D. Торакотоми
- E. Бронхоор дурандаж цэвэрлэх

/435./ Голчийн үрэвсэл /медиастенит/ үүсэх гол шалтгаан нь юу вэ?

- A. Эрүү нүүрний идээт өвчин
- B. Улаан хоолойн хураагуур судас өргөсөх
- C. Аngiографи хийснээс
- D. Бамбай булчирхайн үрэвсэл
- E. Элэг цэсний замын идээт өвчин

/436./ ХҮЛЭЭН авахад 6 цагийн өмнө 2 ширхэг сүлбээр зүү залгисан 25 настай эрэгтэй хүнийг хүргэж иржээ. Рентгенээр хараад 2 зүү нарийн гэдсэнд байжээ. Зохистой эмчилгээний арга нь аль вэ?

- A. Мэс засалчийн хяналтанд эмнэлгээс гаргах
- B. Татрангийн анатоксин тарьж, эмнэлгээс гаргана. 10 хоног антибиотик

ХЭРЭГЛЭЛНЭХ ЭРЭГЛЭНЭ

- D. Мэс засал яаралтай хийх
- E. Эмийн эмчилгээ хийнэ.

/437./ Ерөнхий билирубины хэмжээ ихээр нэмэгддэг шарлалтын төрлийг заана уу.

- A. Вируст гепатит
- B. Элэгний гаднах цэсний суваг, нойр булчирхайн толгой, 12 хуруу гэдэсний том хөхлөгийн хавдар
- C. Холедохолитиаз
- D. Цус задран шарплах
- E. Том хөхлөгийн нарийсал

/438./ Гиперпаратиреозын анхны илрэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү.

- A. Ясааревднө.
- B. Бөөр чулуужина.
- C. Сэтгэцийн өөрчлөлт гарна.
- D. Нойр булчирхайн үрэвсэл
- E. Олон яс ургах

/439./ Бүдүүн гэдэсний полипозыг эмчлэх үр ашигтай аргыг сонгоно уу.

- A. Дурангийн полипэктоми
- B. Бүдүүн гэдсийг тайрах
- C. Колостоми
- D. Равичийн мэс ажилбар
- E. Алсалсан залгаас тавих

/440./ Улаан хоолойн цүлхэнгийн аль тохиолдлыг нь мэс заслаар эмчлэх вэ?

- A. Цүлхэн нь илэрхий
- B. Цүлхэн улаан хоолойн хүзүүн хэсэгт байрласан+хахаж цацах
- C. Цүлхэн нь улаан хоолойн цээжний хэсэгт + цүлхэн нь өрцөн дээр байрласан
- D. Хахаж цацах + улаан хоолой агчих + цүлхэнд контраст удаанаар саатах
- E. Цүлхэн улаан хоолойн цээжний хэсэгт байрласан + цүлхэн нь өрцний дээр байрласан + хахаж цацах

/441./ Чацаархайн доод хураагуур судсыг боосноос хос гэдэсний үхжил элбэг гарах уу?

- A. Ажиглалтын 100%
- B. Ажиглалтын 60-80%
- C. Амжилтын 40-60%
- D. Амжилтын 20-40%
- E. Хэзээ ч гарахгүй

/442./ Улаан хоолойн цүлхэнгийн ангилалд аль нь хамаардаг вэ?

- A. Гэмтлийн
- B. Үрэвслийн
- C. Нэвчтэст
- D. Татагдсан /тракционный/
- E. Холимог

/443./ Элэгний буглааны үүсэл нь:

- A. Гэмтлийн дараах
- B. Цочмог гепатитын дараах
- C. . Цөсний
- D. Уйланхайн
- E. Хоол боловсруулах замын эмгэгээс

/444./ Гурван хавтас хавхлагын нарийслийн үед хос бус венийн хэмжээ (диаметр) өөрчлөгдхөн үү?

- A. Өөрчлөгдхүй
- B. Нарийсна
- C. Өргөснө

/445./ 35-40 настай өвчтөний 12 хуруу гэдэсний шарх цоороод 6 цаг болжээ. Ямар төрлийн мэс засал хийх вэ?

- A. Цоорсон нүхийг оёж, тэнэмэл мэдрэлийг 2 ба 3-р салааг таслах
- B. Опель-Поликарповын агаар цоорсон нүхийг оёх
- C. Цоорсон нүхийг оёх
- D. Ходоодыг анхдагчаар тайрах
- E. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг тайрч, нугалуурыг нөхөн сэргээх

/446./ Цочмог парапроктитынэмчилгээний тохиромжтой аргыг сонгоно уу.

- A. Буглааг нээж, резинэн чихээс хийх
- B. Буглааг зүсэх
- C. Буглаагхатгах
- D. Буглааг нээж, гуурс тавих
- E. Буглааны бүрхэвчийг зүсч, хошногоны амсрыг өргөсгөх

/447./ Тиреотоксикоз өвчний оношийг батлахад ямар шинжилгээ хийх нь чухал вэ?

- A. Бамбай булчирхайгаас дээж авах
- B. Уураг, холбогч йодыг тодорхойлох
- C. Сцинтиграфи
- D. Радио идэвхтэй йодоор шинжлэх
- E. Тироксин-П4-ийг тодорхойлох

/448./ Бамбай булчирхайн аутоиммуны гэмтэл гараххамгийн магадлал ихтэй шалтгаа*-

- B. Гаднаас амаар хүний биенд гадны уураг ороход бие махбодь хариу урва-өгөх
- C. Өөрийн бамбай булчирхайн уурагт өвчтөний бие махбодь хариу урвал өгөх
- D. Өвчтөний дархлааны систем өөрчлөгдхөхөд Т-супрессорын идэвх буурч, Т-

- A. Цус алдалтын шок
- B. Элэг-бөөрний дутгадал
- C. Цус алдалтын дараах цус багадалт
- D. Элэгний даамжирсан дутгадал
- E. Бөөрний дутгадал

/450./ Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой өөрөө аяндаа хаагдах нь ихэвчилэн дараах насанд тохиолдоно.

- A. 1 нас хүртэл
- B. 2 нас хүртэл
- C. 4 нас хүртэл
- D. 4 нааснаас хойш
- E. Өөрөө аяндаа хаагдахгүй

/451./ Дурангаар цөсний хүүдийн авах хагалгааны туршид ихэвчлэн брадикарди илэрдэг. Энэ ямар учиртай вэ?

А. Өвчтөн тайширснаас

Б. Венийн судсаар буцах цусны хэмжээ ихэссэнээс

С. . Хүйтэн хийгээр хэвллийн хөндийг дүүргэнээс гипотерми үүсч

Д. Венэр их шингэн юулснээс

/452./ Нарийн гэдсэнд хаван үүсэх, лимфийн фолликулууд нь хөөх, гэдэсний хананд буглаа үүсэх өвчнийг заана уу?

А. Уинлийн өвчин

Б. Сүрьеэз

С. Амебиаз

Д. ДОХ

Е. Кроны өвчин

/453./ Элэгний буглааг ялган оношлох өвчин нь:

А. Өрцний ивэрхий

Б. Сепсис

С. Элэгний бэтэг

Д. Элэгний хатуурал

Е. Элэгний цочмог үрэвсэл

/454./ Наалдац үүсгэхгүй шалтгаан нь аль нь вэ?

А. Хэвлпийд химиин бодис орох

Б. Хэвлпийд гадны биет үлдэх

С. Хэвлпийн эрхтэний үрэвсэлт өвчин

Д. Хэвлпийн хананд цус хурах

Е. Хэвлпийд халдвэр орох

/455./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед уушгийг гэмтээсэн шинж тэмдэг нь:

А. Өвдөлт

Б. Амьсгалах ажиллагаа алдагдах

С. Гэмтсэн талд амьсгалын чимээ сонсогодохгүй байх

Д. Гэмтсэн талд хууртай хэрчигнуур сонсогох

Е. Гэмтсэн талд нойтон хэрчигнуур сонсогох

/456./ 12 хуруу гэдэсний агуулагдахуун тархах магадлалтай замыг заана уу?

А. Баруун өрцний дор баруун хажуугийн суваг

Б. Баруун хажуугийн суваг

С. Хэвлпийн хөндийд тархмал

Д. Өрцний зүүн дор

Е. Гялтангийн арын зайгаар

/457./ Цочмог эмпием архарт шилжих шалтгаан юу вэ?

А. Олон тасалгаат идээт хөндий байх

Б. Идээг бүрэн гадагшлуулж авсанаас

С. Антибиотик эмчилгээг хангалттай хийснээс

Д. Уушиг бүрэн тэлэгдсэнээс

Е. Өвчтөний биеийн эсэргүүцэл сайн байснаас

/458./ Уушигны буглаа үүсэх гол шалтгаан нь:

А. Аспираци

Б. Бронхи хавдраар дарагдах

С. Пневмококкийн хатгаа

Д. Уушигны завсрлын эдийн хатгаа

Е. Сүрьеэз

/459./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн ивэрхийн ипрэх шинжийг заана уу.

А. Өвчүүний араар өвдөх + аюулхайд өвдөх + хахаж цацах

Б. Өвчүүний араар өвдөх + хахаж цацах + зүрх хурдан цохилох

С. Өвчүүний араар өвдөх + хахаж цацах + бөөлжих

Д. Хахаж цацах + хэвтээ байрлалд биеийн байдал муудах + цээжкорсох

Е. Аюулхайд өвдөх+ зүрх хурдан цохилох + бронхит

/460./ Мөгөөрсэн хоолойн тэлэгдэлд хэзээ мэс засал хийх вэ?

А. Өвчин илэрсэн тохиолдолд

В. Өвчин илрээд хоёроос дээш жил болсон

С. Идээт цэр үүсэхэд

Д. Үрэвсэл ушигны нэг дэлбэнд тархсан үед

Е. Үрэвсэл ушигны нэг дэлбэнгээс хэтэрсэн үед

/461./ Элэгний бэтэгтэй өвчтөний цусны шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

А. Лейкоцитоз

Б. Лейкопени

С. Эозинофилез

Д. СОЭ ендөр

Е. Лимфопени

/462./ Хэт авиаагаар цөсний өрөнхий цорго нь өргөссөн механик шартай өвчтөнд онош тодруулах зорилгоор ал шинжилгээг сонгон хийвэл илүү үр дүнтэй вэ

А. Компьютер-томографи

Б. Цөсний замын сцинтиграфи

С. Дурангийн ретроград холангипанкреатографи

Д. Холангографи хураагуур судсаар

Е. Элгэнд пункц хийж холангографи хийх

/463./ Хоногт 200 мл шингэн ялгаруулдаг нарийн гэдэсний сорвижсон цоорхойг оновчтой эмчлэх аргыг заана уу?

А. Гэдэсний нэг хэсгийг тайрах

Б. Мэс заслын биш эмчилгээ

С. Цоорхойг бөглөх цавуулаг зүйлийг хэрэглэх

Д. Колченоговын бөглөгчийг хэрэглэх

Е. Гуурсаар хоолпох

/464./ Эмнэл зүйн шинжээрээ хэвллийн наалдаст өвчин нь аль вэ?

А. Гэдэсний зам түгжирэн бөглөрөх

Б. Гэдэсний замаас цус алдарт

С. Дарагсан хэлбэрийн наалдаст өвчин

Д. Өвдөлтөт хэлбэрийн наалдаст өвчин

Е. Гэдэсний динамик түгжрэл

/465./ Мэс заслын тасагт цээжний хөндий уушиг гэмтсэн тохиолдолд гүйцэтгэх эмчилгээ:

А. Шокийн эсрэг эмчилгээ

Б. Цээжний хөндийд гуурс тавих

С. Мэс заслын бус эмчилгээ

Д. Яаралтай хагалгаа хийх

/466./ Цээжний гялтан хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар эмчилгээнээс бусдыг орзоглэх вэ?

А. Үрэвслийн эсрэг эмчилгээ

Б. Хатгалт

С. Торакоцентез

Д. Торакотоми

Е. Бронхоор дурандаж цэвэрлэх

/467./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийн үед хэрэглэгдэх илүү үр дүнтэй эмчилгээг заана уу.

А. Нянгийн эсрэг эмчилгээ + амьсгалын дасгал

Б. Нянгийн эсрэг эмчилгээ + агаар эмчилгээ

С. Амьсгалын дасгал + антибиотикоор утах

Д. Агаар эмчилгээ + антибиотикоор утах

Е. Агаар эмчилгээ + хэвтэхдээ цээж гудрага байх

/468./ Цэсийг авсаны дараах хам шинжийн эмчилгээ

А. Цэс хөөх эмийн эмчилгээ хийнэ.

Б. Элэгний үйл ажиллагааг сайжруулах эмчилгээ хийнэ.

С. Цөсний литоген чанарыг буулгах эм өнө.

Д. Лапароскопи хийнэ.

Е. Резидуаль чулууг давтан хагалгаагаар авна.

/469./ Наалдац үүсгэхгүй нь :

- A. Механик гэмтэл
- B. Хэвлүйд цус хурах
- C. Гүрвэлзэх хөдөлгөөн ихсэх
- D. Гялтан хальсны үрэвсэл
- E. Гэдэс саажих

/470./ Цээжний гялтан хальсны идээт үрэвслийн үед илрэх шинж:

- A. Ханиалгахгүй
- B. Өвчтөний байрлал идэвхтэй
- C. Уруул ам хөхрөнө
- D. Чагнахад ширүүн амьсгал сонсогдоно
- E. Рентгенээр гялтанд шингэн тодорхойлогоно

/471./ Зураг дээр уушигны аль дэлбэнд мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг хайх хэрэгтэй вэ?

- A. Доод хэсэгт
- B. Дээд хэсэгт
- C. Бүх хэсэгт

/472./ Аль нь эвдрэлтэй цэсний цочмог үрэвслийн шинж вэ?

- A. Үе үе халуурах, шарлах, элэг томрох
- B. Хэвлүйн гялтангийн түгээмэл үрэвслийн шинж илрэх
- C. Өвчтөний мэдүүлгээрхүрц өвдлөөрөрэхэлсэн, баруун хавирган доорөвдөлт багатай цэсний хүүдийн хэмжээ томорсон нь тэмтрэгдэнэ. Биеийн халуун хэвийн.
- D. Хэсгийн гялтангийн үрэвслийн шинж илэрнэ. Гэдэсний саажилтын шинжтэй.
- E. Элзэгний орчим хүчтэй өвдэж, арьс салст нь шарласан баруун суврэгтэсэмзэглэлтэй тэр хэсэгт булчин нь чангасан.

/473./ Хэвлүйн наалдаст өвчний мэс заслын эмчилгээ аль нь вэ?

- A. Таннерийн хагалгаа
- B. Нобель-Чайлдзын хагалгаа
- C. Лапароскопи
- D. Гэдэс хаймсуурдахгүй
- E. Оментогепатопекси

/474./ Цээжний баруун урд талаас нээхэд харагдах уушигны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын дарааллыгзаа.

- A. Мөгөөрсөн хоолой - уушигны тараагуур судас + уушигны дээд хураагуур судас+ уушигны доод хураагуур судас
- B. Уушигны тараагуур судас - мөгөөрсөн хоолой + уушигны доод хураагуур судас+ уушигны дээд хураагуур судас
- C. Уушигны доод хураагуур судас- уушигны дээд хураагуур судас + мөгөөрсөн хоолой+ уушигны тараагуур судас
- D. Уушигны доод хураагуур судас-уушигны дээд хураагуур судас + уушигны тараагуур судас+ мөгөөрсөнхоолой

/475./ Холедохоеюно залгаасыг ямар оёогоор хийх вэ?

- A. Үргэлж хөвөрсөн оёо
- B. Зангилгаат
- C. Давхар оёо
- D. Мульгиновын оёо
- E. "П" хэлбэрийн оёо

/476./ Хүндэрсэн мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн тархмал болсон тохиолдолд эмнэл зүйн ямар шинж нэмэгдэх вэ?

- A. Биеийн ачаалал нэмэгдэхэд амьсгаадах
- B. Хөхрөлт үүсэх
- C. Идээт хордлого
- D. Уушгинд зогсонги илрэх
- E. Байн-байн хурцаах

/477./ Бүдүүн гэдэсний зүүн хэсгийг цусаар хангах чухал үүсвэрийг заана уу?

- A. Дээд чацаархайн тараагуур судас
- B. Гэдэсний гол судас

- C. Дэлүүний тараагуур судас
- D. Доод чацархайн тараагуур судас
- E. Ташааны дотуур эүүн тараагуур судас

/478./ Хүндрээгүй цөсний хүүдийн усжилтын үед аль хагалгааг нь хийх вэ?

- A. Холецистоэктоми
- B. Холецистостоми
- C. Холецисто-гастроанастомоз
- D. Холецисто-энтероанастомоз
- E. Холецисто-дуодено анастомоз

/479./ Улаан хоолойн дисфаги /хажаж цацах нь/ нь залгихын аль үед нь ажиглагдах вэ?

- A. Хоол буюу шингэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх I үед
- B. Хоол заглиураас улаан хоолойн хөндий руу түлхэгдэх II үед
- C. . Хоол улаан хоолойгоор дунд ба доод 1/3-ийн хэсгээр дамжих III үед
- D. Хоол ходаодны амсарт орох үед
- E. Аль ч үед алдагдахыг хэлнэ.

/480./ Кроны өвчин нь өвөрмөц шархлаат колитоос юугаараа ялгагдах вэ?

- A. Суулгалт
- B. Өвдөлт
- C. Өтгөнд цус гарах
- D. Саажилт үүсэх
- E. Чичирч халуурах

/481./ Цээжний битүү гэмтлийн үед өвчтөний биеийн байдал хүнд, хөхрөлт илэрч, сөөнгөтөн хүзүүний арьсан дор хий үүсчээ. Ямар гэмтэл болохыг тодорхойл.

- A. Уушиг их хэмжээгээр урагдсан
- B. Улаан хоолой гэмтсэн
- C. Мөгөөрсөн хоолой эхний хэсгээрээ тасарсан
- D. Уушиг няцарсан
- E. Олон хавирага хугарсан

/482./ Цээж хэвлэлийн хавсарсан гэмтлийн үед хийгдэх мэс заслын эмчилгээний шийдэл

- A. Хэвллийн хөндийг нээх
- B. Цээжний хөндий нээх
- C. Цус алдалт үргэлжилж буй хэсгээс эхлэх
- D. Аль хөндийн эрхтэн гэмтсэн тэр хэсгээс эхлэх
- E. Хоёр хөндийн хэсгийг нэгэн зэрэг нээх

/483./ Шамбрамын эмнэл зүй нь аль вэ?

- A. Шинж тэмдэггүй шамбрам
- B. Хундээр бие засахад цус гарах
- C. Гүйлгэлт
- D. Шулуун гэдэсний салст унжих
- E. Ye үе халуурах

/484./ Цөсний ерөнхий сувагт гуурс тавих оновчтой арга нь аль вэ?

- A. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн 1/2 урттай тууш зүсэлтээр
- B. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн тэнцүү урттай тууш зүсэлтээр
- C. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн 1/2 урттай хөндлөн зүсэлтээр
- D. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн тэнцүү урттай хөндлөнзүсэлтээр
- E. Цөсний сувгийн тайрсанаар

/485./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний хүндрээгүй гулсамтгай ивэрхийн үед мэс заслын эмчилгээг аль хувиар хийхийг заана уу?

- A. Өвчтөнүүдийн 10%-иасбага хувьд
- B. Өвчтөнүүдийн 20-40%-д
- C. Өвчтөнүүдийн 41-60%-д
- D. Өвчтөнүүдийн 61-80%-д
- E. 81-ээс их хувьд

/486./ Бүдүүн гэдэсний элбэг тохиолдох төрөлхийн гажиг нь:

- A. Гиршпрунгийн өвчин

- B. Долихоколи
- C. Долихсигма
- D. Нарийсалт
- E. Дистони

/487./ Ахалази кардийн эмчилгээний үндсэн зарчмыг заана уу.

- A. Ходоод, гэдэсний рефлюксыг устгах
- B. Сорвижсон эдэд улаан хоолойн дагуу эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх
- C. Сорвижсон эдэд улаан хоолойд хөндлөнгөөр эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх
- D. Сорвижсон эдийгзүсах
- E. Сорвин ёөрчлөгдсөн улаан хоолойг тайрах

/488./ Миелойдын метаплази оноштой, дэлүү нь их томорсон, улаан хоолойн судас өргөссөн өвчтөн гэнэт улаан хоолойн судаснаас цус алжээ. Өвчтөнд цустотгоох эмчилгээ хийж, тухайн үедээ цусыг тогтоосон. Уг өвчтөнд мэс заслын аль аргыг сонговол тохиромжтой вэ?

- B. Дэлүүг авч улаан хоолойн өргөссөн судсыг боох
- C. Дэлүүг авч хаалган хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судас
- D. Дэлүүг авч дэлүүний хураагуур судсыг бөөрний хураагуур судастай залгах
- E. Дэлүүг авч чацаархайн хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судастай залгах

/489./ Гол судасны хавхлагын дутагдлын үеийн шинж:

- A. Гол судас нь нийтдээ өргөснө
- B. Гол судасны өгсөх хэсэг нь өргөснө
- C. Гол судас нь нийтдээ нарийсна
- D. Гол судас ёөрчлөгдхөгүй
- E. Зүүн ховдлын хэмжээ багасна

/490./ 12 хуруу гэдэсний шархлаатай өвчтөнд хэдийд мэс засал хийж болох вэ?

- A. Тухайн бүрдмэл эмийн эмчилгээ үр дүнгээ өгөөгүй бол
- B. Олон дахин дахилт өгөх
- C. Каллёз шархлаа, зэргэлдээх эрхтэнд нэвчсэн үед
- D. Ходоодны шүүсний хүчиллэг ихэссэн олон тооны шархлаануудтай
- E. Өвчиний мэдуулгээс олон дахин цус алдсан

/491./ Шамбарам өвчний үед аль шинжүүд нь байх вэ?

- A. Өтгөн нь лентхэлбэртэйгарах
- B. Геморрейн зангилааны судасны хатуурах
- C. Хошного орчмоор загатнах
- D. Өтгөн хатах
- E. Шулуун гэдсээр цус алдах

/492./ Элэг, 12 хуруу нугалаа гэдэсний холбоосын нэвчтэстэй цэсний цочмог үрэвслийн аль хагалгааг хийж нь тохиромжтой вэ?

- A. Цэсний хүүдийг нээх
- B. Цэсний хүүдийг авах
- C. Цэсний хүүдийг авах + Цэсний сувгаар ерөнхий цоргонд гуурс тавих
- D. Цэсний хүүдийг авах + 12 хуруу нугалаа гэдсээр дамжуулан хуниасыгнэхэн сэргээх
- E. Цэсний хүүдийг авах + Цэсний ерөнхий сувгийн ялгаруулалтыг эрчимтэй ихэсгэх арга хэмжээ авах.

/493./ Өрцний ивэрхийн зонхилон тохиолддог клиник шинж тэмдгийг заана уу.

- A. Аюулхайд цанхайх, өвдөх
- B. Хоол идсэний дараа амьсгаа давхцах
- C. Хоол идсэний дараа хүчтэй ханиалгах
- D. Юм залгиж чадахаа болих
- E. Хоол идсэний дараа бөөлжих

/494./ Мөгөөрсөн хоолойд бага зэрэг ялзралт үүсч голчийн үрэвсэл үүссэн бол ямар арга хэмжээ авах вэ?

- A. Гэмтсэн хэсгийг мэс заслын үед оёх, гуурс тавих
- B. Гэмтсэн хэсэг дээр булчингийн нөхөөс тавих

- C. Уушгийг гэмтсэн хэсгээр нь тайрах
- D. Мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавих
- E. Тусгай арга хэмжээ авахгүй

/495. /Өрцний ивэрхийн үүсэх шалтгааныг заана уу?

- A. Өрцний улаан хоолойн нүх өргөн байх
- B. Ходоодны холбоосын дутуу бэхэлгээ
- C. Богино улаан хоолой
- D. Хэвллийн доторх даралт гэнэт ихэссэн
- E. Ye үе бөөлжих

/496. / Элэг оёх үр дүнтэй оёдлыг заана уу.

- A. Чернийн оёдол
- B. Кузнецов, Пенскийн оёдол
- C. Оврагийн оёдол
- D. Лабоккогийн оёдол
- E. Оптемийн оёдол

/497. /Хэвийн үед тосгуур ховдлын зангилаагаар импульс ямар хугацаанд дамжих вэ?

- A. 10-50 мс
- B. 50-130мс
- C. 50-150мс
- D. 50-200мс
- E. 200-с их мс

/498. / Ямар шалтгааны улмаас үүссэн механик шард дурангаар мэс засал хийх

- A. Нойр булчирхайн толгойн хавдар
- B. Цөсний ерөнхий цоргын хавдар
- C. Фатеровын хөхлөгийн хавдар
- D. Цөсний элэгний цоргын чупуу
- E. Оддын хуниас сорвижин нарийсах

/499. / 2 см болон түүнээс том хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний цус алдсан шархлаанд хийх оновчтой мэс заслыг заана уу?

- A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах
- B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх
- C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
- D. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх нугалуурыг нөхөн сэргээх
- E. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг шархлаанд зүслэг хийх, нугалуурыг нөхөн сэргээх

/500. /Үүдэн венийн даралт ихдэх өвчний үед хийх мэс заслууд:

- A. Спленоэктоми
- B. Элэгний судсыг боо
- C. Элэгний судсыг бөглөх
- D. Ходоодны амсарыгтайрах
- E. Ходоодны судсуудыг боох