

АНАГААХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ **2025 ОНЫ**
ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД **ХҮҮХДИЙН ЭМЧ** МЭРГЭЖЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН **ЖИШИГ СОРИЛ**

Сорилын зөв хариулт: хувилбаруудын зөвхөн харласан хэсэг нь зөв хариулт болно.

1. Нярайг халдварт өртөхөөс сэргийлэхэд аль нь орохгүй вэ?

- A. Шаардлагагүй эмнэлгийн ажилбар хийхээс зайлсхийх
- B. Антибиотик эмчилгээ урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийх
- C. Эхийн сүүгээр хооллох
- D. Хүйг хуурай байлгах
- E. Эх болон эмнэлгийн ажилчид гараа угааж хэвших

2. Хөөсрөх сорилыг биологийн ямар шингэнд хийх вэ?

- A. Шээс
- B. Нугасны шингэн
- C. Ходоодны агууламж
- D. Цэр
- E. Өтгөн

3. Эмнэлзүйд алга, ул шар байгаа бол цусны билирубины түвшин хэд байж болох вэ?

- A. 5 мг% хүртэл
- B. 15 мг%-иас дээш
- C. 12 мг%-иас дээш
- D. 4 мг% хүртэл
- E. 15 мг% хүртэл

4. 100 мл цуснаас хэдэн мг билирубин үүсэх вэ?

- A. 5 мг
- B. 3 мг
- C. 10 мг
- D. 20 мг
- E. 1 мг

5. Гиалин бүрхүүлт өвчний үед рентген шинжилгээнд гарах өөрчлөлтийг заа.

- A. Чээжний хөндийд агаар байх
- B. Өрц хавтгайрах
- C. Уушгинд зүрхний сүүдэртэй нийлсэн тархмал сүүдэр гарна
- D. Уушгины зураглал олширох
- E. Агааран бронхограмм илрэх

6. Анхдагч апноэгийн үед илрэх шинжийг сонгоно уу?

- 1. Зүрхний цохилтын тоо цөөрөх
- 2. Цочрооход хариу үзүүлэх
- 3. Арьс цонхийж цайх
- 4. Гасп хэлбэрээр амьсгалахыг оролдох
- 5. Цусны даралт унах

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

7. Нярайн үжил ба мэнэнгийн үед 1-р сонголтын антибиотик аль нь вэ?

1. Прокайн пенициллин

2. Гентамицин

3. Эритромицин

4. Ампициллин

5. Клоксациллин

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

8. Ургийн халдвар хэдийд үүсдэг вэ?

1. Төрсний дараа

2. Төрөхөөс өмнө

3. Хөхний сүүгээр

4. Төрөх үед

5. Жирэмслэхээс өмнө

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

9. Нярайг хэдийд амлуулах вэ?

1. Хөхөнд сүү орсон үед

2. 24 цаг болоод

3. Ангир уургаа саасны дараа 3 цаг тутамд

4. 30 минутаас 1 цагийн дотор

5. Төрсний дараа 20 минутын дотор амлуулна

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

10. Нярай хүүхдэд допаминыг их тунгаар хэрэглэхэд гарах гаж нөлөөг нэрлэнэ үү?

1. Зүрхний цохилт олшрох

2. Зүрхний хэм алдагдах

3. Уушгины даралт ихсэх

4. Зүрхний цохилт удаашрах

5. Зах хязгаарын судас өргөсөх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

11. Уушгины үрэвсэл үүсэхэд нөлөөлөх урьдал хүчин зүйлийг заана уу.

1. Ураг орчмын шингэн урьтаж гараад, усгүй үе удаан үргэлжлэх
2. Төрөх үед үтрээний үзлэгийг олон дахин хийх
3. Эх нь ямар нэг халдвартай байх /амьсгалын, шээс бэлгийн гэх мэт/
4. Дутуу төрөлт
5. Ургийн хөгжлийн саатал

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

12. Гипотермийн эмнэлзүйн шинжүүдийг сонгоно уу.

1. Амьсгал түргэсч, зүрхний цохилт хурдасна
2. Хөдөлгөөний идэвх суларч, хөхөндөө муудна
3. Бие нь хөрч, хөдөлгөөн ихсэнэ
4. Амьсгал, зүрхний цохилтын тоо цөөрч, амин чухал эрхтний үйл ажиллагаа дарангуйлагдана
5. Арьсны өнгө ягаарна

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

13. Бага жинтэй нярайг дулаан байлгах аргуудыг нэрлэнэ үү.

1. Дулаан өрөө тасалгаа
2. Дээрээсээ халдаг ширээ
3. Имж эх арга
4. Агаар халаагчтай инкубатор
5. Малгай өмсгөх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

14. Нярайн шарлалтын шалтгааныг заана уу.

1. Цөсний сувгийн төрөлхийн битүүрэл
2. Төрөлхийн цитомегаловирусийн халдвар
3. Элэгний үрэвсэл
4. Төрөлхийн тэмбүү
5. Галактоземи

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

15. Даарсан хүүхдийг хэрхэн дулаацуулах вэ?

1. Нярайг нүцгэлж, эхийн нүцгэн цээжинд наана
2. Толгойд малгай өмсгөнө
3. Хөхүүлнэ
4. Халуун усанд оруулна
5. Эмнэлэгт яаралтай илгээнэ

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

16. Дараах шинжүүдийн аль нь халдварын үед аюултай шинжид орох вэ?

1. Амьсгалын тоо олширох
2. Ихээр бөөлжих ба суулгах
3. Чээж хүчтэй хонхолзох
4. Биеийн халуун хэт буурах
5. Татах

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

17. Ямар тохиолдолд цитомегаловирусийн төрөлхийн халдвартай гэж үзэх вэ?

1. Эх, хүүхдийн цусанд ЦМВ-ийн эсрэг IgG илэрсэн
2. Цитомегаловирусийн геном илэрсэн
3. Давтан шинжилгээгээр хүүхдийн цусны ЦМВ-ийн эсрэг IgG эхийнхээс 1.5-2 дахин буурсан
4. Хүүхдийн цусны ЦМВ-ийн эсрэг IgG эхийнхээс 4 дахин өндөр
5. Хүүхдийн цусны ЦМВ-ийн эсрэг IgG эхийнхээс 4 дахин бага

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

18. Амьдралын эхний хоногт шарлалт үүсгэх шалтгааныг заана уу.

1. Нярайн цус задрах өвчин
2. Үжил
3. Ургийн халдвар
4. Цус харвалт
5. Цусны эс олширох

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

19. Хламидын шалтгаант нүдний үрэвслийг хэрхэн эмчлэхийг заана уу.

1. Тетрациклины тосон түрхлэг хэрэглэнэ
2. Эритромицины тосон түрхлэг хэрэглэнэ
3. Пенициллин тарина
4. Эритромицины сироп уухаар хэрэглэнэ
5. Ампициллин тарина

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

20. Амьсгалын дистресс хамшинжийн хүндрэлд аль нь хамаарах вэ?

1. Артерийн цорго битүүрээгүй
2. Тархины ховдлын эргэн тойронд цус харвах
3. Үрэвсэлт өөрчлөлт илрэх
4. Хүчилтөрөгч эмчилгээний хүндрэл үүсэх
5. Уушгинд цус харвах

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

21. Цитомегаловирусийн төрөлхийн халдварын үед илрэх эмнэлзүйн гол шинжүүд:

1. Цусархаг тууралт
2. Элэг, дэлүү томрох
3. Шарлалт
4. Гидроцефали
5. Том жинтэй төрөх

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

22. Нярай хүүхдийн биеийн хэвийн халуун хэдэн хэм байдаг вэ?

1. 37-38^{ОС}
2. 36-38.5^{ОС}
3. 35-36 ^{ОС}
4. 36.5-37.4^{ОС}
5. 35-36^{ОС}

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

23. Нярай хүүхэд дулаанаа алдах замуудыг нэрлэнэ үү.

1. Зулайгаар дулаанаа цацруулах
 2. Орчиндоо шилжүүлж алдах
 3. Хавьтлын замаар
 4. Ууршлын замаар
 5. Агаар дуслын замаар
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

24. Амьсгалын дистресс хамшинжийн үед илрэх эмнэлзүйн нийтлэг шинжүүд:

1. Амьсгал олшрох
 2. Амьсгал гаргахдаа яраглах
 3. Амьсгалд туслах булчингууд оролцох
 4. Хөхрөх
 5. Чээжний 2 тал амьсгалд жигд бус оролцох
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

25. Төрөлхийн тэмбүүтэй хүүхдэд илрэх гол шинж тэмдэг юу вэ?

1. Ургийн өсөлтийн саатал
 2. Хамар битүү
 3. Гар, хөлийн улаар цэврүүтэй
 4. Ургийн ус бохир ногоон
 5. Бүтэлттэй төрдөг
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

26. Цусны чихэр багадалт хэдийд зонхилон тохиолдох вэ?

1. Төрмөгц
 2. Амьдралын эхний 24 цагт
 3. Амьдралын эхний 48 цагт
 4. Амьдралын эхний 3 хоногт
 5. Амьдралын эхний 7 хоногт
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

27. Биеийн дулаан бууралтын эмнэлзүйн шинжүүдийг заана уу.

1. Амьсгал түргэсч, зүрхний цохилт хурдсана
2. Хөдөлгөөний идэвх суларч, хөхөндөө муудна
3. Бие нь хөрч, хөдөлгөөн ихсэнэ
4. Амьсгал ба зүрхний цохилт цөөрнө
5. Арьсны өнгө ягаарна

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

28. Амьсгалын дистресс хамшинжийн эмнэлзүйн шинж тэмдгийг заана уу.

1. Амьсгалын тоо олширох

2. Яраглах

3. Чээж хонхолзох

4. Хөхрөх

5. Хамрын угалз сарталзах

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

29. Эрт илрэлтэй үжлийн үед ихэвчлэн тохиолдох үүсгэгчийг заана уу.

1. Псевдомонас

2. В-бүлгийн стрептококк

3. Стафилококк

4. Гэдэсний савханцар

5. Клебсиел

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

30. Нярай хүүхэд дулаан алдахаас сэргийлэхэд аль нь буруу вэ?

1. Эхийн нүцгэн биед нааж, дулаан хучих

2. Төрмөгц нь хуурайшуулах

3. Өрөө тасалгаа дулаан байх

4. Чанга өлгийдөх

5. Малгай өмсгөнө

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

31. Гэдэсний үхжилт үрэвслийн үед гэдэс-ходоодны талаас гарах өөрчлөлтүүдийг заана уу.

1. Гэдэс дүүрэх

2. Ходоодны үлдэгдэл агууламж ихсэх буюу хоол шингэхгүй байх

3. Бөөлжих

4. Цустай баах

5. Хэвлийн хана улайх

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

32. Ураг, нярайн халдварт өртөх эрсдэлт хүчин зүйлд аль нь хамаарах вэ?

1. Ураг орчмын шингэн үнэртэй байх, ус ихтэй байх

2. Дутуу төрөлт

3. Эх барихын ажилбарууд

4. Эхийн эрүүл ахуй сайн

5. Бүтэлттэй төрж, сэхээн амьдруулах арга хэмжээ авагдсан байх

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

33. Цус задрах өвчний үед цус орлуулан сэлбэх эмчилгээний заалтыг нэрлэнэ үү.

1. Цусны билирубин >342 мкмол/л

2. Билирубины цагийн өсөлт >6 мкмол/л

3. Хүйн цусанд билирубиний хэмжээ >60 мкмол/л

4. Цусны билирубин >205 мкмол/л

5. Хүйн цусанд билирубины хэмжээ >45 мкмол/л

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

34. Төрөх өрөөнд түргэн төрөлтөөр төрсөн нярай амьдралын эхний минутад амьсгал тогтворжоогүй, зүрхний цохилт 1 минутанд 140 удаа, хөл ба гарын үзүүр хөхөрсөн, булчингийн хүчдэл суларсан, цочролд сул хариулна.

Бүтэлтийг ангилж, Апгарын оноог тогтооно уу.

1. Хүнд бүтэлт

2. Хүндэвтэр бүтэлт

3. Апгарын оноо 5

4. Апгарын оноо 6

5. Апгарын оноо 7

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

35. Төрөх өрөөнд ургийн ус эрт гарсан, илүү тээлттэй эх төрөх гэж байна. Нярайд шаардлагатай хэрэгслийг бэлдэнэ үү.

1. Дулаан цацруулагчтай ширээ
2. Нярайг хуурайшуулах даавуу, дулаан өлгий
3. Салиа соруулах төхөөрөмж
4. Хүүдий, маск
5. Шаардлагатай эм

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

36. Төрөх өрөөнд эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг чандлан сахина. Үүнд:

1. Цэвэр гар
2. Цэвэр талбай
3. Цэвэр даавуу, өлгий
4. Хүй таслах, боох хэрэгсэл ариун байх
5. Эх, нярайд хэрэглэх багаж, хэрэгсэл ариун

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

37. Нярайн гемостазын онцлог юу вэ?

1. Улаан эс 1 мм³-т 6.09 сая
2. Хоёр төрлийн гемоглобин агуулдаг
3. Цусан дахь фибриногений хэмжээ бага
4. Цус бүлэгнэлтийн II, VII, IX, X хүчин зүйлс бага
5. Эргэлдэх цусны хэмжээ биеийн цулын 11%- тай тэнцүү

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

38. Төрөлхийн тэмбүүтэй хүүхдэд ямар антибиотик сонгох вэ?

1. Эритромицин
2. Амоксациллин
3. Хлорамфеникол
4. Пенициллин G
5. Ципрофлоксацин

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

39. Амьсгалын дистресс хамшинжийн үед авах арга хэмжээний зарчмыг заана уу.

1. Хүүхдийг тайван байлгах
2. Нярайг дулаан байлгах
3. Салиаг сайтар соруулж, хахахаас сэргийлэх
4. Хүчилтөрөгч өгөх
5. Амьсгал зүрх судасны үйл ажиллагааг тогтмол хянах

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

40. Нярайн булчингийн сулрал ямар эмгэгүүдийн үед илрэх вэ?

1. Бүтэлт
2. Мэдрэл-булчингийн төрөлхийн өвчин
3. Тархи-нугасны гэмтэл
4. Дауны хамшинж
5. Дутуу нярай

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

41. Нярай хүүхдийг хөхөөр хооллохтой холбоотой буруу зөвлөгөөг олно уу.

1. Ангир уураг нь хүүхдэд хэрэгцээтэй шимт бодисыг агуулсан байдаг
2. Шөнө хөхүүлэх нь сүүний гарцыг бууруулна
3. Хөхөө ойр ойрхон хүүхдээ хүссэн үед нь хөхүүлэх нь чухал
4. Ангир уураг маш бага хэмжээтэй тул чихэртэй усаар нэмж угжина
5. Шөнө хөхүүлэх нь сүүний гарцыг сайжруулна

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

42. Физиологийн шарлалт эмгэг шарлалтаас ялгагдах шинж нь:

1. Төрмөгц үүсээд удаан үргэлжилдэг
2. Төрсний дараах 2-3 хоногт үүсдэг
3. Шарлалт арилсны дараа дахин үүсч болдог
4. 10-аас илүүгүй хоноод арилдаг, биенд ямар нэгэн зовуурьгүй
5. Билирубины хэмжээ 12 мг%-аас их болно

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

43. Нярайн хүй өтгөнөөр бохирдсон, идээлж, улайгаагүй байвал яаж цэвэрлэх вэ?

1. Антибиотиктой цацлага хийнэ
 2. Цэвэр зүйлээр дарж бооно
 3. Спиртээр цэвэрлэнэ
 4. Савантай буцалсан бүлээн усаар угааж, хуурайшуулна
 5. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

44. Нярайн халдвар үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс:

1. Ураг орчмын шингэн эрт гарах
 2. Эхийн бэлгийн замын халдвар
 3. Бага жинтэй төрөх
 4. Төрөхдөө бүтэх
 5. Гараа муу угаах
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

45. Трансфераза ферментийн идэвхжлийг бууруулах хүчин зүйлийг заана уу

1. Хүчилтөрөгчийн дутмагшил
 2. Халдварын гаралтай өвчин
 3. Нярайн дулаан алдалт
 4. Бамбай булчирхайн дутал
 5. Халууралт
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

46. Бүтэлтийн зөв тодорхойлолтыг тэмдэглэнэ үү

1. Амьсгалахгүй, зүрх цохилохгүй, амьдын шинжгүй төрөх
 2. Ураг орчмын шингэн булингартай байх
 3. Хүүхэд төрмөгц уйлахгүй байх
 4. Амьд төрөлтийн бусад шинж илэрч байвч хүүхэд амьсгалахгүй буюу амьсгалын хэм алдагдах
 5. Нярай хэвийн амьсгалж байснаа хэсэг хугацааны дараа амьсгалахгүй болж, царай хөхрөх
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

47. Дасан зохицлын үед бөөрний талаас гарах өөрчлөлтийг заана уу.

1. Шээсээр уураг ялгарах
2. Шээс ховордох
3. Шээсний хүчлийн инфаркт
4. Цустай шээх
5. Шээхэд өвдөх

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

48. Нярайн эмчилгээнд фуросемидийн үзүүлэх үйлчилгээ юу вэ?

1. Бөөрний ачаалал ихэсгэх
2. Шээс хөөх
3. Даралт ихэсгэх
4. Судас өргөсгөх
5. Зүрхний дутагдлыг нэмэгдүүлэх

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

49. Зунгагаар хахсан бүтэлттэй төрсөн нярайд цаашид гарах хүндрэлийг заана уу.

1. Гуурсан хоолой бөглөрөх
2. Уушги хэт тэлэгдэх
3. 4Плеврит
4. Авчилз үүснэ
5. Уушгины үрэвсэл

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

50. Хөх чинэсэн үед хүүхдээ хөхүүлэхийн өмнө окситоцины ялгаралтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?

1. Бүлээн шүршүүрт орох
2. Хөхөндөө иллэг хийх
3. Хөхний толгойг имрэх
4. Хөхөндөө бүлээн жин тавих
5. Хүзүү нуруунд иллэг хийх

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

51. Хүүхдийн амьсгал авалт, гаргалтын харьцаа

А. 1.5:1

В. 0.125694444

С. 2.5:1

Д. 2-1.5:1

Е. 0.084027778

52. Уушгины хатгалгаа, чихний халдвар, маш хүнд өвчний үед хэрэглэх нэгдүгээр сонголтын антибиотик

А. Ципрофлоксацин

В. Амоксациллин

С. котримоксазол

Д. Ампициллин

Е. Кларитромицин

53. Антибиотик эмчилгээ хийх заалт

А. Уушгины цусан хангамжийг сайжруулах

В. Биеийн ерөнхий эсэргүүцлийг сайжруулах

С. Дахин халдварлахаас сэргийлэх

Д. Нянгийн өсөлтийг зогсоох

Е. Бүтцийн өөрчлөлтийг зогсоох

54. Залгиурын ужиг үрэвслийн үед гарах онцлог шинж

А. Хоолой сөөнгөтөх

В. Зовуурьтай хуурай ханиах

С. Шөнийн цагаар хуурай, удаан бөгшүүлж ханиалгах

Д. Хуцуулж ханиах

Е. Өглөөгүүр бөгшүүлж ханиалгах

55. Муколизин олон улсын нэршил

А. Ацетилцистейн

В. Амброксол гидрохлорид

С. Бромгексин гидрохлорид

Д. Лизомуцин

Е. Дифенгидроамин

56. Хүүхдэд хэдэн наснаас цулцангийн амьсгал сонсогдох вэ?

А. 9 нас

В. 1 нас

С. 7 нас

Д. 3 нас

Е. 5 нас

57. Хүнд халдвар, хордлогын үед амьсгалын дутагдал үүсэх шалтгаан

1. Зүрхний булчингийн үрэвсэл

2. Эсийн эсгэгийн тогтолцоо хямрах

3. Зүрхний үнхэлцгэн хальсны үрэвсэл

4. Эд, эс хүчилтөрөгч үл шингээх

5. Чээжний гялтангийн хөндийд шингэн хуралдах

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

58. Аденоидитын үед хүүхдэд илрэх эмнэлзүйн шинж

1. Хамар-уруулын нугалаас арилах

2. Нүүр хөөнгө цэлхгэр өвөрмөц харагдах

3. Хамар байнга битүүрэх

4. Амаа ангайн их хухирч унтах

5. Доод эрүү унжих

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

59. Цэр шингэлэх уураг задлагч фермент

1. Панкипсин

2. Химопсин

3. Трипсин

4. Химотрипсин

5. Мукалтин

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

60. АЦХ-тай хүүхдийн гэрийн эмчилгээ

1. Халуун бууруулах

2. Хоолойн өвдөлт намдаах

3. Ханиалга багасгах

4. Амьсгал бачуурлыг намжаах

5. Асаргааг сайжруулах

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

61. Төвөнх, мөгөөрсөн хоолой, гуурсны цочмог үрэвслийг байршлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?

1. Эпиглотит

2. Төвөнх-мөгөөрсөн хоолойн

3. Төвөнх-мөгөөрсөн хоолой-гуурсны

4. Төвөнх-уушгины

5. Төвөнх-гүйлсэн булчирхайн

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

62. Парацетамолын гаж нөлөө

1. Арьс загатнаж тууралт гарах
2. Нүүр хавагнах, нүүр хөхрөх
3. Цус багадах, цагаан эс цөөрөх
4. Цустай шээх
5. Зүрх, бөөр, элэгний үйл ажиллагаа хямрах

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

63. АЦХ-тай хүүхдийг гэрээр асрахдаа анхаарах зүйлс

1. Сайн хооллох
2. Шингэн их уулгах
3. Хүүхдийг хэт бэгнэхгүй байх
4. Хооллохын өмнө хамрыг заавал цэвэрлэх
5. 6 сар хүрээгүй хөхүүл хүүхдийг тураалаас сэргийлж эрт хоолонд оруулах

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

64. Сальбутамолын үйлчлэх механизм

1. Умай, зүрхнээс бусад эрхтний гөлгөр булчингийн α -рецепторыг идэвхжүүлэх
2. Захын судсыг тэлэх
3. Сулралтын даралт бууруулах
4. β -адреносаатуулагчийн эсрэг үйлдэлтэй
5. Гуурсан хоолойн гилгэр булчинг сулруулах

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

65. Амьсгал гаргах саадтай байдал ямар үед үүсэх вэ ?

1. Гуурсан хоолойн булчин агших
2. Гуурсан хоолойд цэр хуримтлагдах
3. Гуурсан хоолойн салс хөөж хавагнах
4. Гуурсан хоолойн багтрааны үед
5. Төвөнхийн үрэвсэл

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

66. Бага насны хүүхдийн хамраас цус гоожих нь ховор байдаг юутай холбоотой вэ?

1. Доод жим байдаггүй
 2. 2 нас хүртэлх хүүхдэд хамрын дайвар хөндий үүсгэвэр төдий буюу огт байдаггүй
 3. Хамрын венийн хялгасан судас гавлын хөндийн тууш вентэй холбогдсон
 4. Хамрын хөндийн доод хэсгийн салст бүрхэвчийн судаслаг эдийн хөгжил дутмаг
 5. Хоногт 0.5-1 л салст ялгаруулах
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

67. Гүйлсэн булчирхайн архаг үрэвслийн үеийн эмчилгээний ерөнхий зарчим

1. Хүүхдийг чийрэгжүүлэх, аминдэмжүүлэх, сайн хооллох
 2. Ерөнхий ба хэсэг газрын дархлаа сулруулах нөлөөллөөс зайлсхийх
 3. Үүсгэгчийн эсрэг антибиотик эмчилгээ
 4. Хордлого тайлах эмчилгээ
 5. Хэсэг газрын эмчилгээ
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

68. Чээжний гялтангийн үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүд

1. Ханиахад өвдөлт багасах
 2. Чээжийг дарах, өвчтэй талаараа хэвтэхэд багасах
 3. Эмгэгтэй талруу бөхийхөд өвдөлт ихсэх
 4. Амьсгал авах, гаргахад өвдөх
 5. Амьсгал авалт саадтай болох
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

69. Ерөнхий үзлэгээр үнэлэх шинж

1. Биеийн ерөнхий байдал
 2. Царайны илрэл
 3. Арьсны өнгө
 4. Биеийн байрлал
 5. Ухаан санааны байдал
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

70. Гуурс тэлэгч эмүүдийг нэрлэ

1. Сальбутамол
2. Адреналин
3. Аминофиллин
4. Пипольфен
5. Супрастин

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

71. Читамоны үйлдэл

1. Цэр ховхлох
2. Тайвшруулах
3. Үрэвсэл намдаах
4. Өвчин намдаах
5. Халуун бууруулах

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

72. Уушгины хатгалгаагүй ханиад шуухинаа гэж ангилсан 4 сартай хүүхдэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

1. 30-аас олон хоног ханиалгасан бол онош тодруулахаар эмнэлэгт хэвтүүлэх
2. Хоргүй зөөлөн эмээр хоолойн өвдөлт, ханиалгыг эмчилэх
3. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөх
4. Хэрэв сайжрахгүй бол 5 хоноод давтан үзүүлэх
5. А-аминдэм өгөх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

73. Амьсгалын эрхтнийг шинжлэн судлах аргууд

1. Асуумж
2. Бодит үзлэг
3. Лаборатор
4. Дуран
5. Рентген шинжилгээ

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

74. Амьсгал авах саадтай байдал ямар үед үүсэх вэ ?

1. Гуурсан хоолойн булчин агших
2. Төвөнхийн үрэвсэл
3. Хамрын салст хөөж хавагнах
4. Гадны биет залгих
5. Гуурсан хоолойн багтрааны сэдрэлийн үед

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

75. Стрептококкоор үүсгэгдсэн залгиурын үрэвслийн ялгагдах шинж

1. Тунгалгийн булчирхай томорч хөндүүрлэх
2. Гүйлсэн булчирхай хавагнан улайж сүвүүдэд идээ тогтох
3. 390C-аас өндөр халуурч хоолой хүчтэй өвдөх
4. Залгиурын салст хуурайших
5. Хамраас салсархаг нус гоожих

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

76. Ханиалга намдаах бэлдмэлийг үйлчлэх механизмаар нь хэрхэн ангилах вэ?

1. Төвийн үйлдэлтэй
2. Захын үйлдэлтэй
3. Хавсарсан үйлдэлтэй
4. Ханиалга сэдээх
5. Ханиалга дарангуйлах

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

77. Хэдэн нас хүртэлх хүүхдэд байршлын тогшилт хийх боломжгүй вэ?

1. 1 нас
2. 3 нас
3. 5 нас
4. 7 нас
5. 9 нас

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

78. Дараах эмгэгүүдийн алинд нь тогшилтын чимээ өөрчлөгдөх вэ?

1. Гялтанд хий, шингэн хуралдах

2. Уушгинд авчилз үүсэх
3. Кораны шинж
4. Уушгины агааржилт ихсэх
5. Философовын аяганы шинж
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

79. АЦХ-ын үед зонхилон хэрэглэдэг эмийн бэлдмэл

1. Цэр ховхлох
2. Ханиалга намдаах
3. Халуун бууруулах
4. Өвчин намдаах
5. Судсаар шингэн сэлбэх
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

80. Төвөнхийн үрэвслийг зонхилон үүсгэх вирусүүдийг нэрлэнэ үү?

1. Томуугийн А1, А2 хэвшинжүүд
2. Иж томуугийн I, II хэвшинжүүд
3. РС-вирус
4. Аденовирус
5. Ротавирус
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

81. Гуурсан хоолойн амьсгал ямар үед сонсогдох вэ?

1. Уушгинд авчилз үүсэхэд
2. Эрүүл хүүхдийн төвөнх, мөгөөрсөн хоолой дээр
3. Уушгины эд хатуурах
4. Уушгины нэвчдэст үрэвсэл, буглаатай үед
5. Гялтан хальс зузаарах
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

82. Бактерицид үйлчилгээтэй антибиотик

1. Пенициллин
2. Цефалоспорин
3. Полимиксин

- 4. Ванкомицин
- 5. Рифампицин
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

83. АЦХ-тай халуунтай хүүхдэд өгөх зөвлөгөө

- 1. 38.50C хүртэлх халуунтай үед шингэн илүү уулгах
- 2. 38.50C дээш халуурвал парацетамол тохирсон тунгаар 6 цагийн зайтай халуун буутал хэрэглэх
- 3. Хөл гарыг чийгтэй алчуураар арчих
- 4. 380C хүрмэгц парацетамол өгөх
- 5. Үүсгэгчийн эсрэг эмийн бэлдмэл өгөх
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

84. Амьсгалын цочмог халдварын үед бага насны хүүхдийн хамрын салст хөөж хавагнахын шалтгаан нь юу вэ?

- 1. Хамар жижигхэн богинохон
- 2. Салст бүрхэвч хөвсгөр
- 3. Хамрын хөндий нарийхан
- 4. Тунгалгийн болон цусны судсаар баялаг
- 5. Доод жим байдаггүй
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

85. Гуурсан хоолойн үрэвслийн онцлог шинж

- 1. Вирүс, нянгаар хавсарч үүсгэгдэх
- 2. Бөглөршилт үрэвслийн үед бөгшүүлж ханиалгах нь илүү
- 3. Ихэнх тохиолдолд бусад хамшинжүүдтэй хавсарч илрэх
- 4. Өвчний эхний хоногуудад хүүхэд хуурай ширүүн, зовуурьтай бөгшүүлж ханиах
- 5. Том хүүхдэд өвчүүний араар сэрвэгнэх, хорсох, халуун оргиж өвдөх
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

86. Гүйлсэн булчирхайн үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн шинж

- 1. Гүйлсэн булчирхай хөөж томрох
- 2. Салстын өнгө улайж хүрэлтэх
- 3. Булчирхайн хонхруудад идээ хурах

- 4. Архаг үрэвслийн үед гүйлсэн булчирхай сорвижиж хатуурах
- 5. Зөөлөн тагнайн хажуу ирмэгтэй наалдах

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

87. Чээжний тэмтрэх үзлэгээр юу тодорхойлох вэ ?

- 1. Чээжний хэнхэрцэгийн уян чанар
- 2. Дууны доргио
- 3. Өвдөлт
- 4. Арьсны зузаан
- 5. Өөхөн эдийн хөгжил

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

88. Дууны доргио ямар тохиолдолд сулрах вэ ?

- 1. Уушгинд авчилз үүсэх
- 2. Чээжний хөндийд шингэн хуралдах
- 3. Чээжний гялтангийн хавдар
- 4. Уушгины эд нягтран хатуурах
- 5. Уушгинд хөндий үүсэх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

89. Хуурай исгэрсэн хэржигнүүр ямар эмгэгүүдийн үед сонсогдох вэ?

- 1. Залгиур, мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл
- 2. Гуурсан хоолойн багтраа
- 3. Уушгины үрэвсэл
- 4. Гуурсан хоолойн бөглөршилт үрэвсэл
- 5. Уушгины нэвчдэст үрэвсэл

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

90. АЦХ-тай хүүхдэд халуун бууруулах эмчилгээг хэдийд хийх вэ?

- 1. Халуурах нь биеийн хамгаалах урвал учраас эмчилгээ хийхгүй
- 2. Хүүхдийн халуун 38.50C-аас дээш үед
- 3. Субфебрил халууралттай үед
- 4. Халуурахаараа татдаг гэсэн өгүүлэмжтэй
- 5. Халуунтай нярай хүүхэд

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

91. Өвчний түүхээс тодруулж асуух зүйл

- 1. Өвчин хэдийд яаж эхэлсэн тухай
- 2. Өвчин үүсэхэд нөлөөлсөн таагүй хүчин зүйл
- 3. Өвчний явц
- 4. Эмчилгээ хийсэн эсэх, үр дүн
- 5. Өсөлт хөгжилт хэвийн явагдсан эсэх

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

92. Амьсгалын замын халдвараас хамгаалах дэглэм

- 1. Сайн унтуулах
 - 2. Цэвэр агаарт гаргах
 - 3. Гимнастик хийлгэх
 - 4. Тэжээллэг хоолоор хооллох
 - 5. Салст бүрхэвчийг цэвэр байлгах
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 - B. Бүх хариулт зөв бол
 - C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 - D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 - E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

93. Аденовирүсээр үүсгэгдсэн залгиурын үрэвслийн онцлог шинж

- 1. Хөөмий, хүүхэн хэл, залгиурын арын хана хавагнан хөөх
- 2. Залгиурын арын хана улаан, бэржгэр болох
- 3. Хүзүүний арын тунгалгийн булчирхай томрох
- 4. Гүйлсэн булчирхай хөөж томрох
- 5. Өвчин дунджаар 2 долоо хоног үргэлжлэх

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

94. Амьдралын түүхээс тодруулж асуух зүйл

- 1. Амьсгалын эрхтний эмгэгээр өвчлөхөд нөлөөлөх урьдал хүчин зүйлүүд
- 2. Хооллолт
- 3. Амьдарлын нөхцөл, орчны эрүүл ахуй
- 4. Урьд өвчилсөн халдварт болон халдварт бус өвчин
- 5. Товлолын дагуу вакцинд хамрагдсан эсэх

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

95. Холимог амьсгаадалт ямар үед үүсэх вэ ?

1. Чээжний гялтан хальсны үрэвсэл

2. Цусны бага эргэлтийн зогсонгишил

3. Гэдэс дүүрэх

4. Хэвлийн хөндийд шингэн хуралдах

5. Хүнд сульдаатай хүүхдэд

A. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

96. Харах үзлэгээр төвөнхийн үрэвсэлтэй хүүхдэд илрэх шинж

1. Хүүхдийн царай цонхийж цайх

2. Хамар-уруул орчмоор хөхөлбий туяатай

3. Зовууртай шаналангүй

4. Амьсгал авах үед туслах булчингийн оролцоо ихсэх

5. Хяхатнасан амьсгал зайнаас сонсогдох

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

97. Мөгөөрсөн хоолойн үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн шинж

1. Томуугийн халдварын үед ихэвчлэн илрэх

2. Эхний хоногуудад хуурай бөгшүүлж ханиалгах

3. Өвчүүний ард, чээж хорсож, зүсэгдэж буй мэт өвдөх

4. Уушги чагнахад амьсгал ширүүн, хуурай эсвэл том хөөслөг цэврүүт нойтон хэржигнүүр сонсогдох

5. Рентген шинжилгээнд уушгины уг ялимгүй өргөсөх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

98. Томуугийн вирүсээр үүсгэгдсэн залгиурын үрэвслийн онцлог шинж

1. Залгиурын арын хана, хүүхэн хэлний уг, зөөлөн тагнайн судсууд өргөсөх

2. Хатуу, зөөлөн тагнай, залгиурын арын хананы салст бүрхэвчинд жижиг, цэгчилсэн цус харвалт гарах

3. Ерөнхий хордлогын шинж тод илрэх

4. Төвөнхийн үрэвсэлтэй хавсарч явагдах

5. 390C-аас өндөр халуурч хоолой хүчтэй өвдөх

A. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

99. Ханиалга намдаах төвийн үйлдэлтэй эм

- 1. Либексин
- 2. Кодеин
- 3. Балтикс
- 4. Этилморфин
- 5. Абехол

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

100. Бага насны хүүхдэд гуурсан хоолойн үрэвслийн үед илрэх зовуурь, эмнэлзүйн шинж

- 1. Хоолонд дургүйцэх
- 2. Ханиах үедээ зовуурьтай уйлах
- 3. Ялангуяа шөнө хүчтэй ханиалгах
- 4. Өвчний 2 дахь 7 хоногоос ханиалга зөөлөрч цэр ховхрох
- 5. Чээж хонхолзох

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

101. Цэр ховхорч буй үед ханиалга намдаах эм хэрэглэхэд гарах өөрчлөлт

- 1. Өвчний зовуурь багасах
- 2. Цэрний гадагшлалт саатах
- 3. Үрэвслийн шинж арилах
- 4. Гуурсны бөглөршилт гүнзгийрах
- 5. Ханиалга багсаж, өвчний эдгэрэлт хурдсах

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

102. Парацетамолын насанд тохирох тунг сонго

- 1. 2 сараас 12 сартай хүүхдэд 100 мг
- 2. 12 сараас 3 настай хүүхдэд 100-125 мг
- 3. 3-5 настай хүүхдэд 250 мг
- 4. 12 сараас 3 настай хүүхдэд 250 мг
- 5. 3-5 настай хүүхдэд 500 мг

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

103. Аль үүсгэгч давамгайлж шээс дамжуулах замын халдварыг үүсгэдэг вэ?

A. A. Хламид

B. C. E.Coli

C. D. Стафилококк

D. B. Вирүс

E. E. Энтерококк

104. Давсаг-шээлэйн сөрөг урсгалыг олон улсын ангиллаар хэдэн зэрэг болгох вэ?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

E. 1

105. Шээс дамжуулах замын халдвар ахлах насныханы дунд аль хүйсэнд илүү тохиолдох вэ?

A. Эрэгтэйд бага тохиолдоно

B. Эм

C. Эр

D. Хоёуланд нь

E. Хүйснээс хамаарахгүй

106. Бактериури гэдэг нь:

A. Лейкоцит 102 дээш байх

B. Давсанд 4 цагаас дээш хугацаанд байсан шээсэнд нян 105 дээш байх

C. Эхэн үеийн хөөстэй үнэртэй шээсийг

D. Нян 103 дээш байх

E. Давсанд 4 цагаас доошгүй хугацаанд байсан дунд үеийн цэвэр шээс

107. Цочмог ГН-ийн үед шээсний талаас ямар өөрчлөлтүүд гарах вэ?

1. Олигоури

2. Гематури

3. Протейнури

4. Пиури

5. Шээсний нягт багасна

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

108. Пиелонефритийн үед ямар үйлчилгээтэй антибиотикийг сонгох вэ?

1. Грам эерэг нянгийн эсрэг

2. Бактерцид

3. Грам сөрөг нянгийн эсрэг

4. Өргөн хүрээний үйлчилгээтэй

5. Бактериостатик үйлчилгээтэй

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

109. Охидын шээсний сувгийн онцлог нь:

- 1. Шээсний суваг өргөн
- 2. Маш богинохон
- 3. Уян, холбогч эдийн хөгжил дутмаг
- 4. Булчингийн ширхэг сайн хөгжсөн
- 5. 3-6 см урт байдаг

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

110. Цочмог гломерулонефритийн үед хавагнаж байгаа шалтгаан

- 1. Цус, шээс ба эдийн эрдсийн бүрэлдэхүүн хямрах
- 2. Хялгасан судасны эзлэхүүн өөрчлөгдөх
- 3. Цусны уураг багассанаас сийвэнгийн онкотик даралт хямрах
- 4. Түүдгэнцрийн шүүрэлтийн хурд нэмэгдсэнээс
- 5. Сувганцрын эргэн шимэгдэлт буурснаас

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

111. ГН-ийн үед үүсэх хавангийн хэмжээнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

- 1. Шээсээр ялгарах уургийн хэмжээ
- 2. Ууж байгаа шингэний хэмжээ
- 3. Түүдгэнцрийн шүүрлийн хэмжээ
- 4. Цусны кальци багасах
- 5. Уургийн онкос даралт өөрчлөгдөхгүй байх

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

112. Архаг ГН нь

- 1. Хүнд явцтай
- 2. Эмнэлзүйн хувьд дахидаг
- 3. Бөөрний дутагдалд амархан ордог
- 4. Бүтцийн эргэшгүй өөрчлөлтөнд ордог
- 5. Зөвхөн анхдагч өвчний үед илэрнэ

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

113. Цочмог гломерулонефритийн үед эмнэлзүйд гарах шинжүүд.

1. Шээс цустах, бортгонцортох

2. Шээсний гарц багасах

3. Шээсний нягт хэвийн эсвэл ихсэх

4. Шээсний нягт багасах

5. Шээсний гарц ихсэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

114. Цочмог ГН-ийн үед өвчтнийг хагас хэвтрийн дэглэмд шилжүүлэх заалт

1. Артерийн даралт хэвийн

2. Хавангүй

3. СОЭ хэвийн

4. Шээсний ерөнхий шинжилгээнд уураг 1% хүртэл буурсан

5. Улаан эсийн тоо цөөрсөн (30-40 х/т)

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

115. Бага насны хүүхдэд бөөр-шээсний замын халдвар үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл:

1. Энтеробиоз

2. Гаж хөгжил

3. Давсагны үйл ажиллагаа алдагдах

4. Баасан дээрээ удаан хэвтэх

5. Хөвгүүдийн тээрхийн нарийсал

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

116. Цочмог гломерулонефритийг бөөрний үйл ажиллагааны байдлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?

1. Бөөрний үйл алдагдаагүй

2. Бөөрний үйл алдагдсан

3. Бөөрний цочмог дутагдал

4. Бөөрний үйл бага зэрэг алдагдсан

5. Бөөрний архаг дутагдал

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

- С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

117. Цочмог ГН-ийн хэдэн хувьд макрогематури илрэх вэ?

- 1. 10
- 2. 30
- 3. 40
- 4. 50
- 5. 100

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

118. Цочмог ГН-ийн үед эмнэлзүйд давамгайлан илрэх эмнэлзүйн хамшинжийг сонгоно уу

- 1. Нефроз хамшинж
- 2. Нефрит хамшинж
- 3. Холимог хамшинж
- 4. АД ихсэх хамшинж
- 5. Өвдөлтийн хамшинж
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- С. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

119. Цочмог гломерулонефритийг үе шатаар хэрхэн ангилдаг вэ?

- 1. Эхний илрэл
- 2. Эдгэрэх
- 3. Архагт шилжих
- 4. Хагас намжилт
- 5. Эмнэлзүй, лабораторийн бүрэн намжилт
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

120. Шээс дамжуулах доод замын халдварт аль нь орох вэ?

- 1. Пиелонефрит
- 2. Уретрит
- 3. Гломерулонефрит
- 4. Цистит
- 5. Тубулопати
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

121. Пиелонефритийн үндсэн хамшинжид аль нь орох вэ?

1. Өвдөлтийн хамшинж

2. Дизурийн хамшинж

3. Хордлогын хамшинж

4. Цусархагшлын хамшинж

5. Хавагнах хамшинж

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

122. Суларсан амьсгал ямар эмгэгүүдийн үед сонсогдох вэ?

1. Уушгинд авчилз үүсэх

2. Уушгины эд хатуурах

3. Чээжний гялтан хөндийд хий, шингэн хуралдах

4. Гялтан хальс зузаарах

5. Төвөнхийн нарийсал

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

123. ХДД-ын өвчнүүдэд аль нь орохгүй вэ?

A. Брутоны өвчин

B. Торолж эсийн эдийн гэмтэл

C. Ig-аа алдах

D. Туяа эмчилгээ, цитостатик бэлдмэлээс болох эмчилгээний эсийн бүтэц эвдрэл

124. Сэрээ булчирхайн экстракт аль нь вэ

A. Тималин

B. Тимоген

C. Анаферон

D. Миелопид

125. Өсвөр үеийн ДТ-ны онцлогийг заа?

1. Сүрьеэгийн нянд мэдрэгжил ихэснэ

2. ДТ-нд гадаад хүчний нөлөө өснө

3. Бэлгийн дааврын ялгаралт идэвхжиж эсийн дархлаа дарангуйлагдана

4. Хэсэг газрын дархлаа сул

5. Аутоиммун (өөсөө дархлаа) өвчинд тэсвэртэй

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

126. Нярайн дархлаа тогтолцооны онцлогийг заа?

1. Грам (-), идээрлүүлэгч, нөхцөлт эмгэгтөрөгч нянд эсэргүүцэл сул
2. Халдвар түргэн түгэх, үжих хандлага өндөр
3. Эсийн АТ – ээр хамгаалагдаагүй вирүсийн халдварт өндөр өртөмтгий
4. IgG сайн нийлэгжүүлдэг
5. Халдварын эсрэг хоёрдогч дархлаа хариултаар хариулна

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

127. Аль нь хүүхдийн ДТ- ны физиологийн сулралын үе биш вэ?

1. Нярай үе

2. 4 -6 сар

3. 2 нас

4. 3 нас

5. 4-6 нас

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

128. Хоёрдогч дархлаа дутал (ХДД)-ын үндсэн шалтгаан юу вэ?

1. Халдвар

2. Бөөрний архаг дутал (БАД)

3. Мэс засал мэдээгүйжүүлэлт

4. Глюкокортикоид, цитостатик эмүүд

5. Зүрхний төрөлхийн хавсарсан гажиг

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

129. 4 -6 сартай хүүхдийн ДТ – ны онцлогийг заа?

1. Эхээс авсан идэвхгүй дархлаа суларна

2. Дархлаа урвалын супрессор чиглэл хэвээр

3. RS, иж томуу, аденовирүст маш өртөмтгий

4. Хэсэг газрын дархлаа сул

5. Олонх АГ-нд анхдагч дархлаа хариулт давамгайлах тул дархлаа дурсамж үүсэхгүй

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

130. Анхдагч дархлаа дутал (АДД)-ын эмгэгээс аль нь хамгийн элбэг вэ?

(Н.П.Шабаловын бичсэнээр)

1. Брутоны өвчин
 2. Хавсармал ДД
 3. Залгиур эсийн согог
 4. IgA-гийн сонгомол дутал
 5. Хавсаргын согог
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

131. Эх-ихэс-ургаас ялгардаг дархлаа дарангуйлагч хүчин зүйлийг заа?

1. Трофобластын дарангуйлагч хүчин
 2. $\alpha 1$ -фетопротейн
 3. Хорионы гонадотропин
 4. Прогестрон,
 5. ПГЕ-ийн нийлэгжил ихсэх
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

132. Жинхэнэ ББЭЭ-ийн эмчилгээнд хамгийн үр дүнтэй эмийн бэлдмэлийг нэрлэнэ үү

- A. Depot Provera
B. Decapeptyl-Depot
C. Гонадотропин-рилизинг дааврын суперантогонист
D. Андрокур
E. Бусерелин (Suprefact)

133. Диабетийн эмнэлзүйн шинжүүд илрэхээс өмнө дараах шинжилгээнээс алийг нь хийх нь хамгийн зөв бэ?

- A. Глюкозжсон гемоглобин
B. Өлөн үед сахарыг тодорхойлох
C. Глюкоз тэсвэрлэх чадвар тодорхойлох сорил
D. Шээсээр ялгарах сахарыг хэмжих
E. Генетикийн шинжилгээ хийх

134. Монгол улсад 2012 оноос нярайн тандалт шинжилгээгээр дараах эмгэгүүдийг илрүүлдэг

1. Вируст гепатит
 2. Аденогениталь хамшинж
 3. Глюкоз -6- фосфатдегидрогеназын дутагдал
 4. Төрөлхийн анхдагч гипотиреоз
 5. Фенилкетонури
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

135. Хуурамч ББЭЭ нь гетеросексуаль хэлбэртэй үед:

1. Жинхэнэ ББЭЭ үед илрэх бүх шинжүүд ижил илэрнэ
2. Хөвгүүдэд хөх ургах ба төмсөг шодой нь томроогүй байна
3. Хөвгүүдэд төмсөг, охидод өндгөвч томорно
4. Охидод хэлүү томрох, эрэгтэй хэлбэрээр үсжилт бий болно
5. Охидод хөх ургах шинж умай, өндгөвч томрохгүйгээр илэрнэ

А. Бүх хариулт зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

136. Бэлгийн бойжилт эртсэх эмгэгт (ББЭЭ) тохирохыг зөв сонгоно уу

1. Охидод 7 нас, хөвгүүдэд 8 наснаас өмнө бэлгийн бойжилтын шинжүүд илрэхийг ББЭЭ гэнэ.
2. Жинхэнэ ба хуурамч ББЭЭ гэж ангилна
3. Бэлгийн хоёрдогч шинжүүд хүйстэйгээ тохирч байвал изо, эсрэг хүйсээ дагавал гетеросексуаль гэнэ
4. Жинхэнэ ББЭЭ нь гонадолиберин, гонадотропины ялгаралт ихэссэнээр бэлгийн даавруудын ялгаралтыг ихэсгэнэ
5. Ховор тохиолдолд шалтгаан тодорхойгүй (идиопатик) ББЭЭ тохиолдоно

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

137. Нойр булчирхайд хамааралтай тодорхойлолтод тохирохыг зөв сонгоно уу

1. Нойр булчирхайн эсгэгүүд хоол боловсруулалтанд оролцох
2. Дотоод шүүрлийн эдүүд дааврууд ялгаруулах
3. Дотоод шүүрлийн эдүүд лангергансийн арлын эсүүдээс тогтоно
4. Лангергансын арал 80-200 эстэй
5. “а”, “b” ба “d” эсүүд нь хоорондоо олон шинжээр ялгаатай

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

138. 1-р хэлбэрийн диабетийн онцлог хүүхдэд:

1. Хурц эхэлж хурдан даамжрах
2. Бага насанд гол төлөв оврогоор эхлэх
3. Хожуу үеийн хүндрэлд өртөх эрсдэл их
4. Бие бялдрын хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх
5. Ээнэгшилд орохдоо амархан

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

139. Хоёр хавтаст хавхлагын дутмагшлын үед рентген зурагт дараах шинжүүдээс аль нь илрэхгүй вэ?

- A. Зүрхний зүүн тосгуур томрох
- B. Зүүн ховдол томрох
- C. Зүрхний бэлхүүс тэгшрэх
- D. Зүрхний бэлхүүс тодрох
- E. Зүрх-цээжний индекс ихсэх

140. Зүрхний төрөлхийн гажгийг эмгэг жам, эмнэлзүйгээр нь хэдэн үе шат болгодог вэ?

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 5
- E. 2

141. Аль нь хүүхдэд хамгийн элбэг тохиолддог вэ?

- A. Параксизмийн тахикарди
- B. Экстрасистол
- C. АВ бүтэн хориг
- D. Синусын брадикарди
- E. Амьсгалын гаралтай зүрхний хэм алдагдал

142. Бага насны хүүхдэд тохиолдох зүрхний булчингийн үрэвсэл голчлон ямар шалтгаантай байх вэ?

- A. Харшил
- B. Нян
- C. Холбогч эдийн түгээмэл үрэвсэл
- D. Хордлого
- E. Вирус

143. Фаллогийн дөрвөлд аль нь орохгүй вэ?

- A. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой
- B. Баруун ховдлын хана зузаарах
- C. Уушгины артерийн нарийсалт
- D. Аорт баруун тийш хэлтийх
- E. Аортын нарийсалт

144. Хүүхдийн зүрхний төрөлхийн гажгийн шалтгаанд аль нь орохгүй вэ?

- A. Жирэмсний эхний 3 сард хүнд хордлоготой байх
- B. Хорт зуршил
- C. Жирэмсний сүүлийн 3 сард хүнд хордлоготой байх
- D. Ионжуулах цацраг
- E. Удамшил

145. Хэрэхийн шалтгаантай олдмол гажгаас хамгийн элбэг тохиолдохыг нь сонго.

- A. Гурван хавтаст хавхлагын дутмагшил
- B. Хоёр хавтаст хавхлагын нүхний нарийсал

- C. Гол судасны хавхлагын дутмагшил
- D. Хоёр хавтаст хавхлагын дутмагшил
- E. Гол судасны хавхлагын нүхний нарийсал

146. Цусны эргэлтийн алдагдлын I үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?

- A. Хүүхэд хөхөө амарч хөхнө
- B. Хавагнана
- C. Тайван үед зүрх дэлсэж, амьсгаадна
- D. Ачааллын үед амьсгаадна
- E. Элэг томорно

147. Хэрэхээр ямар насны хүүхэд ихэвчлэн өвчлөх вэ?

- A. 4-6 нас
- B. 2-3 нас
- C. 7-15 нас
- D. Хөхүүл
- E. 15 аас дээш

148. Хоёр хавтаст хавхлагын дутмагшлын үед шуугиан дараах цэгт сонсогдоно.

- A. II цэгт
- B. Зүрхний оройд
- C. IV цэгт
- D. V цэгт
- E. III цэгт

149. Артерийн битүүрээгүй цоргын үед сонсогдох онцлог шуугиан

- A. Сулралын богино шуугиан
- B. Машины шуугиан
- C. Трехем-Стиллийн шуугиан
- D. Систолын шуугиан
- E. . Диастолын шуугиан

150. Төрөлхийн гажгуудын дотроос хамгийн элбэг тохиолддог нь аль нь вэ?

- A. Тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой
- B. Артерийн битүүрээгүй цорго
- C. Фаллогийн өвчин
- D. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой
- E. Нэгдсэн ховдол тосгуур

151. Миокардитын оношлогооны I шатны өндөр оноот шинж аль нь вэ?

- A. Зүрхний дутагдалтай байх
- B. I авиа бүдгэрэх
- C. Төвөргөөнт хэм
- D. ЭКГ-д зүрхний булчин томорсон
- E. АВ хориг

152. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн үед илрэхгүй шинжүүд

- A. Систолын даралт ихэснэ
- B. Амьсгаадах
- C. Диастолын даралт хэвийн байна
- D. Нойтон хэржигнүүр сонсогдоно
- E. Амьсгалын замын цочмог өвчнөөр байнга өвдөх

153. Аортын нарийслын үед эгзэгтэй байдал хэдийд үүсэх вэ?

- A. Судасны голч 0.5 см-ээс бага, хүүхэд 6 сар хүрээгүй үед
- B. Судасны голч 0.5 см-с бага, хүүхэд 6 сараас дээш настай үед
- C. Судасны голч 0.5 см-с их, хүүхэд 6 сар хүрээгүй үед
- D. Нарийсалт бага үед
- E. Ахлах насны хүүхдэд

154. Хоёр хавтаст хавхлагын дутагдлын үед шуугиан аль цэгт сонсогдох вэ?

- A. V
- B. II
- C. III
- D. I
- E. IV

155. Зүрхний дутагдлын эмгэг жамд орохгүйг заа.

- A. Агшилтын эзлэхүүн багасах
- B. Хүчилтөрөгчгүйдэл
- C. Зүрхний булчинд К-ийн хуваарилалт алдагдах
- D. Венийн даралт ихсэх
- E. Минутын эзлэхүүн ихсэх

156. ЮРА өвчний рентген шинж

- A. Булчин хатангирших
- B. Үений хөшөнги
- C. Үе орчим яс сийрэгжсэн
- D. Үений завсар холдох
- E. Үе үрэвссэн

157. Хэрэх өвчний үед ямар хавхлага илүүтэй гэмтэх вэ?

- A. Гол судасны хавхлага
- B. Гурван хавтаст хавхлага
- C. Уушгины артерийн хавхлага
- D. Аль аль нь
- E. Хоёр хавтаст хавхлага

158. Цочмог явцтай анхдагч хэрэхийн үед зүрх гэмтэх нь хэр элбэг тохиолдох вэ?

- A. 60-55%
- B. 10-15%
- C. 80-85%
- D. 40-45%
- E. 20-25%

159. Анхдагч хэрэхийн үе дэх үений үрэвсэл ямар онцлогтой вэ?

- 1. Дунд ба том үе гэмтэнэ
- 2. Үеэр хэсч өвдөнө
- 3. Эмчилгээний дүнд түргэн засарна
- 4. Өглөөд хөшүүн байна
- 5. Эмчилгээний үр дүн тааруу
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

160. Баруун ховдлын цочмог дутагдлын үед ямар шинж илрэх вэ?

1. Агшилтын даралт ихсэх
2. Элэг томорч эмзэглэлтэй болох
3. Хөөсөрхөг ягаан цэртэй ханиах
4. Хэвлийд шингэн хуралдах
5. Уушгинд нойтон хэржигнүүр ихсэх

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

161. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн үед эмнэлзүйн ямар шинж илрэх вэ?

1. Уйлах үед хөхрөх
2. Зүрхний хил хязгаар зүүн тийш томрох
3. Өвчүүний зүүн талд 3, 4-р хавирганы завсарт агшилтын тод шуугиан сонсогдох
4. Өсөлт хоцрох
5. Өвчүү зүрхний орчим овойх

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

162. Зүрхний гликозидын үйлчилгээ ямар эмнэлзүйн шинжээр илрэх вэ?

1. Зүрхний цохилт цөөрөх
2. Элэгний хэмжээ багасах
3. Шээсний гарц нэмэгдэх
4. Халуун буурах
5. Артерийн даралт буурах

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

163. Анхдагч хэрэхийн үед зүрх гэмтсэнийг илтгэх шинжүүд юу вэ?

1. Зүрхний оройд сулралын шуугиан сонсогдох
2. Зүрхний хил хязгаар томрох
3. Хавагнах
4. Зүрхний авиа бүдгэрэх
5. Уушгины артери дээр II авиа өргөлттэй болох

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

164. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн үед цус хөдлөлзүйн ямар өөрчлөлт гарах вэ?

1. Баруун ховдлоос зүүн тийш цус хаяна
2. Зүүн ховдлоос баруун тийш цус хаяна
3. Бага эргэлтэнд цус хомсдоно
4. Бага эргэлт цусаар баяжна
5. Их эргэлт цусаар баяжна

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

165. Анхдагч хэрэхийн оношилгооны их шалгуурт ордог шинжүүдийг сонгоно уу?

1. Зүрхний гэмтэл
2. Цагираг улайлт
3. Үений гэмтэл
4. Хамраас цус гарах
5. Хэвлийгээр өвдөх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

166. Дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь анхдагч хэрэхийн оношлогооны туслах шалгуурт орох вэ?

1. Цагаан эс олшрох
2. УЭТХ хурдсах
3. С-идэвхт уураг ихсэх
4. АСЛО ихсэх
5. Сиалийн хүчил ихсэх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

167. Фаллогийн бүрдэлд ямар гажууд багтах вэ?

1. Гол судасны баруун байрлал
2. Баруун ховдлын зузаарал
3. Тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой
4. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой
5. Уушгины артерийн нарийсал

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

168. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн үед цус хөдлөлзүйн ямар өөрчлөлт гарах вэ?

1. Баруун ховдлоос зүүн тийш цус хаяна

2. Зүүн ховдлоос баруун тийш цус хаяна

3. Бага эргэлтэнд цус хомсдоно

4. Бага эргэлт цусаар баяжна

5. Их эргэлт цусаар баяжна

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

169. Дараах гажгуудаас бага эргэлтэнд баяжилттай цайвар гажгийг сонгоно уу?

1. Гол судасны нарийсал

2. Артерийн битүүрээгүй цорго

3. Фаллогийн дөрвөл

4. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой

5. Уушгины артерийн нарийсал

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

170. Анхдагч хэрэхийн оношлогооны бага шалгуурт орохгүй шинжүүдийг сонгоно уу?

1. Халуурах

2. Арьсан доорх зангилаа

3. Үеэр өвдөх

4. Мэдрэлийн тогтолцооны өөрчлөлт

5. Ядрах

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

171. Зүрхний дутагдлын үед зүрхний булчингийн агшилт суларснаас биеэр цус эргэх үйл ажиллагаа хямарна.

A. Зөв, Зөв, Буруу

B. Буруу, Буруу, Буруу

C. Буруу, Зөв, Буруу

D. Зөв, Зөв, Зөв

E. Зөв, Буруу, Буруу

172. 46. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойн төгсгөлийн шатанд бага эргэлтийн даралт эрс ихсэх учраас цус юүлэлтийн чиглэл өөрчлөгдөн хөхрөлт илэрнэ.

- A. Зөв, Зөв, Буруу
- B. Зөв, Буруу, Буруу
- C. Буруу, Зөв, Буруу
- D. Буруу, Буруу, Буруу
- E. Зөв, Зөв, Зөв

173. Томуугийн вирус нь кардиомиоцит эсийг шууд гэмтээх учраас зүрхний булчинг үрэвсүүлнэ.

- A. Буруу, Зөв, Буруу
- B. Зөв, Буруу, Буруу
- C. Зөв, Зөв, Зөв
- D. Буруу, Буруу, Буруу
- E. Зөв, Зөв, Буруу

174. Гликогеноз өвчний хэвшинжүүдийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг зөв сонгоно уу: А. Гиркегийн өвчин В. Помпегийн өвчин С. Горийн өвчин 1. Булчингийн сулрал, зүрх томрох, зүрхний дамжуулах чанар алдагдах шинжүүд илрэх ч харьцангуй хөнгөн явцтай 2. Элэг аарцаг хүртэл томрох, өсөлт удаашрах, хүүхэлдэйн царай, хоолны дуршил ихсэх, бөөлжих, булчин сулрах 3. Булчингийн хүчдэл сулрах, амьсгаадах, хөхрөх, зүрх томрох

- A. A1, B2, C3
- B. C1, B2, A3
- C. A2, B3, C1
- D. A1, B3, C2
- E. A3, B1, C2

175. Чихний цочмог үрэвсэлтэй хүүхдийн чихний өвдөлтийг намдаахаар өрхийн эмч юу зөвлөх вэ?

- A. Тарвагны тос халаагаад чихэнд дусаах.
- B. Чихний ард новокаинтэй блокад хийх
- C. Анальгин, димедролтой тарих.
- D. Парацетамолыг 6 цагаар өвдөлт намдтал уулгах.
- E. Чихэнд фурациллинтэй спирт дусаах

176. Нүдний халдварыг тетрациклины тосоор эмчлэхдээ хоёр нүдийг хэдэн удаа цэвэрлэх ёстой вэ?

- A. 3 удаа
- B. 5 удаа
- C. 4 удаа
- D. 1 удаа
- E. 2 удаа

177. Чихний цочмог халдвартай хүүхдийн чихний өвдөлтийг намдаахаар бага эмч юу зөвлөх вэ?

- A. Парацетамолыг 6 цагаар өвдөлт намдтал уулгах.
- B. Тарвагны тос халаагаад чихэнд дусаах
- C. Анальгин, димедролтой тарих.
- D. Чихэнд фурациллинтэй спирт дусаах

Е. Чихний ард новокаинтэй блокад хийх

178. Шуугиант амьсгал хяхтнаа амьсгалаас юугаар ялгаатай вэ?

А. Амьсгал авахад хожигноо сонсогдоно

В. Амьсгал гаргахад шуугиантай, зовиуртай

С. Амьсгал авахад шуугиантай, зовиуртай

Д. Амьсгал авах, гаргах нь шуугиантай, зовиуртай

Е. Уушги чагнахад гуурсан хоолойн амьсгал сонсогдоно

179. Хүүхэд хэдэн наснаас инээмсэглэж сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг вэ?

А. 2.5 сар

В. 1.5 сар

С. 1 сар

Д. 4 сар

Е. 3 сар

180. Ханиад шуухинаатай хүүхдэд шингэнийг яаж хэрэглэх вэ?

А. Шингэн өгөх шаардлагагүй

В. Бөөлжиж байгаа үед шингэн өгөхгүй

С. Эрүүл үеийхтэй ижил хэмжээний шингэн өгнө

Д. Эрүүл үеийхээс илүү шингэн өгнө

Е. Шингэн уух дуршлаас хамаарна

181. Таталдамхай өвчний далд хэлбэрийн шинжүүдийг хэрхэн шалгаж, илрүүлдгийг зөв сонгоно уу: А. Хвостекийн шинж В. Труссогийн шинж С. Эрбагийн шинж 1. Бугалганы дотор талын ховил дахь мэдрэл судасны багцыг оноон чанга дарах, ороож боох зэрэгт тэр гарын сарвуу эх баригчийн гар шиг хумиж татах 2. 5mA-аас бага хүч бүхий цахилгаан гүйдлээр цочрооход булчингийн агчилт, таталт үүсэх 3. Хацрын хонхорт, нүүрний мэдрэлийн салааллыг оноон хурууны үзүүрээр чангахан дарахад нүүрний тэр талын булчингууд агчиж татах

А. C1, B2, A3

В. A1, B3, C2

С. A2, B3, C1

Д. A1, B2, C3

Е. A3, B1, C2

182. 2 сартайгийнхаа вакцины дараа 3 хоногийн дотор татсан хүүхдэд 3 сартайд нь ямар вакцин хийж болох вэ?

А. УГУ 2

В. БЦЖ 1.

С. Саа 3

Д. УГУ 1

Е. Тавт-2

183. 4 настай хүүхэд суулгасан зовиуртай боловч орчиндоо идэвхитэй, цангаагүй, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хурдан арилж байв. Хүүхдийг үнэлж зохих зөвлөгөөг өг.

А. Хүүхэд шингэн алдаагүй тул урьдчилан сэргийлэх зорилгоор суулгалт бүрийн дараа 100-200 мл шингэн уулга.

В. Хүүхэд шингэн алдаж байгаа тул 75 мл/кг жинд тооцоолон 4 цагийн турш ШСДУ уулгана.

C. Хүүхэд шингэн их алдсан тул эмгэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
D. Хүүхэд шингэн алдаж болзошгүй тул 4 цагт 1200-2200 мл ШСД-ыг аягаар бага багаар өг.

E. Хүүхэд шингэн алдаж байгаа тул 75 мл/кг жинд тооцоолон 4 цагийн турш

184. Чихний цочмог халдвартай хүүхдийг 5 хоноод давтан үзэхэд өвдөлт нь ихэссэн, хүүхэд өндөр халуурсан байвал ямар арга хэмжээ авах вэ?

A. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм өгөөд 2 хоноод давтан үзнэ.

B. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм, парацетамол өгөөд, чихийг чихээсээр хуурайшуулахыг зааж өгөөд 2 хоноод давтан үзнэ.

C. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эм дээр парацетамолыг нэмж өгнө

D. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлж эмчилнэ.

185. Амьсгалын зам хаанаас үүсдэг вэ?

A. Эндодерм

B. Мезодерм

C. Эндодерм

D. Урд гэдэс

E. Зууван эс

186. 3 настай, 12 кг жинтэй хүүхэд 2 хоног суулгасан. Үзлэгээр тайван биш, цочромтгой, арьсны хуниас удаан арилна, шингэн ховдоглон ууна. Хүүхдийг үнэлж ямар арга хэмжээ авах вэ?

A. Хүнд шингэн алдсан гэж үзээд хураагуур судсанд эхний 1 цагт 30 мл/кг, дараагийн 5 цагт 70 мл/кг жинд тооцоолон Рингер лактатын уусмал юүл.

B. Хүүхэд шингэн их алдсан тул эмгэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ

C. Шингэн алдсан гэж үзээд 4 цагийн дотор 960-1600 мл ШСД бага багаар уулга.

D. Шингэн алдсан гэж үнэлээд 400-600 мл ШСД халбагаар уулга.

187. Гаррисоны ховилын шинж гэж юу вэ?

A. Хавирга зөөлөрснөөс цээж өрц бэхлэгдсэн хэсгээрээ дотогш татагдах

B. Үе мөч хавдаж, улайн халуу оргих

C. Гавлын хавтгай ясны төвд яс төст эд ургах

D. Үе мөчинд контрактур, анкилоз үүсэх

E. Хавирганы ясан ба мөгөөрсөн хэсгийн зааг дээр яс төст эд ургах

188. Тархины хуурай бодисын хэдэн хувийг липид эзэлдэг вэ?

A. 0.3

B. 0.6

C. 0.5

D. 0.4

E. 0.7

189. Ямар тохиолдолд хүнд ужиг суулгалт гэж ангилах вэ?

A. Суулгалт 14 хоног ба түүнээс дээш үргэлжилсэн

B. Суулгалт 14 хоног ба түүнээс дээш үргэлжилсэн бөгөөд баас цустай гарах.

C. Суулгалт 20 хоногоос дээш үргэлжилсэн.

D. Суулгалт 14 буюу түүнээс дээш хоног үргэлжилсэн ба шингэн алдалтын шинжтэй.

190. Чихнээс булаг гарч буй хүүхдийн чихийг чихээсээр хэрхэн цэвэрлэх вэ?

A. Өглөө чихээс хийж орхиод орой чихээсийг шинээр солино

B. Чихээсийг хоногт 2 удаа хийх ба нийт 5 хоног чихээсээр эмчилнэ

С. Чихийг чихээсээр 3 хоног эмчилнэ.

D. Чихийг хуурайштал чихээсээр цэвэрлэнэ, хоногт 3-аас доошгүй удаа чихийг хуурайштал чихээсээр цэвэрлэнэ.

Е. Гидрокортизоны тостой чихээс хийгээд 3 хоног орхино.

191. Хүүхдийн сүүн шүд хэдэн сараас цухуйж эхэлдэг вэ?

A. 6

B. 2

C. 8

D. 4

E. 7

192. 3 настай шингэн алдалтгүй суулгалттай хүүхдэд суулгалт бүрийн дараа ямар хэмжээний шингэн уулгах вэ?

A. 300-400 мл

B. 500-600 мл

C. 100-200 мл

D. 700-800 мл

E. 50-100 мл

193. Таталдамхай өвчний анхдагч урьдчилан сэргийлэлтийг зөв сонгоно уу:

A. Таталт тавиулах бэлдмэл хэрэглэх

B. Кальцийн бэлдмэл өгөх

C. Сийвэнгийн кальцийг тогтмол хянах

D. Рахитаас сэргийлэх

E. Витамин А уулгах

194. Амны аль нэг буланд хуруугаа хүргэхэд тэр тал уруу толгойгоо эргүүлж, амаа ангайлган хэлээ булталзуулна

A. Хайх рефлекс

B. Галантын рефлекс

C. Хөхөх рефлекс

D. Уруул цорвойх рефлекс

E. Бауэрийн рефлекс

195. 4 настай хүүхэд ханиалгасан ба түүний амьсгал 1 минутанд 42 байна.

Өөр эмгэг шинжгүй. Та яаж ангилах вэ ?

A. Уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчин

B. Уушгины хатгалгаа.

C. Уушигны хатгалгаагүй ханиад шуухнаа.

D. Томуу

E. Маш хүнд өвчин.

196. Хэрэв хүүхэд нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхантай бол давтан үзлэгт хэд хоногийн дараа эргэж ир гэж эхэд зөвлөх вэ?

A. 30 хоног

B. 7 хоног

C. 5 хоног

D. 2 хоног

E. 14 хоног

197. Улаан бурхны түгээмэл тууралттай хүүхдийн амны шархлааг генцианвиолетээр өдөрт хэдэн удаа эмчлэх ёстой вэ?

- A. 2 удаа
- B. 1 удаа
- C. 3 удаа
- D. 5 удаа
- E. 4 удаа

198. Тураалтай, цус багадалттай, хооллолтын бэрхшээлтэй гэж ангилагдсан 8 сартай хүүхдийг эмч үзэж зөвлөгөө өгөөд, хамгийн ойрын давтан үзлэгийг хэзээ товлонх вэ?

- A. 14 хоноод
- B. 30 хоноод
- C. 10 хоноод
- D. 2 хоноод
- E. 5 хоноод

199. Эбштейны өвчний зүрхний цахилгаан бичлэгт илрэхгүй шинжийг зөв сонгоно уу:

- A. Гисийн баруун багцын хориг
- B. Баруун тосгуурын томрол
- C. Цахилгаан тэнхлэг баруун тийш хазайх
- D. Цахилгаан тэнхлэг зүүн тийш хазайх
- E. АВ дамжуулалт уртсах

200. Хялгасан хорхойн халдвар тараагч нь:

- A. Нохой
- B. Амьтны гаралтай хүнс
- C. Хүн
- D. Бохирлогдсон хөрс
- E. Муур

201. Хөврлийн хөгжлийн хэд дэх 7 хоногт амьсгалын зам үүсдэг вэ?

- A. 3-4 долоо хоног
- B. 5-6 долоо хоног
- C. 2-3 долоо хоног
- D. 4-5 долоо хоног
- E. 1-2 долоо хоног

202. Хүүхэд 4 сартай, хүнд тураалтай гэж ангилагдсан. Өрхийн эмчид улаан, хөх, цагаан А аминдэм байна. Өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

- A. Хөх А аминдэмээс (100000 нэгж) нэг капсулыг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ
- B. Цагаан А аминдэмээс (50000 нэгж) нэг капсулыг өгөөд, цусны сахар багасахаас сэргийлээд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
- C. Цагаан А аминдэмээс нэг капсулыг өгөөд, хооллох талаар эхэд зөвлөгөө өгөөд 30 хоноод давтан үзнэ
- D. Цагаан А аминдэмээс нэг капсулыг өгөөд, хооллох талаар эхэд зөвлөгөө өгөөд 5 хоноод давтан үзнэ.
- E. Улаан А аминдэмээс (200000 нэгж) нэг капсулыг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ

203. Амьсгал дутлын зэргээс хамаарч илрэх эмнэлзүйн гол шинжүүд нь: А. Амьсгал дутлын 1-р зэрэг В. Амьсгал дутлын 2-р зэрэг С. Амьсгал дутлын 3-

р зэрэг 1. Цусны рН 7.2 –оос бага, үл зохицох хүчилшилтэй 2. Судасны лугшилт, амьсгалын тооны харьцаа нэг минутанд 3.5:1, цусны хүчилтөрөгчийн хангамж 85 мм.муб хүртэл буурсан 3. 3.Тайван үед амьсгаадна, цусны хүчилтөрөгчийн хангамж 70- 85 мм.муб

A. A1, B3, C2

B. A1, B2, C3

C. A2, B3, C1

D. C1, B2, A3

E. A3, B1, C2

204. Улаанбурханы вакцины 1-2-р тунг хэдэн сарын зайтай хийх ёстой вэ?

A. 1 сарын зайтай

B. 6 сарын зайтай

C. Жилийн зайтай

D. 3 сарын зайтай

E. 8 жилийн зайтай

205. Сампингийн эрхийн шинжийг хаана тэмтэрч үзэх вэ?

A. Суганы дунд шугамаар

B. Өвчүүний эрмэгээр.

C. Суганы урд шугамаар

D. Суганы арын шугамаар

E. Хавирганы ясан эд мөгөөрсөн эдэд шилжих хэсэгт.

206. 8 сартай хүүхэд халуурсан, татсан зовиуртай үзүүлэхэд хүүхдийн халуун 39 хэм, таталт намдсан боловч маш их шаналгаатай, чихнээс булаг гойжоод сар болж байгаа зовиуртай, үзлэгээр чихний ард хүндүүр хавагнасан улайлт байв. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ?

A. Маш хүнд халууралт өвчин. Хөхлөг ургацын үрэвсэл

B. Аюултай ерөнхий шинжтэй. Чихний цочмог халдвар

C. Маш хүнд халууралт өвчин. Чихний цочмог халдвар.

D. Маш хүнд халууралт өвчин. Чихний архаг халдвар

E. Аюултай ерөнхий шинжтэй. Чихний архаг халдвар

207. 4 хүртлэх сартай хүүхдийг зөвхөн хөхөөр хооллох ёстой боловч хэрэв сүү, сүү орлуулагч хэрэглэх зайлшгүй шаардлагтай бол 3 хүртлэх сартай хүүхдэд малын сүүг яаж бэлтгэж өгөх нь зөв бэ?

A. үнээний сүүг цагаан будааны шүүсээр шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 50 мл цагаан будааны шүүс хийж, 2 цайны халбага сахар нэмнэ).

B. үнээний сүүг буцалсан усаар шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 100 мл буцалсан ус хийнэ).

C. үнээний сүүг шингэлэх шаардлаггүй (120-130 мл өгнө).

D. үнээний сүүг буцалсан усаар шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 50 мл буцалсан ус хийж, 2 цайны халбага сахар нэмнэ).

E. үнээний сүүг буцалсан усаар шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 100 мл буцалсан ус хийж, 2 цайны халбага сахар нэмнэ).

208. 38,5 хэмээс дээш хэлуурч буй 4 настай хүүхдэд парацетамолын 500 мг-ын шахмалаас яаж өгөх вэ?

A. 1.5

B. 2 бүтнээр

C. 1\2

D. 1\4

E. . 1 бүтнээр

209. Гэрээр эмчлэгдэж буй уушгины хатгалгаатай хүүхдийн давтан үзлэгийг хэзээ хийх вэ?

A. 7 хоноод

B. 14 хоноод

C. 5 хоноод

D. . 2 хоноод

210. Д аминдэмийн урьдчилан сэргийлэлтийг хүүхдэд хэдийнээс хийх вэ?

A. 14 хоногтойгоос

B. 1 сартайгаас

C. 2 сартайгаас

D. 4 сартайгаас

E. 3 сартайгаас

211. 3 настай цусан суулгалттай хүүхдэд цифрофлоксацин 250 мг шахмалаас яаж уулгах вэ?

A. 1/2 ширхэгээр өдөрт 2 удаа 3 хоног өгнө.

B. 2 ширхэгээр 12 цагаар 5 хоног уулгана.

C. Тал шахмалаар суулгалт намдтал уулга.

D. Дөрөвний нэгээр хоногт 3 удаа 5 хоног уулгана.

E. 1 ш-ээр хоногт 2 удаа 3 хоногийн турш уулга

212. 2 настай ханиадтай хүүхдэд цээж хонхолзох шинж илэрч байв. Түүнд өөр зовиур, эмгэг шинж илрээгүй. Эмч хэрхэн ангилах вэ?

A. Уушгины хатгалгаа

B. Ларингит

C. Багтраа

D. Ханиад шуухнаа

E. Уушгины хүнд хатгалгаа

213. Хүний оюуны чадавхийн 50% нь хэдэн насанд илэрдэг вэ?

A. 6 нас

B. 5 нас

C. 4 нас

D. 3 нас

E. 2 нас

214. 6-12 сартай хөхөө хөхдөг хүүхдэд нэмэгдэл хоолнуудад дасгасны дараа өдөрт хэдэн удаа нэмэлт хоол өгөх вэ?

A. 4 удаа

B. 5 удаа

C. 6 удаа

D. 3 удаа

E. 1-2 удаа

215. Төрөх өрөөний дулаан доод тал нь хэдэн хэм байх ёстой вэ?

A. 25

B. 22

C. 24

D. 21

E. 23

216. Хүүхдийн хэдэн насанд хэл ярианы хөгжилд нь илүү анхаарах шаардлагатай вэ?

A. 3-7 нас

B. 2-3 нас

C. 1-2 нас

D. 7-9 нас

E. 9-12 нас

217. Таталдамхай өвчний ил хэлбэрийн эмнэлзүйн шинжүүдийг зөв тодорхойлно уу: А. Дууны хөвч агчилт В. Ул сарвууны таталт С. Эклампси 1. Сарвуу “эх баригч”, тавхай “адууны туурай”-ны шинж бүхий таталт өгөх 2. Амьсгал тасалдаж, царай цонхийж хөхрөх, татах, хоолой сөөнгөтөх 3. Ухаан алдах, амнаас хөөс сахрах, таталт нүүрний булчингаас эхлэн бүх биеийг хамрах, мэдээгүй бие засах

A. A2, B1, C3

B. A2, B3, C1

C. A1, B3, C2

D. C1, B2, A3

E. A3, B1, C2

218. 38,5 хэмээс дээш хэлуурч буй 4 настай хүүхдэд парацетамолын 500 мг-ын шахмалаас яаж өгөх вэ?

A. 1\2 шахмал

B. 1,5 шахмал

C. 1 бүтнээр

D. 1\4 шахмал

E. 2 бүтнээр

219. Суулгалттай А төлөвлөгөөгөөр эмчлэгдэж буй 5 сартай хүүхдэд 20 мг-тай цайрын бэлдмэлээс ямар тунгаар өгөх вэ?

A. j шахмалаар өдөрт 1 удаа 14 хоног

B. S шахмалаар өдөрт 1 удаа 14 хоног

C. 1/4 шахмалаар өдөрт 1 удаа 5 хоног

D. S шахмалаар өдөрт 1 удаа 5 хоног

E. 1 шахмалаар өдөрт 1 удаа 14 хоног

220. Гуурсан хоолойн багтрааны багтраат байдлын үе шат, эмнэлзүйн шинжүүдийг уялдуулан сонгоно уу: А. Харьцангуй ээнэгшлийн В. Багтраат байдлын С. Бүтэлтийн 1. Цонхийх, хөхрөх, судасны лугшилт олшрох, элэг томрох, хавагнах, дүлий уушгины шинж 2. Арьс цонхийх, захын хөхрөлт, амьсгал гаргалт саадтай, уушги тэлсэн, хүчтэй ханиалга, амьсгал сулрах, нойтон хэржигнүүр 3. Өнгөц амьсгал, ам ангалзаж хүйтэн хөлс гарах, нэлэнхүй хөхрөлт, зүрхний авиа бүдгэрэх, даралт буурах, айсан байдал илрэх

A. A3, B1, C2

B. A2, B1, C3

C. C1, B2, A3

D. A2, B3, C1

Е. А1, В2,С3

221. Нярайн тархины бор, цагаан бодисын зааг ямар байдаг вэ?

- А. Жигд бус
- В. Бүдэг
- С. Тод
- Д. Зааг арилсан байна
- Е. Зарим хэсгээр тод

222. Шуугиантай амьсгалтай уушгины хатгалгаатай 10 сартай хүүхдэд сальбутамолыг яаж өгөх вэ?

- А. 4 мг шахмалаас 1/4 шахмалаар өдөрт 3 удаа, 5 хоног
- В. 4 мг шахмалаас 1/2 шахмалаар өдөрт 3 удаа 5 хоног
- С. 2 мг шахмалаас 1+1/2 шахмалаар өдөрт 2 удаа 5 хоног
- Д. 2 мг шахмалаас 1 шахмалаар өдөрт 2 удаа 5 хоног
- Е. 2 мг шахмалаас 1/2 шахмалаар өдөрт 5 удаа 3 хоног

223. 6 сартай хүүхэд өчигдөрөөс халуурсан, тайван биш болсон зовиуртай үзүүлэхэд чихнээс булаг гарч байв. Эх нь хүүхдийн чихнээс урд өмнө булаг гарч байсныг анзаараагүй тул хэд хоног гарч байгааг мэдэхгүй. Өөр шинжүүд илрээгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ?

- А. Маш хүнд халууралт өвчин
- В. Чихний цочмог халдвар
- С. Халууралт Чихний архаг халдвар
- Д. Халууралт Чихний цочмог халдва
- Е. Халууралт

224. 38,5 хэмээс дээш хэлуурч буй 4 настай хүүхдэд парацетамолын 500 мг-ын шахмалаас яаж өгөх вэ?

- А. 1\2
- В. 1 бүтнээр
- С. 1\4
- Д. 2 бүтнээр
- Е. 1.5

225. 2 настай хүүхэд ханиалгасан ба түүний амьсгал 1 минутанд 39 байна. Та яаж ангилах вэ?

- А. Томуу
- В. Уушгины хүнд хатгаа
- С. Уушгины хатгалгаа.
- Д. Маш хүнд өвчин.
- Е. Ханиад шуухнаа.

226. 2 сартай хүүхдийн амьсгалыг тоолоход хэд байвал олширсонд тооцох вэ?

- А. 40
- В. 42
- С. 50
- Д. 48
- Е. 45

227. Сульдаатай хүүхдэд Д аминдэмийн 50000 нэгжийн капсулаас ямар тунгаар өгөх вэ?

- A. Сард нэг удаа нэг нас хүртэл өгнө.
- B. Даваа, Пүрэв гариг бүрт нэг удаа, нийт нэг сар өгнө.
- C. Даваа, Пүрэв гариг бүрт нэг удаа, нийт 7 удаа өгнө.
- D. Сард нэг удаа, 2 нас хүртэл.
- E. Даваа гариг бүрт 1 удаа 1 сар өгнө.

228. Тунгалаг эс хэдэн өдөр амьдардаг вэ?

- A. 25-50
- B. 42199
- C. 100-300
- D. 42291
- E. 50-100

229. 2 -12 сар хүртлэх хүүхдийн амьсгал олшрох босго хэд вэ?

- A. 1 минутанд 60 буюу түүнээс дээш.
- B. 1 минутанд 30 буюу түүнээс дээш
- C. 1 минутанд 40 буюу түүнээс дээш.
- D. 1 минутанд 50 буюу түүнээс дээш.

230. Улаанбурхантай 13 сартай хүүхдэд 50 000 МЕ-тэй А аминдэмийг хэдэн капсулаар өгөх ёстой вэ?

- A. 5 капсул
- B. 3 капсул
- C. 1 капсул
- D. 2 капсул
- E. 4 капсул

231. Хүйнээс нь идээ гарч байгаа, 1 өдөр халуурсан нярайд ямар ангиллаар, ямар тусламж үзүүлэх вэ?

- A. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилаад үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ хийгээд, 2 хоноод давтан үзнэ.
- B. Нянгийн хүнд халдвар буюу маш хүнд өвчин гэж ангилаад, антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
- C. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм уулгаад гэртээ хэрхэн асрах талаар эхэд зааж өгнө.
- D. Яаралтай эмнэлэгт хэвтүүлнэ.
- E. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын халдварыг генцианвиолетээр гэрт нь эмчлэнэ.

232. Цус багадалттай хүүхдийг өрхийн эмч хэд хоноод давтан үзэх вэ?

- A. 2 хоноод
- B. 30 хоноод
- C. 5 хоноод
- D. 14 хоноод
- E. 7 хоноод

233. 6 сартай 8 кг жинтэй хүүхэд 2 хоног суулгасан зовиуртай , үзлэгээр хүүхдийн нүд хонхойсон, ам нь их цангасан, ховдоглон ууж байв. Өөр шинж илрээгүй. Хүүхдийн биеийн байдлыг үнэлж ямар арга хэмжээ авах вэ?

- A. Шингэн алдсан гэж үзээд 800-1200 мл ШСД бага багааар уулга.
- B. Хүнд шингэн алдсан гэж үзээд хураагуур судсанд шингэн юүл.

С. Шингэн их алдсан гэж үнэлээд 100 мл/кг жинд тооцоолон Рингер лактат дуслаар хий.

Д. Шингэн алдалтгүй гэж үнэлээд А төлөвлөгөөний дагуу эмчил.

Е. Шингэн алдсан гэж үнэлээд 4 цагийн дотор 450-800 мл ШСД цайны халбагаар уулга.

234. Нярайн жингийн алдагдлыг хэдэн хувиас эхлэн дээш байвал эмгэг гэж үзэх вэ?

А. 0.06

В. 0.12

С. 0.1

Д. 0.15

Е. 0.08

235. 6 сартай уушгины хатгаатай хүүхдэд амоксациллин 250 мг шахмалыг яаж өгөх вэ?

А. 1\2 -талаар

В. 2 ширхэгээр

С. 11\2 бүтнээр

Д. 42008

236. Хөхлөг ургацын үрэвсэлтэй хүүхдэд эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

А. 2 антибиотик булчинд тариад, өвдөлт намдаах эм, тайвшруулах эм хэрэглээд 5 хоног гэрт нь эмчилнэ.

В. . Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног өгөөд, өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ

С. Үүсгэгчийн эсрэг эм, өвдөлт намдаах эмийн гараа тун өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

Д. Антибиотик булчинд тариад гэрт нь 5 хоног эмчилнэ.

237. Ой хүртэлх хүүхдийн хөдөлгөөн-сэтгэцийн хөгжлийг хэдэн шатад хуваадаг вэ?

А. 4

В. 7

С. 3

Д. 2

Е. 5

238. Халууралттай, өөр өвчний шинжгүй 1 настай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд халуун нь үргэлжилж, ханиалгаж, амьсгал нь минутанд 42 болсон байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ?

А. Уушгины хатгалгаа гэж ангилаад үүсгэгчийн эсрэг эм өгнө.

В. Ханиад шуухнаа гэж ангилаад ханиад намдаах эм бичиж өгнө.

С. Маш хүнд халууралт өвчин гэж ангилаад эмнэлэгт хэвтүүлнэ.

Д. Уушгины хатгалгаа. Халууралт. -гэж ангилаад үүсгэгчийн эсрэг эм, ханиад зөөлрүүлэх эм, халуун бууруулах эм өгнө.

Е. Уушгины хүнд хатгалгаа гэж ангилаад эмнэлэгт хэвтүүлнэ.

239. Ургийн хөгжлийн хэд дэх 7 хоногт мэдрэлийн тогтолцоо үүсч эхэлдэг вэ?

А. 3 дахь 7 хоногт

В. Эхний 7 хоногт

C. 2 дахь 7 хоногт

D. 5 дахь 7 хоногт

E. 4 дэх 7 хоногт

240. 3 настай хүүхдийн чихнээс булаг гараад сар болж байна. Чих өвдөж байна гэж хэлдэггүй, зовиур шаналгаа илэрдэггүй боловч ээж нь үзүүлэхээр авчирсан. Үзлэгээр хоёр чихнээс ногоон булаг гарч байв, өвдөлт ба хөхлөг ургацын үрэвслийн шинжгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ?

A. Чихний архаг халдвар

B. Шингэн хулхи

C. Чихний цочмог халдвар

D. Хөхлөг ургацын үрэвсэл

E. Хэсэг газрын халдвар

241. Гэрээр эмчлэгдэж буй уушгины хатгалгаатай хүүхдийн давтан үзлэгийг хэзээ хийх вэ?

A. 2 хоноод

B. 30 хоноод

C. 14 хоноод

D. 7 хоноод

E. 5 хоноод

242. Улаанбурхэнтай 11 сартай хүүхдэд А аминдэмийн 100000 нэгжтэй, хөх капсулыг яаж өгөх вэ?

A. 2 капсулыг яаралтай өг.

B. 1 капсулыг яаралтай өг, маргааш уулгах 1 капсулыг эхэд нь зааж өг.

C. 1/2 капсулыг яаралтай өг, маргааш уулгах 1/2 капсулыг эхэд нь өг.

D. 3 капсулыг яаралтай өг.

E. 1 капсулыг яаралтай өг.

243. 24 хоногтой нярайн арьсан дээр ганц нэг идээт цэврүү гарсан, өөр өвчний шинжгүй бол ямар арга хэмжээ авах вэ?

A. Антибиотик тариад гэрт нь эмчилнэ, 5 хоноод давтан үзнэ.

B. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм уулгаад эмнэлэгт хэвтүүлнэ

C. Яаралтай эмнэлэгт хэвтүүлнэ.

D. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилад үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ хийгээд, 2 хоноод давтан үзнэ.

E. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилаад, антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд, эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

244. Суулгаж байгаа хүүхдэд саагийн вакцин уулгах уу?

A. Уулгаад товлолын дагуу уусанд тооцно.

B. Дархлаа тогтохгүй учир уулгахгүй.

C. Уулгахгүй, учир нь дархлаад нөлөөлсөн эсэхийг мэдэх боломжгүй.

D. Уулгах боловч тунг хийсэнд тооцохгүй.

E. Уулгахгүй, учир нь суулгалтаар гарчихна.

245. Хооллолтын бэрхшээлтэй 4 сартай хүүхдийг өрхийн эмч хэд хоноод үзэх вэ?

A. 30 хоноод

B. 2 хоноод

- C. 7 хоноод
- D. 14 хоноод
- E. 5 хоноод

246. 1 нас 2 сартай Дулмаа хөдөөнөөс хот шилжиж ирсэн. Өрхийн эмчдээ өнөөдөр бүртгүүлж байгаа. Хөдөө сумын эмч нь 6 сартай байхад нь хөх А аминдэм өгсөн гэсэн, дахин А аминдэм аваагүй тул өрхийн эмч өнөөдөр яах вэ? Үзлэгээр хүүхэд тураалгүй, рахитгүй, цус багадалтгүй, ба бусад өвчний шинжгүй.

- A. . 6 сартайдаа А аминдэм аваад сүүлийн 6 сар А аминдэм уугаагүй байгаа тул А аминдэмийн улаан капсулаас нэг ширхэгийг өгнө.
- B. 6 сартайдаа А аминдэм аваад 8 сар өнгөрсөн байгаа тул А аминдэмийн хөх капсулаас нэг ширхэгийг өгнө.
- C. Эрүүл тул А аминдэм өгөхгүй
- D. 6 сартайдаа А аминдэм аваад 6 сар өнгөрсөн байгаа тул А аминдэмийн цагаан капсулаас нэг ширхэгийг өгнө.
- E. 6 сартайдаа А аминдэм авсан тул давтан өгөхгүй

247. 4 сартай хүнд тураалтай хүүхдэд ямар арга хэмжээ авах вэ?

- A. А аминдэм 200000 нэгжээр өгөөд, хооллох зөвлөгөө өгнө.
- B. А аминдэм 50000 нэгжээр өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
- C. Тэжээх зорилгоор инсулинтэй глюкоз дуслаар гэрээр хийнэ.
- D. Хооллолтын байдлыг үнэлэн хоолны зөвлөгөө өгнө.
- E. Фермент, аминдэм эмчилгээ хийж гэрт нь эмчилнэ.

248. Дөнгөж төрсөн нярайд тогтворжоогүй байдаг нь аль нь вэ?

- A. Сонсгол
- B. Бүгд
- C. Харц
- D. Тэнцвэр
- E. Дуу авиа ялгах чадваргүй

249. 38,5 хэмээс дээш халуурч буй 8 сартай хүүхдэд парацетамолын 100 мг-ын шахмалаас яаж өгөх вэ?

- A. 2 бүтнээр
- B. 1.5
- C. 1½
- D. 1¼
- E. 1 бүтнээр

250. 3 настай уушгины хатгаатай хүүхдэдамоксициллины 250 мг шахмалыг 1 удаад яаж өгөх вэ?

- A. 1 бүтнээр
- B. 42008
- C. 2 1½ ширхэгээр
- D. 1½ -талаар

251. 3 настай хүүхдийн чихнээс булаг гойжоод 7 хонож байгаа . Гэтэл өчигдрөөс эхлээд хүүхэд халуурч, чих өвдөж байна гэж уйлагнасан. Үзлэгээр чихнээс булаг гарч байсан, чихний ард хөндүүр хавдсан байв. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ?

- A. Хэсэг газрын халдвар

- В. Шингэн хулхи
- С. Чихний цочмог халдвар
- D. . Чихний архаг халдвар
- Е. Хөхлөг ургацын үрэвсэл

252. 8 сартай хүүхэд халуурсан, татсан зовиуртай үзүүлэхэд хүүхдийн халуун 39 хэм, таталт намдсан боловч маш их шаналгаатай, чихнээс булаг гойжоод сар болж байгаа гэвч үзлэгээр чихний ард хөндүүр хавагнасан улайлт байв. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ?

- A. Маш хүнд халууралт өвчин. Чихний архаг халдвар
- В. Аюултай ерөнхий шинжтэй. Чихний архаг халдвар
- С. Маш хүнд халууралт өвчин. Хөхлөг ургацын үрэвсэл
- D. Маш хүнд халууралт өвчин. Чихний цочмог халдвар.
- Е. Хөхлөг ургацын үрэвсэл

253. Уушгины гялтангийн хуурай үрэвсэл нь байрлалаасаа шалтгаалан эмнэлзүйн өөр өөр шинжүүдээр илрэнэ. Үүнд: А. Өрцний байрлалтай гялтангийн үрэвсэл В. Дэлбэн завсрын гялтангийн үрэвсэл С. Уушгины орой гол хэсгийн гялтангийн үрэвсэл 1. Өвчүү хэвлийгээр өвдөх, юм залгих үед өвдөлт ихсэх 2. Хавирганы нумаар өвдөх, өрцний хөдөлгөөн багасах 3. Цээж, хавирга завсраар өвдөх, рентгенд туузан ба зууван сүүдэр үүсэх

- A. C1, B2, A3
- В. A1, B3, C2
- С. A3, B1, C2
- D. A1, B2, C3
- Е. A2, B3, C1

254. Улаанбурхантай 2 настай хүүхдэд А аминдэмийн 200 000 МЕ-тэй капсулыг яаж өгөх вэ?

- A. 2 капсулыг нэг дар уулгах
- В. 1½ капсулыг яаралтай өг, маргааш уулгах 1½ капсулыг эхэд нь өг.
- С. 1 капсулыг яаралтай өг, маргааш уулгах 1 капсулыг эхэд нь яаж уулгахыг заагаад өг.
- D. 3 дуслыг өнөөдөр өг.
- Е. 1 капсулыг нэг удаа өг.

255. 10-12 насны хүүхдийн ходоодны физиологийн багтаамж хэд байдаг вэ?

- A. 1700-2000мл
- В. 1300-1500мл
- С. 1500-1700мл
- D. 1000-1300мл
- Е. 2000-2300мл

256. Зөвхөн хөхөөр хооллож буй хүүхдэд зуны халуунд хөхүүлэхийн зэрэгцээ шингэн нэмж уулгах хэрэгтэй юү?

- A. Жимсний шүүсээр угжих хэрэгтэй
- В. Ус халбагдаж өгөх хэрэгтэй
- С. Хэрэгтэй
- D. Хэрэггүй
- Е. Байхуу цайгаар угжих хэрэгтэй

257. Улаан хоолойн орох хэсэг нярайд хаана байрладаг вэ?

- A. CII-CIII
- B. CVI-CVII
- C. CIV-CV
- D. CV-CVI
- E. CIII-CIV

258. Шүүдэст эмзэгшилтэй хүүхдийн цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд илрэх эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий өөрчлөлтийг зөв сонгоно уу.

- A. Нейтропени
- B. Лимфоцитоз
- C. СОЭ өндөрсөх
- D. Лейкоцитоз
- E. Эозинофили

259. Урат ихтэй шээж буй өөр онцын зовиургүй хүүхдэд өрхийн эмч ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

- 1. Шингэн сайн уух
- 2. Махан хоол өнжөөд нэг идэх
- 3. Пурин ихтэй хоол хүнс, дотор мах хэрэглэхгүй байх.
- 4. Аллопуринол өдөрт 3 удаа уух.
- 5. Шоколад идэхгүй байх

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

260. Залгиурын үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэнэ үү.

- 1. Хоолой аргаж хөндүүрлэх
- 2. Залгиурын арын хана сэрвэгнэх
- 3. Ханиалгах, хоолой засах
- 4. Дуу сөөнгөдүү болох
- 5. Толгой өвдөх, халуурах, уцаарлах

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

261. Ясжилт хэдэн шатаар явагддаг вэ?

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

262. Шингэн алдалтгүй суулгалттай хүүхдийг өрхийн эмч яаж эмчлэх вэ?

1. Хүүхдийг гэрт нь хооллон, А төлөвлөгөөний дагуу шингэн өгч эмчилнэ.
2. Хэзээ яаралтай үзүүлэхийг эхэд нь зөвлөнө
3. Сайжрахгүй бол 5 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.
4. В төлөвлөгөөний дагуу хооллож шингэн уулгана.
5. Б төлөвлөгөөний дагуу шингэн нөхнө.

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

263. Төрөх өрөөнд дараах багаж хэрэгсэл зайлшгүй байх шаардлагатай

1. Сэхээн амьдруулах ширээ
2. Хүүдий маск
3. Хүй таслах, хавчих хэрэгсэл
4. Салиа соруулагч
5. Халууны шил

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

264. Синусит буюу дайвар хөндийнүүдийн үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг зөв сонгоно уу?

1. Ухархай руу чилж, хатгуулж өвдөх
2. Үнэр муу мэдрэх
3. Тонгойход нүүр чинэрч өвдөх
4. Хамар битүүрч, нусгайрах, хамраас эвгүй үнэр үнэртэх
5. Толгой дух магнай хэсгээр давамгай өвдөх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

265. “Хүнд хүндрэл бүхий улаанбурханыг” ямар шинжүүдээр ангилах вэ?

1. Халуурах
2. Нүдний эвэрлэг бүдгэрэх.
3. . Амны гүнзгий өргөн шархлаа.
4. Аюултай ерөнхий шинжээс аль нэг
5. Одоо эсвэл сүүлийн 3 сарын дотор улаанбурханаар өвчилсөн түүхтэй.

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

266. 2 сараас 5 хүртлэх насны хүүхдэд ямар аюултай ерөнхий шинжийг эмч үзлэгийн явцад шалгах ёстой вэ?

1. Хүүхэд уух буюу хөхөх чадвартай эсэх
2. Хүүхэд уусан бүхнээ бөөлжиж байгаа эсэх
3. Хүүхэд татсан . Хүүхэд унтаарсан буюу ухаангүй эсэх.
4. Хүүхэд өндөр халуурах.
5. . Хүүхэд ханиах үедээ бөөлжих.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

267. Хүүхдийн төв мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг хамшинжүүдийг нэрлэнэ үү?

1. Татах
2. Мэнэн төст
3. Толгой томрох
4. Хэт хөөрлийн
5. Шөрмөсний рефлекс ихсэх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

268. Шүүдэст эмзэгшилтэй хүүхэд дараах онцлогтой

1. Ус давсны солилцоо тогтворгүй
2. Биемахбод ус натрийг барих хандлагатай
3. Хүүхэд хөөнгө, жин ихтэй
4. Шингэн алдах нь хялбар
5. Амархан турах

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

269. Гуурсан хоолойн багтрааны үед даавар эмчилгээг дараах байдлаар хэрэглэнэ:

1. Бусад эмчилгээ олигтой үйлчлэхгүй үед
2. Багтраат байдлын үед 1-2 мг/кг тооцож өгөх
3. 0.5-1.0 мг/кг тооцож 3 хувааж өгөх
4. Бөглөршин бүтэх үед өгөх
5. 10-15-21 хоног хэрэглэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

270. Төмөр дутлын цус багадалтын үеийн хучуур эдийн хамшид дараах илрэнэ

1. Арьс салст цайх
2. Арьс хуурайшиж гуужимтгай болох
3. Хумсны толио хотойх
4. Үс унамхай, хугарамтгай
5. Хэлний хөхлөг арилж, гөлийх

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

271. Өрхийн эмч зүрхний гажигтай хүүхдийн зүрхний бүтцийн шуугианыг зүрхний үйл ажиллагааны шуугианаас яаж ялгах вэ?

1. Бүтцийн шуугиан нь тод, ширүүн, удаан сосогдоно.
2. Зүрхний хил хязгаараас гадуур дамжиж сонсогдож болно.
3. Биеийн ачааллын дараа шуугиан ихэсдэг.
4. Биеийн ачааллын дараа шуугиан сулардаг эсвэл арилдаг.
5. Шуугиан зөөлөн, богино сонсогдоно.

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

272. Халууралт гэж ангилагдсан, өөр зовиур, эмгэг шинжгүй 5 хүртлэх насны хүүхдэд эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. 38,5 хэмээс дээш халуунтай бол парацетамол өгнө.
2. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөнө.
3. Халууралт намжихгүй бол 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.
4. Хэрэв 5-аас олон хоног халуурсан бол онош тодруулахаар эмнэлэг явуулна.
5. Хөхөө ойр ойрхон хөхүүлэх ба шингэн сайн уулгахыг зөвлөнө.

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

273. Боталловын цорго онгорхой байхын ач холбогдол?

1. Цусны их эргэлтэнд даралт огцом өсөхөөс сэргийлнэ
2. Уушгиар цусыг дахин өнгөрүүлж түүний хүчилтөрөгчийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ
3. Уушгины эмгэгийн үед цусны эргэлтийн хямралыг зохицуулна
4. Цусны бага эргэлтэнд даралт огцом өсөхөөс сэргийлнэ
5. Бүгд зөв

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

274. Уушгины цочмог үрэвслийн үед хүүхдэд илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно:

1. 38 хэмээс дээш халуурах

2. Өндөр халууралт 3 өдрөөс дээш хугацаагаар үргэлжлэх

3. Хөхрөлт

4. Шаналгаатай, өвдөлттэй амьсгалах

5. Бөглөршлийн хамшинжгүй амьсгаадах

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

275. Шенлейн-Генохын өвчний хэвлийн хамшинжийн үед дараах шинжүүд илрэнэ

1. Хэвлий орчмоор /хүйсний эргэн тойронд/ хүчтэй базалж өвдөх

2. Үргэлжлэх хугацаа хэдэн хоногоос долоо хоног, сар байж болно

3. Хэвлийн өвдөлтөөс айж шаналсан царай, байж ядсан байдал бий болох

4. Бөөлжис хүрэх, бөөлжих, бөөлжис цустай болох

5. Баасанд үл ажиглагдах цус Грегерсений урвалаар илрэх

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

276. 8 сартай Бурмаа хөхөө хөхөхдөө бага зэрэг хөлөрдөг, гавлын яс зөөлрөөгүй, булчин чанга, сарпингийн эрхийн шинжгүй. Өөр өвчний шинжгүй. Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д аминдэм байхгүй байна. Өрхийн эмч хэрхэн ангилж ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Рахиттай гэж ангилна.

2. Рахитгүй гэж ангилна.

3. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө.

4. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 2 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө.

5. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг жил уулгахыг зөвлөнө.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

277. Мэдрэл үений эмзэгшилтэй хүүхдийн эмнэлзүй лабораторийн шинжүүдээс дурьдана уу.

1. Мэдрэлийн хөөрөл ихтэй, сониуч

2. Хоолонд дургүй
3. Шээсний хүчил ихсэх
4. Үе үе ацетоноор бөөлжиж, ацетоноор шээх
5. Хэвлий хүчтэй базалж өвдөх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

278. Хүүхдийн хөдөлгөөн-сэтгэц хөгжлийн IV шатанд дараах үйлдлүүдээс хийж чадахгүйг нь сонгоно уу?

1. Юм түшиж өвдөг дээрээ өндийнө
2. Бусдын үйлдлийг дуурайна
3. Тоглоомоор зөв тоглож сурна
4. 10-15 үгийн баялагтай болж богино өгүүлбэрээр ярина
5. Хуруугаараа жижиг зүйлийг барина

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

279. 6сартай Энхээ хөхөө хөхдөө хөлөрдөг,сампингийн эрхний шинжтэй,булчин сул,гавлын яс зөөлөрсөн байна.Өөр өвчний шинжгүй.Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Рахиттай гэж ангилна.
2. Рахитгүй гэж ангилна.
3. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө.
4. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 2 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө.
5. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг жил уулгахыг зөвлөнө.

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

280. 6 сартай, 8 кг жинтэй охин 38,5 хэм халуунтай. 2 хоног ханиалгасан, халуурсан, амьсгал минутанд 44. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил.

1. Уушгины хатгалгаа. -гэж ангилна.
2. Ханиад шуухнаа. Халууралт. –гэж ангилна.
3. Котримоксазол талаар хоногт 2 удаа 5 хоног уулгана.
4. Ханиад зөөлрүүлэх хоргүй зөөлөн эм хэрэглэнэ. Өндөр халуурвал парацетамолын 0,5 шахмалаас дөрөвний нэгээр уулгана. 2 хоноод давтан үзнэ.

5. 5 хоноод давтан үзнэ.

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

281. Ховдол хоорондын таславчийн булчинлаг хэсгийн цоорхойтой үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэнэ үү.

1. Өвчүүний зүүн 4,5-р хавирганы завсарт агшилтын хүчтэй шуугиан сонсогдоно.

2. Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хэвийн байна.

3. Рентген ба зүрхний цахилгаан бичлэгт өөрчлөлтгүй.

4. 5-р хавирганы завсарт агшилтын шуугиан сонсогдож, аюулхай лугшина.

5. Цус эргэлтэнд их хэмжээний өөрчлөлт үүснэ.

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

282. А- аминдэмд цочмог хэлбэрээр хордсон үед илэрч болох эмнэлзүйн шинжүүдээс нэрлэнэ үү:

1. Бөөлжиж, суулгах

2. Зулай овойх

3. Тайван биш

4. Халуурах

5. Нойргүйтэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

283. Поллинозтой өвчтөн дараах зүйлст анхаарах ёстой

1. Өвчний ид үед шинж тэмдгийн эмчилгээ

2. Ургамал цэцэглэхээс өмнө эмгэгжамын эмчилгээ

3. Зөгийн бал хориглох

4. Ургамлын гаралтай эм болгоомжтой хэрэглэх

5. Аквариумын загас тэжээхгүй байх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

284. 1нас 4сартай Очир унтаж байхдаа бага зэрэг хөлөрдөг, гавлын яс зөөлрөөгүй, булчин чанга, сарпингийн эрхийн шинжгүй. Өөр өвчний шинжгүй. Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д виминдэм байхгүй байна. Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Рахиттай гэж ангилна.

2. Рахитгүй гэж ангилна, нар агаарт гаргахыг зөвлөнө.
3. 50000 нэгжтэй Д аминдэм байхгүй тул зөвхөн нар агаарт гаргахыг зөвлөнө.
4. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 2 дуслаар хоногт 1 удаа зуны 6,7,8,9 сараас бусад саруудад уулгахыг зөвлөнө.
5. Спиртэн Д-ийн уусмалаас (1 дусалдаа 40000 нэгжтэй) хоногт 2 дуслаар нэг жил уулгахыг зөвлөнө.

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

285. Ходоодны цочмог үрэвслийн эмнэлзүйн энгийн хэлбэрийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжид дараах орно:

1. Гэдсээр өвдөх
 2. Бөөлжих
 3. Хоолой залгиур гашуу оргих
 4. Аюулхайд эмзэглэх
 5. Бөөлжилийн дараа тайвшрах
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 - B. Бүх хариулт зөв бол
 - C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 - D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 - E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

286. Нярай хүүхэд гүйлсэн булчирхайн үрэвслээр бараг өвддөггүй шалтгаан юу вэ?

1. Тулгавчийн хооронд үл харагдам байрладаг
 2. Гүйлсэн булчирхайн хонхорууд нь бүдэг
 3. Цусны судас бага
 4. Гүйлсэн булчирхай үүсээгүй байдаг учраас
 5. Биетэйгээ харьцуулхад том учраас
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 - B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 - C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
 - D. Бүх хариулт зөв бол
 - E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

287. ХӨЦМ-ийн дагуу “Ханиад шуухнаа” гэдэг ангилалтай хүүхдэд эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ?

1. Халуун сүү, аарц уулгахыг зөвлөнө
 2. Чигатусин, читамон зэрэг хоргүй эмээр ханиадыг гэрээр эмчлэнэ
 3. 30-аас олон хоног ханиалгасан бол онош тодруулахаар эмнэлэг явуулна.
 4. Ямар шинж илэрвал яаралтай ирж үзүүлэхийг эхэд нь хэлнэ.
 5. Хэрэв сайжрахгүй бол 5 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 - B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 - C. Бүх хариулт зөв бол
 - D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

288. Верльгофын өвчний шалтгааныг точно уу.

1. Амьсгалын замын цочмог халдвар
2. Сэргийлэх тарилга
3. Бие сэтгэцийн хэт ачаалал
4. Эмийн бодис
5. Хэт даарч, халууцах

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

289. Цээж хонхолзох гэж ямар шинжийг хэлэх вэ?

1. Амьсгал авах үед
2. Чээжний хэнхэрцгийн доод хэсэг дотогш татагдах
3. Чээжний хэнхэрцгийн дээд хэсэг гадагш тэлэх
4. Хэвлий гадагш тэлэх
5. Амьсгал гаргах үед

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

290. Хөөмийн гүйлсэн булчирхайн цочмог үрэвсэлийн эмнэлзүйн шинжүүдээс нэрлэнэ үү.

1. Гүйлсэн булчирхайн салст улайж, үрэвсэх
2. Хонхруудад идээрхэг өнгөр тогтох
3. Өндөр халуурах
4. Шүлс залгих, хоол унд идэж, уухад их өвдөх
5. Зарим үед үе мөчөөр өвдөх

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

291. 4-с доош насны хүүхдийн нүүр, хамрын ясны онцлог юу вэ?

1. Хамрын яс жижиг
2. Хамрын яс богино
3. Хамрын хөндий нарийхан
4. Доод жим бараг байхгүй
5. Дээд жим бараг байхгүй

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

292. Штернбергийн бүсийг хаана тодорхойлох вэ?

1. Хэвлийн зүүн дээд
2. Хэвлийн баруун доод
3. Чацархайн тунгалгийн булчирхай
4. Хэвлийн зүүн доод
5. Хэвлийн баруун дээд

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

293. Верльгофын өвчний үед даавар эмчилгээ хийх заалт:

1. Салстад цус харвалттай түгээмэл тууралт
2. Нойтон хэлбэр
3. Цус алдалтын цус багадалтаар хүндрэх
4. Нүдэнд цус харвах
5. Дотор эрхтэний цус алдалт

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

294. Ходоодны үрэвсэл үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг дурдана уу?

1. Хоолны хэмжээ их
2. Хоолны чанар муу
3. Хоолны дэглэм
4. Хоолны хордлого
5. Гэдэсний халдвар

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

295. Шээсээр кальци их гарч буй хүүхдэд дараах хүнсний бүтээгдхүүнийг хэрэглэхийг зөвлөнө:

1. Мах махан бүтээгдхүүн
2. Яншуй, шош
3. Алим, лийр
4. Сүү, цагаан идээ
5. Ногоон сонгино

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

296. Эрүүл атлаа гульгимтгаа нярайн эхэд өрхийн эмч юу зөвлөх вэ?

1. Хөхөө зөв үмхүүлэх
 2. Хүүхдээ зөв тэврэх
 3. Хөхүүлэхийн өмнө хүүхдийг түрүүлгээ харуулж хэвтүүлээд унгуулах ба хэхрүүлэх
 4. Хамрыг хөхүүлэхийг өмнө цэвэрлэж байх
 5. Хүүхдийг хөхүүлсний дараа босоогоор нь тэвэрч хэхэрсний дараа хэвтүүлэх
- A. Бүх хариулт зөв бол
 B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

297. Гаждал цохиулалтын хэт цочмог хэлбэрийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг зөв сонгоно уу:

1. Бие халуунаар төөнөж, арьс улайх
 2. толгой лугших, айдас хөдлөх
 3. царай цонхийж цайх
 4. судасны лугшилт олшрох, даралт унах
 5. ухаан алдах
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
 C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 D. Бүх хариулт зөв бол
 E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

298. Шүүдэст эмзэгшлийн эмчилгээнд дараах эмийн бэлдмэлүүдийг зөвлөнө:

1. Төрөл бүрийн витамин
 2. Лакто ба бифидум бактери
 3. Гистамины эсрэг бэлдмэл
 4. Антибиотик
 5. Төмрийн бэлдмэл
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 B. Бүх хариулт зөв бол
 C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
 E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

299. Бат, 2 настай, 12 кг жинтэй, суулгаад 2 хонож байна. Тайван бус цочромтгой, шингэн ховдоглон ууна, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хэвийн арилна. Өнөөдөр баас цустай болсон. Өөр өвчний шинжгүй. Алга ягаан. Ангил. Эмчил

1. Шингэн алдалттай. Цусан суулгалт.-гэж ангилна.
 2. Б төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтыг эмчилнэ. Ципрофлоксациныг 15 мг/кг жинд нь тооцон өдөрт 2удаа 3хоног уулгана.
 3. 2 хоноод давтан үзнэ.
 4. Шингэн алдалтгүй цусан суулгалт.-гэж анилна.
 5. 5 хоноод давтан үзнэ.
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

300. Архаг тонзиллитыг эрт илрүүлж төгс эмчлээгүйгээс ямар өвчнүүд үүсэж болох вэ?

1. Ревмокардит, ревматоидны полиартрит

2. Гломерулонефрит, тиреоидит

3. Анеми, васкулит, тромбоцитопенийн пурпур

4. Системны өвчнүүд

5. Хорея буюу мэдэрлийн ревматизм

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

301. Хордлогын оврогын үед илрэх шинжүүдийг дурьд:

1. Хүүхэн хараа нарийсаж, гэрлийн урвалд жигд байх

2. Хүүхдийг цочроож, өвтгөхөд хариу урвал жигд боловч сул эсвэл огт хариу урвал илрэхгүй

3. Булчин сулрах.

4. Рефлексүүд сулрах.

5. Мэдэрлийн тархмал эмгэг шинжүүд: татах.

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

302. Нярайн арьс улбар ягаан харагддаг шалтгаан аль нь вэ?

1. Меланоцитын меланин үүсэх үйл дутмаг

2. Үрлэг давхаргын кератогиалин бага

3. Эвэрлэг давхарга нимгэн

4. Үрлэг давхаргын кератогиалин их

5. Аль нь ч биш

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

303. Хүүхэд ядрахгүй сэрүүн байж чадах нас, цаг нь аль вэ?

1. 1.5 настайд 3.5- 4 цаг

2. 2 настайд 4.5-5 цаг

3. 3 настайд 6-6.5 цаг

4. 4 настайд 10- 12 цаг

5. 5 настайд 12-14 цаг

А. Бүх хариулт зөв бол

- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

304. Шүүдэст эмзэгшилтэй хүүхдийн ямар дотор эрхтэн тогтолцоо хамгийн түрүүнд эмгэг өөрчлөлтөд өртөх вэ?

- 1. Амьсгал
- 2. Хоол боловсруулах
- 3. Шээс ялгаруулах
- 4. Зүрх судас
- 5. Нөхөн үржихүйн
- А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- В. Бүх хариулт зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

305. Төмөр дутлын цус багадалтын үеийн мэдрэл сульдлын хамшид дараах илрэнэ

- 1. Ядрамтгай
- 2. Тайван бус цочромтгой
- 3. Хөдөлгөөний идэвхи сул
- 4. Хоолонд дургүй
- 5. Толгой өвдөх, эргэх
- А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. Бүх хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

306. Менингококцемийг өрхийн эмч ямар өвчнүүдтэй ялган оношлох ёстой вэ?

- 1. Менингизмын шинжтэй томуу
- 2. Бусад шалтгаант менингит
- 3. Цусархаг тууралт гардаг цусны өвчнүүд
- 4. Тууралттай явагддаг бусад халдварт өвчнүүд
- 5. Цусархаг хам шинжтэй бусад халдварт, хордлогот өвчнүүд
- А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- С. Бүх хариулт зөв бол
- Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

307. Гуурсан хоолойн багтраа өвчин үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс дараах орно

- 1. Удамшил
- 2. Нас
- 3. Хүйс
- 4. Төрөх үеийн жин

5. Эхийн нас

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

308. Арьсан доорх өөхлөгийг үнэлэхдээ биеийн аль хэсэгт үздэг вэ?

1. Хүйсний 2 талд

2. Өвчүүний хажууд далны доор

3. Бугалга

4. Гуяны дотор тал

5. Хацар

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

309. Тосгуур хоорондын таславчийн хоёрдогч цоорхойтой үед дараах эмнэлзүй илрэнэ.

1. Хүүхэд ханиад хатгалгаагаар өвчлөмтгий

2. Хүүхэд ядрамхай, ачаалал ихсэхэд амьсгаадах

3. Зүрхний хил хөндлөн, баруун тийш томрох

4. Өвчүүний зүүн 2,3-р хавирганы завсар агшилтын шуугиан

5. Уушгины артерит 2-р авиа өргөгдөж салаалах

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

310. Хүүхдийн төвөнхийн онцлог юу вэ?

1. Юүлүүр хэлбэртэй

2. Нарийхан

3. Зөөлөн мөгөөрстэй

4. Цусны судсаар баялаг

5. Тунгалгийн булчирхайгаар баялаг

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

311. Ханиад шуухнаатай хүүхдийг хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг зөвлөх вэ?

1. Халуурах

2. Өвчин хүндрэх.

3. Амьсгал олшрох.

4. Амьсгал саадтай болох

5. Хөхөндөө буюу хоолондоо муудах

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

312. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан гэж ангилагдсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. А аминдэмийн 2 тунг өгнө

2. Тетрациклины тосоор нүдний халдварыг гэртээ хэрхэн эмчлэхийг зааж өгнө.

3. Амны шархлааг генцианвиолетээр гэртээ эмчлэхийг зааж өгнө.

4. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.

5. Хэзээ яаралтай эрж үзүүлэхийг зөвлөнө.

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

313. Ходоодны цочмог үрэвслээс сэргийлэхдээ:

1. Хоолны дэглэм баримтлах

2. Эрүүл ахуйн дэглэм

3. Боловсорч гүйцээгүй жимс идэхгүй байх

4. Хоносон хоол идэхгүй байх

5. Удсан хүнс идэхгүй байх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

314. Апгарын үнэлгээ хийхийн тулд дараах шинж тэмдгүүдийг ажигладаг

1. Зүрхний цохилт

2. Амьсгал

3. Булчингийн хүчдэл

4. Цочрох урвал

5. Арьсны өнгө

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

315. Шүүдэст эмзэгшлийн жинхэнэ удмын шалтгаантай дархлааны хэлбэр бүхий эмгэгжамд дараах байдал чухал үүрэгтэй:

1. JgE хэт үүсэх

2. Ходоод гэдэсний саатуулах үйл сул

3. Саатуулах эсрэг бие JgG хэт үүсэх

4. Хөөнгө эсээс гистамин ихээр ялгарах

5. Гистаминаза дутагдалтай

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

316. Хэрлэгийн үед даавар эмчилгээ хийж буй нөхцөлд дараахыг анхаарна

1. Калигаар баялаг/төмс, байцаа, жимс, ээдэм/ хоол өгөх

2. Калийн бэлдмэл нэмж өгөх

3. Ходоодны үрэвслээс байнга сэргийлэх

4. Цайрын бэлдмэл өгөх

5. Харшлын эм хавсран хэрэглэх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

317. Чихний цочмог халдвартай гэж ангилсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Үүсгэгчийн эсрэг эм өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

2. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног өгнө.

3. Чихэнд тарваганы тос дусаана.

4. Өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ. 5 хоноод давтан үзнэ.

5. 2 хоноод давтан үзнэ.

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

318. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурханыг ямар шинжүүдээр ангилах вэ?

1. Халуурах ба улаанбурханы түгээмэл тууралт гарах.

2. Нүднээс нуух гойжих.

3. Аманд ганц нэг өнгөц шархлаа бий болох.

4. Аманд өргөн, гүнзгий, олон шархлаанууд үүсэх

5. Нүдний эвэрлэг бүдгэрэх.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

319. Шуугиантай амьсгалтай уушгины хатгалгаатай 2 настай хүүгийн эмчилгээг тогтоо.

1. Тохирох антибиотیکیг 3-5 хоног өг

2. Гуурс тэлэгч эм өг

3. Хоргүй зөөлөн эмээр хоолойн өвдөлт, ханиалгыг эмчил

4. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлө

5. 2 хоноод давтан үзүүл

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

320. Эйзенменгерийн хамшинжийн үеийн зүрхний цахилгаан бичлэгийн өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү

1. Зүүн ховдлын томрол

2. Баруун ховдлын томрол

3. Тосгуур ховдлын эсвэл ховдлын доторх дамжуулалт удаашрах

4. Булчингийн нэвчмэл өөрчлөлт ажиглагдах

5. Зүрхний хэм алдагдал

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

321. Шенлейн-Генохын өвчний үед ямар эмийн эмчилгээ хийх вэ?

1. Халдвар харшлын эсрэг

2. Судасны нэвтрэмж багасгах

3. Даавар эмчилгээ

4. Гепарин

5. Цитостатик

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

322. Верльгофын өвчний талаарх тодорхойлолтыг зөв сонгоно уу

1. ялтсан эсийн тоо чанар өөрчлөгдсөнөөс үүсэх анхдагч цусархаг эмзэгшил

2. цусархаг тууралт арьс, салстад гарч, захын цусанд ялтсан эсийн тоо цөөрөх, чөмгөнд мегакариоцит хэвийн ба ихсэх эмгэг

3. изоиммун хэлбэр нь эх ургийн ялтсан эсийн үл тохирооноос үүснэ

4. трансиммун хэлбэр нь эхийн цуснаас урагт ялтсан эсийн эсрэг бие, мэдрэгжсэн фагоцит нэвтэрснээс ялтсан эс цөөрнө

5. сургуулийн насанд сургуулийн өмнөх наснаас өвчлөл 2 дахин илүү тохиолдоно

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

323. Байгалийн хамгаалах тогтолцоонд юу хамаарагдах вэ?

1. Арьс салст

2. Нейтрофил эс
 3. Сапрофит бичил биетнүүд
 4. Химийн шүүрэл
 5. Жинхэнэ устгагч эс
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

324. Фаллогийн бүрдэл бүхий нярайд илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно:

1. Амьсгаадаж, хөхрөх
 2. Өвчүүний зүүн 2,3-р хавирганы завсарт агшилтын хүчтэй шуугиан
 3. Өсөлт хоцрох
 4. Хөхөх, хөдлөх үед амьсгаадалт нэмэгдэх
 5. “бөмбөрийн дохиурын шинж” илрэх
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

325. Хүүхдийн тархины онцлог

1. Бор гадарга хөгжлөөр дутмаг
 2. Мэдрэлийн бор, цагаан бодис бүдэг зааглагдсан
 3. Мэдрэлийн ширхэг миелин бүрхүүлээр хучигдаагүй
 4. Цусан хангамж сайн
 5. Цус-тархины хориг нэвчимхий
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

326. Зүрхний төрөлхийн гажгийн шалтгаанд дараах хамаарна:

1. Ионжуулах цацраг
 2. Химийн хорт бодисууд
 3. Төрөл бүрийн эм
 4. Эцэг эхийн нас
 5. Жирэмсний эхний 3 сарын хүнд хордлого
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

327. Эрүүл хүүхдэд А аминдэмийн 200000 нэгжтэй улаан капсулыг хэрхэн уулгах вэ?

1. 6 сартай хүүхдэд 100000 нэгжээр уулгах тул хагас капсул буюу 3 дуслыг уулгана

2. 6 сартай хүүхдэд 50000 нэгжээр уулгах тул 1 дуслыг уулгана
3. Нэгээс 5 нас хүртэл 6 сар тутам 200000 нэгжээр буюу 1 ширхэг улаан капсул уулгана

4. А аминдэмийн улаан капсулыг зөвхөн нэг настай хүүхдэд уулгана
5. А аминдэмийн улаан капсулыг зөвхөн хоёр настай хүүхдэд уулгана

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

328. Шуугиантай амьсгалтай уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчний ангилалтай 4 сартай хүүд дараах шинжүүдийг үнэлсэн байдаг

1. Ямар нэг аюултай ерөнхий шинж

2. Цээж хонхолзох

3. Тайван үедээ хяхтнаж, шуугиантай амьсгалах

4. Амьсгал олшрох

5. Халуурах

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

329. Верльгофын өвчний дараах хяналт

1. Цочмог хэлбэрийг өвчилснөөс хойш 5 жил хянах

2. Эхний жил 3-6 сард 1 удаа үзэх

3. 2-3 дахь жилд 6 сард 1 удаа

4. 2-3 дахь жилээс жилд 1 удаа

5. 4 дэх жилээс 3 жилд 1 удаа

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

330. Нярайн тархины хатуу хальсны онцлог

1. Харьцангуй нимгэн

2. Гавлын суурь ястай наалдсан

3. Зөөлөн

4. Торлог хальс туйлын нимгэн

5. Хатуу

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

331. Гуурсан хоолойн багтрааны хөдлөл үеийн дохиоллын шатанд илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно

1. Гуурсан хоолойн багтрааны хөдлөл үеийн дохиоллын шатанд илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно
2. Цэргүй бөгшүүлж ханиалгах
3. Амьсгаадах
4. Бага багаар ойрхон шээх
5. Хүүхэд тавгүйтэх

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

332. Булган, 28 хоногтой, 3 кг жинтэй, суулгасан гэсэн зовиуртай. Хоногт 8 удаа хөхөө хөхдөг, өөр хоол буюу шингэн өгдөггүй. Суулгаад 15 хонож байгаа.Хүүхэд тайван бус цочромтгой, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас удаан арилна.Баасанд цусгүй. Өөр эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил.

1. Шингэн алдалттай суулгалт
2. Шингэн алдалттай ужиг суулгалт
3. Шингэн алдалтыг Б төлөвлөгөөний дагуу эмчил
4. Эмнэлэгт хэвтүүлэхийн өмнө шингэн алдалтыг эмчил, эмнэлэгт хэвтүүл
5. Хөхний сүүг цагаан будааны шүүсээр орлуулан өг.

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

333. Халууралт гэж ангилагдсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. 38,5 хэмээс дээш халуунтай бол парацетамол өгнө.
2. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөнө.
3. Халууралт намжихгүй бол 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.
4. Хэрэв 5-аас олон хоног халуурсан бол онош тодруулахаар явуулна.
5. Хөхөө ойр ойрхон хөхүүлэх ба шингэн сайн уулгахыг зөвлөнө.

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

334. Судасны ханын бат бөх чанарыг ямар аргаар үздэг вэ?

1. Кончаловскийн
2. Чимхэлтийн
3. Алхны
4. Чангалуурын
5. Арьсны зураглал

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

335. Аденоид булчирхайн цочмог үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн гол шинжүүдийг нэрлэнэ үү?

1. Хамар битүүрч, амаараа амьсгалах
2. Унтахдаа амаа ангайж, хурхирах
3. Нүүр хөөнгөтөн хацрын нугалаас арилах
4. Хоншоор урагш түрсэн байдалтай
5. Амьсгалын замын үрэвсэлт өвчинд өртөмхий

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

336. Залгиур эстэх урвалыг гүйцэтгэдэг эсийг хэрхэн ангилдаг вэ?

1. Ганц бөөмт
2. Олон бөөмт
3. Том залгиур
4. Жижиг залгиур
5. Том бөөмт

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

337. Хүүхдийн хөдөлгөөн-сэтгэц хөгжлийн III шатанд хүүхэд аль үйлдлүүдийг хийж чаддаг болох вэ?

1. Нэрээ мэддэг болно
2. Сэтгэл хөдлөл эерэг сөрөг байдлаар илэрхийлэх
3. Дэмжлэгтэйгээр сууж чадна
4. Дөрвөн хөллөж мөлхөнө
5. Алив, хаа байна гэдэг үгнүүдийг ойлгож эхэлнэ

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

338. Жирэмсэн үеийн дараах байдлууд нярайн бүтэлтийн шалтгаан болдог:

1. Эхийн зүрх судас, амьсгалын тогтолцооны хүнд эмгэгүүд
2. Хүнд хэлбэрийн цус багадалт
3. Илүү тээх
4. Эхэсийн үрэвсэл
5. Эхийн чихрийн шижин

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

339. Нярай хүүхдэд арьс шарлах ямар шалтгаанууд байдаг вэ?

1. Физиологийн шарлалт

2. Цус задарлын шарлалт

3. Элэгний шарлалт

4. Механик шарлалт

5. Халдварын гаралтай холимог (элэгний үрэвсэл, цус задрал) шарлалт

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

340. Дархлалын тогтолцоог хэрхэн ангилдаг вэ?

1. Байгалийн

2. Өвөрмөц бус

3. Өвөрмөц

4. Аль нь ч биш

5. Биологийн

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

341. Зүрхний булчингийн үрэвслийн үед судас түгээмэл гэмтсэн бол ямар шинжүүд илрэх вэ?

1. Арьсны өнгө эрээнтэх

2. Тууралт гарах

3. Үеэр өвдөх

4. Цустай шээх

5. Долгион хэлбэрийн явцтай байх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

342. Нярайн бөөрний түр зуурын дутагдал үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү?

1. Биед орох шингэний хэмжээ бага

2. Шүүрүүлэх чадвар дутмаг

3. Бөөрний хэмжээ том

4. Төрсний дараа бөөрний ачаалал ихэсдэг

5. Түүдгэнцрүүд шигүү байрладаг

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

343. Алс сувганцарт ямар бодис ялгардаг вэ?

1. Будагч бодис

2. Кали

3. Эмийн бодис

4. Ус

5. Фосфат

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

344. Ургийн хөгжлийн 3-5 сард ТМТ-ны үндсэн хэсгүүд тодорхойлогдсоноор доорхын аль тогтворжсон байдаг вэ?

1. Сэтгэл хөдлөл

2. Мэдрэхүй

3. Сэтгэл гутрал

4. Мэдрэмж

5. Рефлексүүд

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

345. Бага жинтэй нярайг дулаан байлгахын тулд ямар арга хэрэглэх вэ?

1. арьс арьсаар шүргэлцүүлэх

2. халуун ус дүүргэсэн гудас хэрэглэх

3. дулаан цацруулагч ашиглах

4. агаар халаагч инкубаторт хийх

5. малгай, хувцас өмсгөх

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

346. Суурь давхаргын эсүүд митозоор хуваагдан олширч ямар давхаргуудыг нөхөн сэргээж байдаг вэ?

1. Өргөст давхарга

2. Үрлэг давхарга

3. Тунгалаг ба эвэрлэг давхарга

4. Зөвхөн эвэрлэг ба өргөст давхарга

5. Зөвхөн үрлэг ба эвэрлэг давхарга

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

347. Хүүхдийн нарийн гэдэсний онцлог юу вэ?

1. Харьцангуй урт
2. Салст дотровч нимгэн
3. Цусны судсаар баялаг
4. Нас ахих тусам шимэгдүүлэх талбай ихэсдэг
5. Нарийн гэдэс харьцангуй богино

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

348. Шенлейн-Генохын өвчний үед гепариныг хэрхэн, яаж хэрэглэж болох вэ?

1. Хөнгөн үед 100-200 нэгж/кг/хоногт
2. Хүнд үед 300-400 нэгж/кг/хоногт
3. Хоногийн тунг 4 хувааж хийх
4. Хоногийн тунг 3 хувааж хийх
5. Хасахдаа богино хугацаанд хурдан хасах

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

349. Шуугиантай амьсгалтай уушгины хатгалгаагүй ханиад шуухинаатай үед тохирох эмчилгээг зөв тогтоо

1. Хоргүй зөөлөн эмээр хоолойн өвдөлт ханиалгыг эмчил
2. Гуурс тэлэгч эм өг
3. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлө
4. Цусны чихэр багасахаас сэргийлж эмчил
5. Сайжрахгүй бол 2 хоноод давтан үзүүл

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

350. Тунгалаг төлжил доройтлын эмгэгтэй хүүхдийн гадаад төрхөд илрэх шинжүүдийг нэрлэнэ үү.

1. Хөөнгө, цайвар арьстай
2. Өөхөн эд улцгар
3. Булчингийн хөгжил сул
4. Хөдөлгөөн болхи
5. Жингийн хэлбэл ихтэй

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

351. Шээсээр нь урат их гарч байгаа хүүхдэд дараах хүнсийг илүүтэй зөвлөнө:

1. Жимс

2. Хар чавга

3. Цөцгийн ба ургамлын тос

4. Гахайн мах

5. Тарган загас

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

352. Булган, 28 хоногтой, 3 кг жинтэй, суулгасан гэсэн зовиуртай. Хоногт 8 удаа хөхөө хөхдөг, өөр хоол буюу шингэн өгдөггүй. Суулгаад 15 хонож байгаа. Хүүхэд тайван, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хэвийн арилна. Баасанд цусгүй. Өөр эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил.

1. Шингэн алдалтгүй ужиг суулгалт. Хооллолтын бэрхшээлгүй. - гэж анилна.

2. Шингэн алдалтгүй суулгалт гэж ангилна.

3. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ.

4. А төлөвлөгөөний дагуу суулгалт бүрийн дараа 50- 100 мл шингэн уулгана.

5. 5 хоноод давтан үзнэ.

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

353. Наран, 6 сартай, 8 кг жинтэй, 38,5 хэм халуунтай. 2 хоног ханиалгасан, халуурсан, амьсгал минутанд 44. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил

1. Уушгины хатгалгаа. -гэж ангилна.

2. Ханиад шуухнаа. Халууралт. –гэж ангилна.

3. Котримоксазол талаар хоногт 2 удаа 5 хоног уулгана.

4. Ханиад зөөлрүүлэх хоргүй зөөлөн эм хэрэглэнэ. Өндөр халуурвал парацетамолын 0,5 шахмалаас дөрөвний нэгээр уулгана. 2 хоноод давтан үзнэ.

5. 5 хоноод давтан үзнэ.

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

354. Нярайн анхны идэвхитэй эргэлтээр өрхийн эмч юу зөвлөх ёстой вэ?

1. Нярай хүүхдийг хэрхэн асрах талаар зөвлөнө

2. Нярайг хөхөөр хооллох талаар зөвлөнө.

3. Нярайн зааг шинжүүдийг эхэд нь тайлбарлаж эхийг тайтгаруулна.

4. Нярайг чийрэгжүүлэх талаар эхэд зөвлөгөө өгнө.
5. Ямар шинж илэрвэл яаралтай эмчид хандах талаар хэлж өгнө.

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

355. Татсан хүүхэд болгоныг өрхийн эмч эмнэлэгт хэвтүүлэхийн өмнө ямар арга хэмжээ заавал авах ёстой вэ?

1. Таталтын үед үүсч буй гипокси, гипогликеми нь тархины эд эсийг ихээр гэмтээдэг ба буцалтгүй өөрчлөлт үүсгэх аюултайг эцэг эхэд ойлгуулах.
2. Таталтыг намдаасны дараа боломжтой бол Глюкозын 10%, 20%, 40%-ийн уусмалаас судсаар хийж өгнө.
3. Хэрэв тарих глюкозын ямар ч уусмал байхгүй бол уухаар чихэртэй ус, хөхний сүү, өөр сүү орлуулагч уулгах ёстой.
4. Левомецетин 30 мг/кг жинд тарих.
5. Преднизолоныг 2-4 мг/кг жинд судсаар хийнэ.

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

356. Ургийн хөгжлийн хэд дэх 7 хоногт тархины эс эрчимтэй хуваагдалд ордог вэ?

1. 4-6 долоо хоног
 2. 6-8 долоо хоног
 3. 8-10 долоо хоног
 4. 10-18 долоо хоног
 5. Бүгд зөв
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
 - B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 - C. Бүх хариулт зөв бол
 - D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 - E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

357. Шээсээр фосфат их гарч байгаа үед хүүхдэд дараах хүнсний бүтээгдхүүнийг зөвлөдөггүй:

1. Бяслаг, ээдэм
 2. Үхрийн элэг
 3. Загас тахианы мах
 4. Цагаан будаа
 5. Цөцгий, ургамлын тос
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
 - B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
 - C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
 - D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
 - E. Бүх хариулт зөв бол

358. Цус багадалтгүй, тураалгүй, рахитгүй 1,5 настай хүүхдэд тохирох зөвлөгөөг өг.

1. Хооллолтыг үнэлэн хоолны зөвлөгөө өг.
2. Д витаминьг урьдчилан сэргийлэх тунгаар өгнө.
3. Өнөөдөр А аминдэм нэг тунг өгнө.
4. Ямар нэг зөвлөгөө шаардлаггүй.
5. Төмрийн сироп 14 хоног уулгана.

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

359. Зүрхний дутагдлын 26 үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно

1. Цээжээ өндөрлөж хэвтэх
2. Уцаартай зовиурлангуй
3. Захын хөхрөлттэй
4. Зүрхний авиа бүдэг, хэм алдагдах
5. Хүчил суурийн тэнцвэр алдагдах

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

360. Вакцины гаж нөлөө болон хүндрэл ямар байдлаар илрэх вэ?

1. Хэсэг газрын урвал (улайх, хавдах, буглах)
2. Ерөнхий урвал (халуурах, хордлогын хам шинж)
3. Дотор эрхтэнд халдвар харшлын хүндэрлүүд (бөөрний, зүрхний булчингийн үрэвсэл) үүсэх
4. Архаг өвчин сэдрэх (багтраа, арьсны өвчнүүд, хэрх өвчин)
5. Мэдэрлийн тогтолцооны эмгэгээс татах.

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

361. 7 сартай чихний цочмог халдвартай хүүхэд хөхөө өдөрт 5-6 удаа хөхдөг ба 2 удаа шингэн каш халбагаар иддэг. Хүүхэд өвчилж эхэлснээсээ хойш каша идэх дургүй болохоор нь өгөхөө больсон.Одоо зөвхөн хөхөө хөхөж байгаа.Энэ хүүхдэд тохирох хооллолтын зөвлөгөө өг.

1. Хүссэн үед нь хөхүүлж бай
2. Каша өтгөн бэлтгэж өг (сүүгээр бэлтгэж, цөцгийн тос, шар тос, ургамлын тосны аль нэгийг , элсэн чихэр нэм)
3. Нэмэгдэл хоолны нэр төрлийг олшруул
4. Өвчтэй үед нь сайн хоолло
5. Хүүхдийн дуртай хоолыг нь сайн өгснөөр биеийн эсэргүйцэл сулрахгүй.

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

362. Нярай хүүхдийн хүй улайсан, идээтэй, тэр нь арьсруугаа тэлсэн бол ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилна.

2. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна

3. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 2 хоноод давтан үзнэ.

4. Антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ

5. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 5 хоноод давтан үзнэ.

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

363. Верльгофын өвчний үед дараах эрхтнээс ихэвчилэн цус гоожино

1. хамар

2. Буйл

3. Ходоод гэдэс

4. Бөөр

5. Умай

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

364. Дутуу нярайд гарах хүндрэлд дараах орно

1. Төрөх үеийн амьсгалын бэрхшээл

2. Хөрөх

3. Чихэр багадах

4. Хооллолтын бэрхшээл

5. Тархины ховдолд цус харвах

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

365. Сувд, 14 хоногтой, 3,6 кг жинтэй, арьсан дээр ганц нэг идээт цэврүү гарсан. Хоногт 6 удаа хөхөө хөхдөг ба 2 удаа угжаар Нан өгдөг.Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил

1. Хэсэг газрын нянгийн халдар. Хооллолтын бэрхшээлтэй гэж ангилна.

2. Амоксациллийн 8 цагаар уулгаад, хэсэг азрын халдварыг гэрээр эмчлэхийг зааж өгнө. Хоногт 8-аас цөөнгүй хөхүүлэхийг зөвлөнө. Өөр хоол угжаар өгөхгүй байх ба хөхөөр цатгаж чадна гэдэгт эхийг итгүүлнэ.

3. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. Ямар шинж илэрвэл яаралтай үзүүлэхийг эхэд хэлнэ.

4. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна.

5. Антибиотикийн эхний тунг тариад эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

366. Рахитын эхлэл үед биохимийн шинжилгээнд гарах өөрчлөлтүүдийг зөв нэрлэнэ үү.

1. Кальци хэвийн

2. Зарим үед кальци ялимгүй ихсэх

3. Фосфор багасах

4. Шүлтлэг фосфатаза ихсэх

5. Хүчилшил үүсэх

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

367. Стрептококкийн халдварын дараах бөөрний түүдгэнцрийн цочмог үрэвлийн эмнэлзүйн гол шинжүүдийг нэрлэнэ үү:

1. Шилжимтгий хаван

2. Өтгөн хар цай шиг өнгөтэй шээх

3. Артерийн даралт ихсэх

4. Шээсээр цагаан эс, нян гарах нь ихсэх

5. Бага насны хүүхдэд бижийн хамшинж элбэг

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

368. Шүүдэст эмзэгшилтэй хүүхдийн хоол эмчилгээнд дараах зөвлөгөөг өгдөг:

1. Хөхөөр хооллох

2. Амархан шингэдэг нүүрс ус хязгаарлах

3. Давс хязгаарлах

4. Хоолыг аминдэмжүүлэх

5. Ханаагүй тосны хүчлээр баялаг хоол хэрэглэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

369. Шенлейн-Генохын өвчний бөөрний хамшинжийн үед дараах шинжүүд илрэнэ

1. Нүүр зовхи, бүх биеэр хавагнах

2. Шээсний гарц багасах

3. Шээсэнд уураг гарах

4. Цустай шээх

5. Даралт ихсэх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

370. Эрүүл хүүхдийн зүрхний оройн түлхэлтийн талбай?

1. 3см²

2. 1 см²

3. 4 см²

4. 2 см²

5. 6 см²

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

371. Чихнээс булаг гарч буй 1 сартай нярайд ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилна

2. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна.

3. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 2 хоноод давтан үзнэ.

4. Антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ

5. Чихний архаг халдвар гэж ангилна.

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

372. 1 нас 3 сартай тураалтай хүүхэд, хөхөө хөхдөггүй ба өдөрт нэг удаа гурилтай шөлний гурил, шөлийг иддэг. Хүүхэд том хэрчсэн махыг идэхээс дургүйцдэг тул өгдөггүй. 1 удаа үнээний сүүгээр угждаг. Орой гэрийнхнийхээ хоолны шингэн шөлнөөс өгдөг. Хүүхдийг идэвхтэй хооллодоггүй. Энэ хүүхдийн хооллолтын алдаа бэрхшээлүүдийг заа.

1. Хооллолтын тоо цөөн (өдөрт 3 удаа)

2. Хоол нь илчлэг бус /шингэн шөл/

3. Хүүхдийг идэвхтэй хооллодоггүй

4. Хүүхдэд мах идүүлдэггүй
5. . Хоногийн хоолны хэмжээ бага
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

373. Гиперпноэ аль нь вэ?

1. Давтамж хэвийн
2. Давтамж ихэссэн
3. Далайц ихэссэн
4. Далайц буурсан
5. Бүгд буруу
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

374. Ой хүртэлх хүүхдийн хөдөлгөөн-сэтгэцийн хөгжлийг шалгах үзүүлэлт

1. Биеийн байрлал
2. Рефлекс
3. Хөдөлгөөний эвсэл
4. Сэтгэл хөдлөл
5. Хэл яриа, хараа, сонсголын баримжаа
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

375. Хүүхдэд хэдэн янзын үс байх вэ?

1. Шар үс
2. Урт үс
3. Ахар үс
4. Цагаан үс
5. Хар үс
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

376. Улаанбурхан өвчний үндсэн шинжүүдийг нэрлэ:

1. Бельский-Филатов-Копликийн шинж
2. Улайх үрэвслийн шинж: ханиах, нүд нуухдах, нус гойжих.
3. Улайх үрэвслийн шинж эхэлснээс 3-4 хоногт арьсан дээр толбон гүвдрүүт тууралт үе шаттай нарна.
4. Толбон гүвдрүүт тууралт нь хоорондоо нийлэх хандлагатай

5. Тууралтын 3 дахь өдрөөс нүүрний арьснаас эхлэн арьс гуужин нөсөөжилт үүснэ.

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

377. Боталловын цорго нь үйл ажиллагааны хувьд төрсний дараа хэзээ битүүрдэг вэ?

- 1. Төрсний дараа шууд хаагддаг
- 2. 7-10 хоногт хаагддаг
- 3. Аяндаа хаагдана
- 4. 2-3 сартайд бүрэн битүүрнэ
- 5. Бүгд зөв
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

378. Тураалтай хүүхдэд үзүүлэх тусламжийн хамгийн чухлыг заа.

- 1. Нар агаарт гаргахыг эхэд зөвлө.
- 2. Хүүхдийн хооллолтын байдлыг үнэлэн хоолны зөвлөгөө өг.
- 3. А аминдэмийн 2 тунг өг.
- 4. 5 хоноод давтан үзэж хооллолтыг дахин үнэлнэ.
- 5. 14 хоногийн дараа давтан үзнэ.
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

379. Уушгины хатгалгаатай 9 сартай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд биеийн байдал нь дордсон, ханиалгасан хэвээр, цээж нь хонхолзож байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ?

- 1. Эмчилгээг зогсооно.
- 2. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийн эхний тунг өгнө.
- 3. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эмийг үргэлжлүүлэн өгнө
- 4. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ
- 5. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийг 5 хоног гэрээр уулгана
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

380. Арьсны үндсэн давхаргыг сонгоно уу?

- 1. Эпидермис
- 2. Хөрсөн үе
- 3. Дерма

- 4. Арьсан үе
- 5. Бүгд зөв
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

381. Интерстициаль нефрит үүсэх шалтгааныг дурд

- 1. Эмийг (гентомицин, стрептомицин, ампициллин, аспирин, сульфаниламидын бэлдмэлүүд) замбараагүй хэрэглэх.
- 2. Хордлого, түлэгдэлт, гэмтэл, цус задрал.
- 3. Мэдрэл үений эмзэгшил.
- 4. Пурины солилцооны эмгэгийг эцэг эхээс удамших
- 5. Химийн хорт бодис, харшил үүсгэгч хүнс, орчин.

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

382. 2 настай Дэмбэрэл “ Уушигны хатгалгаагүй Ханиад шуухнаа, халууралт, нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан” гэж ангилагдсан байна. Өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

- 1. Хоргүй зөөлөн эмчээр ханиалгыг эмчил
- 2. Гэртээ хариад өндөр халуурвал парацетамол 0,5 шахмалаас 1\4 –ээр уулахыг зөвлөнө.
- 3. Улаан А аминдэмээс өнөөдөр нэг капсулыг өгнө,.
- 4. Нүдний халдварыг тетрациклины тосоор эмчлэхийг зааж өгнө.
- 5. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

383. Уушгины цочмог үрэвсэлтэй хүүхдийн эмчилгээнд дараах орно:

- 1. Өвчтөнд таатай нөхцөл бүрдүүлэх
- 2. Шалтгааны эсрэг
- 3. Эмгэгжамын
- 4. Амьсгал дутлын эсрэг
- 5. Дархлааг дэмжих

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

384. Ургийн зүрхний цохилт төрөх үед хэд болдог вэ?

- 1. 160

2. 165

3. 155

4. 130

5. 150

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

385. Хүүхдээ зөв тэврэн хөхүүлж байгааг ямар шинжүүдээр шалгах вэ?

1. Хүүхдээ бүхэлд нь хоёр гараараа тэврэх.

2. Хүүхдийн нүүр хөхрүүгээ харсан байх.

3. Хүүхдийн толгой бие нэг тэнхлэгт байх.

4. Хүүхдээ гуя нь дээрээ суулгасан байх.

5. Хүүхдээ нэг гараараа тэвэрч, нэг гараараа хөхүүлж буй хөхийг барих.

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

386. Дулаан хэлхээнд дараах хэсэг ордог:

1. Төрөх өрөө дулаан

2. Нярайг тавих гадаргуу дулаан

3. Нярайг төрмөгц хуурайшуулах

4. Нярайг түргэн өлгийдөх

5. Нярайг эхийн цээжин дээр тавьж, хучих

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

387. Хүүхдийн шээлэйн онцлогийг дурьдана уу?

1. Харьцангуй өргөн

2. Булчингийн ширхэг сул хөгжсөн

3. Нугалаа ихтэй

4. 0.3-0.4 см орчим зузаан ханатай

5. Уян

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

388. Харшлын шалтгаантай ходоодны цочмог үрэвслийн үед эмнэлзүйд илрэх шинжүүдэд дараах орно

1. Гэдэс базалж өвдөх

2. Бөөлжих

3. Суулгах
4. ЦЕШ-нд эозинофил олшрох
5. Зөв эмчилвээс 1-3 хоногт илаарших
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

389. Гуурсан хоолойн энгийн үрэвслийн үед цээж чагнахад илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэнэ үү?

1. Гуурсан хоолойн чимээтэй ширүүн амьсгал
2. Исгэрэх эсвэл олон янзын царгилдсан хуурай хэржигнүүр
3. Заримдаа нойтон хэржигнүүр
4. Шаржигнуур
5. Гялтан шүргэлцэх чимээ
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

390. Зүрхний дутагдлын 1-р үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно:

1. Хөдлөх явах зэрэг ачааллын үед ядрах
2. Тайван үед зүрхний цохилт бага зэрэг олшрох
3. Хөхүүл насны хүүхэд тасалдаж хөхөх
4. Хэвлийн хөндийд шингэн хурах
5. Элэг томрох
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

391. Уушгины хатгалгаатай 6 сартай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд биеийн байдал нь янзандаа, ханиалгасан хэвээр, амьсгал минутанд 52 байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эмийг үргэлжлүүлэн өгнө.
2. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийг өгнө.
3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ
4. 2 хоноод давтан үзнэ.
5. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

392. Гол судасны нарийсалтай өвчтөнд илрэх эмнэлзүйн шинжүүдээс дурьдана уу.

1. Хүүхэд цонхийх, амьсгаадах, үе үе давчдах
 2. Өвчүүний баруун 2р хавирганы завсарт агшилтын тод шуугиан сонсогдох
 3. Артерийн агшилтын даралт багасах
 4. Судасны дүүрэлт хүчтэй, хурдан
 5. Зүрхний хил баруун тийш томрох
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

393. Шенлейн-Генохын өвчний үеийн тууралтын онцлог нь:

1. Цусархаг
 2. Салстад цус хуралттай
 3. Тэгш хэмтэй
 4. Хэм тэгш бус
 5. Барын арьс"-ны шинжтэй
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

394. Ерөнхий боловсролын сургуульд дархлаажуулалтын 10 хоногоор эмч сувилагч нар иржээ. 7 настай хүүхдүүд ямар вакцин хийлгэсэн байх ёстой вэ? Өнөөдөр тэд ямар вакцинд хамрагдах вэ?

1. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, УБ I, II, тун хийлгэсэн байх ёстой.
 2. Өнөөдөр сүрьеэгийн сорил тавиад 72 цагийн дараа шалгана.
 3. СТ I хийнэ.
 4. Сорил эерэг гарсан тхиолдолд БЦЖ хийхгүй.
 5. Сорил сөрөг гарсан тохиолдолд БЦЖ хийнэ.
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

395. Хүүхдийн зүрхний 1 үелэлийн үргэлжлэх хугацаа хэд вэ?

1. Урагт 0.35-0.45 сек.
 2. Нярайд 0.4-0.5 сек
 3. Насанд хүрэгсдэд 0.3-0.5 сек
 4. Урагт 0.17-0.25 сек
 5. Нярайд 0.15-0.25 сек
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

396. 6 сартай хүүг эх нь хөхөө хөхөх, унтаж байхдаа хөлөрдөг, шээс үнэртэй гэсэн зовиуртай эмчид үзүүлэв. ХӨЦМ-ийн дагуу хүүхдийг үнэлэхэд зулайн ирмэг зөөлөрсөн, сальпингийн эрхний шинжтэй, хэвлийн булчин суларсан харагдав. Энэ хүүхдэд зохих ангиллын дагуу эмчилгээг хийнэ үү?

1. Д аминдэмийг долоо хоногийн даваа, пүрэв гаригт 50 000 нэгжээр, нийтдээ 7 удаа уулгах
2. Нар агаарт гаргах
3. 30 хоноод давтан үзүүлэх
4. Дараа нь урьдчилан сэргийлэх тунгаар Д аминдэм өгөх
5. Эхийг магтах

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

397. Таталдамхай өвчний үед хэрэглэх эмийн бэлдмэлийн зөв сонгоно уу:

1. Витамин Д
2. Кальцийн бэлдмэл
3. Таталт тавиулах бэлдмэл
4. Бикарбонат натри
5. Антибиотик

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

398. Органик шуугианы онцлог юу вэ?

1. Чанга ширүүн
2. Урт, агшилтын үргэлжлэх хугацааны 1/3-ээс илүү удаан үргэлжилнэ
3. Ямагт I, II авианы аль нэгтэй холбоотой сонсогдоно
4. Биеийн ачааллын үед ширүүснэ
5. Бага давтамжтай

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

399. Шенлейн-Генохын өвчний үед хоолонд дараах зүйлийг хэрэглэхийг зөвлөнө:

1. Жижиглэсэн, цочрол өгөхгүй, шингэц сайтай хоол
2. Шоколад, жүрж, ундаа уулгах
3. Сүү сүүн бүтээгдхүүн хэрэглэх
4. Какао, кофе өгөх
5. Утсан, хайрсан бүтээгдхүүн хэрэглэх

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

400. ХӨЦМ-ийн дагуу “Уушгины хүнд хатгалгаа” гэдэг ангиллыг эмч ямар шинжийг үндэслэн тавих вэ?

1. Цээж хонхолзох, ханиалгах

2. Ямар нэг аюултай ерөнхий шинж илрэх

3. Тайван үед хяхтнаж амьсгалах, ханиалгах

4. Амьсгал олшрох, ханиалгах

5. Шуугиант амьсгал

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

401. Халдвар харшлын гуурсан хоолойн багтрааны халдваргүй багтраанаас ялгагдах шинжүүдийг зөв сонгоно уу:

1. Халуурах

2. Багтрааны өмнө эцэст ханиалгах

3. Идээрхэг цэр нус гарах

4. Зовхи хамар загатнах нь олонтаа

5. Цэрээр бөглөрөх нь бага

А. Бүх хариулт зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

402. Дараах цэгүүдээс аль цэгт илүү сайн чагнах хэрэгтэй вэ?

1. Суганы шугамаар

2. Нурууны хажуугаар

3. Нуруу далны хооронд

4. Далны дор

5. Зүрхний орчим

А. Бүх хариулт зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

403. Гуурсан хоолойн багтрааг дэлхийн олон эрдэмтэд дараахид тулгуурлан ангилдаг

1. Өвчний хэлбэр

2. Хэвшинж

3. Хүнд хөнгөний зэрэг

4. Шалтгаан хамаарал

5. Хүндрэл

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

404. Ходоод гэдэснээс цус алдах үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдээс нэрлэнэ үү.

- 1. Өтгөн хар хүрэн буюу кофе-ны шаар шиг өнгөтэй зүйлээр бөөлжих
- 2. Баас хар өнгөтэй гарах
- 3. Ам цангаж хатах
- 4. Хүйтэн хөлс гарах
- 5. Арьс цонхийж цайх, толгой эргэх

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

405. Шүүдэст эмзэгшилтэй хүүхдэд дараах эрхтэнд өөрчлөлт илрэнэ:

- 1. Арьс
- 2. Салст
- 3. Салстаар хучигдсан дотор эрхтэн
- 4. Тунгалгийн зангилаа
- 5. Дархлаа тогтолцоо

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

406. Лейкоз өвчний эхлэл үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдээс нэрлэнэ үү

- 1. Хүүхэд тамирдангуй, сул, ядрамтгай болох
- 2. Тодорхой шалтгаангүй халуурах
- 3. Халуун 37.5-38.5 байх
- 4. Арьс салстад цус харвах, цус гоожих
- 5. Гэрлээс дальдрах, хэт мэдрэг болох

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

407. Шингэн их алдалттай суулгалтын шинжүүдийг заа.

- 1. Унтаарсан буюу ухаангүй.
- 2. Нүд хонхойх.
- 3. Ууж чадахгүй
- 4. Уухдаа муу.
- 5. Арьсны хуниас маш удаан арилах.

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

408. Сэлэнгэ 8 сартай, 9 кг жинтэй, 20 хоног суулгасан зовиуртай, тайван бус, цочромтгой, шингэн хэвийн ууна, ухаантай, арьсны хуниас хэвийн арилна, нүд хонхойсон. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил

1. Шингэн алдалттай. Хүнд ужиг суулгалт.

2. Шингэн алдалттай. Ужиг суулгалт.

3. Эмнэлэгт хэвтүүлэхээс өмнө А төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтыг эмчилнэ. Эмнэлэт хэвтүүлнэ.

4. А төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтыг эмчилнэ.

5. 5 хоноод давтан үзнэ.

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

409. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан гэж ангилагдсан хүүхдэд эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. А аминдэмийн 2 тунг өгнө.

2. Тетрациклины тосоор нүдний халдварыг гэртээ хэрхэн эмчлэхийг зааж өгнө.

3. Амны шархлааг генцианвиолетээр гэртээ эмчлэхийг зааж өгнө.

4. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө.

5. Хэзээ яаралтай эрж үзүүлэхийг зөвлөнө.

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

410. Гуурсан хоолойн багтрааны эмчилгээнд дараах зүйлс цээртэй

1. Чанга дуу чимээ, хурц гэрэл, зурагт удаан үзэх

2. Хүйтэн ундаа, амтлагч, янз бүрийн халуун ногоо, мөхөөлдөс

3. Хүйтэн цочир даарах, хэт халууцах

4. Давс, чихэрлэг зүйлс түлхүү хэрэглэх

5. Идэвхитэй хөдөлгөөн хийх

А. Бүх хариулт зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

411. Ханиалгаж буй хүүхдэд ямар шинж илрэхэд уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчин гэж ангилах вэ?

1. Ямар нэг аюултай ерөнхий шинж.

2. Цээж хонхолзох.

3. Тайван үедээ хяхтнаж амьсгалах.

- 4. Амьсгал олшрох.
- 5. Амьсгал шуугиантай байх.
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

412. Дутуу нярай уушгинд юу дутагдсанаас цулцангийн авчилз үүсч амьсгалын дутагдалд ордог вэ?

- 1. O₂
- 2. CO₂
- 3. Цус
- 4. Сурфактант
- 5. Ус
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

413. Хэрлэгийн оношлогооны Кисель- Джонсоны эмнэлзүйн туслах шалгуурт орох шинжүүдийг сонгоно уу.

- 1. Хэрлэгээр өвдөж байсан өгүүлэл
- 2. Үеэр хэрж өвдөх, халуурах
- 3. Ядрах, хэвлий өвдөх, хамраас цус гарах
- 4. Цагираг хэлбэрийн тууралт
- 5. Арьсан доорх зангилаа
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

414. Хамрын дайвар хөндийнүүдийн үрэвсэл байж болзошгүй өвчтөнд өрхийн эмчээс ямар тусламж үзүүлэх вэ?

- 1. Дайвар хөндийн зураг авахуулна.
- 2. Чих хамар хоолойн эмчид үзүүлнэ.
- 3. Чих хамар хоолойн эмчийн зөвлөмжийг биелүүлнэ.
- 4. Давтан үзлэг товлон.
- 5. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг хэлж өгнө.
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

415. Аль шалтгааны улмаас хүүхэд амархан гулгидаг вэ?

- 1. Ходоодны амсрын сфинктер булчингийн хөгжил сул
- 2. Нугалуурын булчин сайн хөгжсөн

3. Ходоод ташуу байрлалтай
4. Хүүхдийн биеийн гадаргуугийн масс бага
5. Ходоодны агшилт муу
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

416. Зүрхний дутагдлын 2а үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдэд дараах орно

1. Тайван үед амьсгаадах
2. Уушгины доод хэсэгт нойтон хэржигнүүртэй
3. Гүрээний вен чинэрэх
4. Элэг томрох
5. Хөлийн шилбээр хавагнах

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

417. Зүрхний булчингийн үрэвслийн үед эмнэлзүйд илрэх гол шинжүүдийг дурьдана уу.

1. Зүрх зүүн тийш томрох
2. Зүрхний оройд агшилтын шуугиан
3. 1-р авиа бүдгэрэх
4. 1-р авиа эрс тодрох
5. Зүрхний цохилт цөөрөх

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

418. Шээсээр оксалат их гарч байгаа хүүхдэд дараах хүнсний бүтээгдхүүнийг зөвлөнө:

1. Байцаа
2. Чангаанз
3. Гадил, лийр
4. Ургамлын тос
5. Цагаан талх

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

419. Маш хүнд халууралт өвчнийг ямар шинжүүдээр ангилах вэ?

1. Аюултай ерөнхий шинжийн аль нэг илрэх.
2. 40 хэмээс дээш халуурах.

3. Хүзүү хөшингө болох.
 4. 38,5 дээш халуурах
 5. Эм уухдаа бөөлжих.
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

420. Уушгины хатгалгаатай 6 сартай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд биеийн байдал нь янзандаа, ханиалгасан хэвээр, амьсгал минутанд 52 байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эмийг үргэлжлүүлэн өгнө.
 2. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийг өгнө.
 3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
 4. 2 хоноод давтан үзнэ.
 5. Үүсгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

421. Хөврөлийн хөгжлийн хэд дэх долоо хоногт зүрх үүсч эхэлдэг вэ?

1. 1 дэх долоо хоног
 2. 5 дэх долоо хоног
 3. 6 дэх долоо хоног
 4. 2 дэх долоо хоног
 5. 81 дэх долоо хоног
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

422. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхойд хамааралтай тодорхойлолтыг зөв сонгоно уу.

1. Зүрхний төрөлхийн гажгуудын дотор хамгийн олонтаа тохиолддог гажгуудын нэг юм
 2. Цус эргэлтийн өөрчлөлт нь зүүн ховдлоос баруун руу юүлэгдэнэ.
 3. Цус эргэлтийн өөрчлөлт 2-4 сараас эхлэн ажиглагдана
 4. Хөхрөх шинж бүхий зүрхний гажгуудаас хамгийн элбэг тохиолддог.
 5. Уушгины артерит 1-р авиа өргөгдөж салаална.
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

423. Томуугийн үед бусад амьсгалын замын халдвараас ялгагдах эмнэлзүйн гол шинжүүдийг зөв сонгоно уу?

1. Биеэр цусархаг тууралт гарах
2. Өндөр халуурах
3. Хордлогын шинжүүд тод
4. Өвчин цочмог эхэлж, хурдан тархах
5. Халдвар авснаас хойш өвчний эхний шинжүүд илрэх хүртэлх нууц хугацаа маш богино

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

424. Хөндийгүй анхдагч дүрс язгуурт аль нь орох вэ?

1. Толбо
2. Гүвдрүү
3. Товруу
4. Сорви
5. Хайрс

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

425. Ямар үед өтгөн хатах шинж илэрдэг вэ?

1. S гэдэс харьцангуй урт
2. Хэрэглэж буй хүнсний төрөл
3. Гэдэсний гажиг хөгжил
4. Булчин чангарсан үед
5. Халуурах

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

426. Бага жинтэй нярай төрөх шалтгаанд юу орох вэ?

1. Хоол тэжээлийн дутагдал
2. Жирэмсэн эхийн өвчлөл
3. Жирэмсэн эхийн тамхидалт
4. Эх чихрийн шижинтэй байх
5. Эх хөдөлгөөн ихтэй байх

- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

427. Хүүхдийн автомат рефлексүүдийг нэрлэнэ үү?

1. Уруул цорвойх
2. Атгах
3. Тулгуурын
4. Огих
5. Нүд анивчих

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

428. “Маш хүнд халууралт өвчин” гэж анх ангилагдсан 5 сартай хүүхдэд ямар тусламж үзүүлэх вэ?

1. Тохирох антибиотикийн эхний тунг өгнө.
2. Цусны чихэр багасхаас сэргийлж хүүхдийг эмчил
3. Сайн хөхүүлэхийг зөвлөнө
4. 38,5 хэмээс дээш халуунтай бол парацетамол өгнө
5. Гараа эмчилгээ хийсний дараа эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

429. IgA дутмагшилтай хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчнийг нэрлэнэ үү?

1. Харшлын өвчин
2. Нарийн, бүдүүн гэдэсний шархлаат өвчин
3. Ходоод гэдэсний замын өвчин
4. Ялтсан эс цөөрөх
5. Дэлүү томрох

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

430. Ямар үед зулай овойх вэ?

1. Тархины хаван
2. Мэнэн
3. Гавлын дотоод даралт ихсэх
4. Сульдаа
5. Сүрьеэ

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

431. Шенлейн-Генохын өвчин дараах хүчин зүйлээс хамааралтай

1. Өвөл хаврын улирал
 2. Сургуулийн нас
 3. Архаг голомт
 4. Сэргийлэх тарилга
 5. Харшил өгөх хүнсний зүйл
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

432. 2 настай хүүхэд 1 хоног өндөр халуурч, татсан зовиуртай дуудага өгсөн. Хүүхдийг үзхэд таталт намдсан, халуун буурсан, өөр зовиур, эмгэг шинж илрээгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилаж, ямар тусламж үзүүлэх вэ?

1. Аюултай ерөнхий шинжтэй гэж ангилна.
 2. Маш хүнд халууралт өвчин гэж ангилна
 3. Өндөр халуурвал парацетомол өг
 4. Тохирох антибиотикын эхний тунг өг, цусны чихэр багасахаас сэргийлнэ, эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
 5. эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

433. Хүүхдийн уушгины голомтот үрэвслийн онцлог шинж юу вэ?

1. Өвчин аажим эхэлсэн үед АЦХ-ын шинж дээрдэж байснаа 7 хоногийн сүүлээр ерөнхий хордлогын шинж дахин илрэх
 2. Цэртэй ханиалгах, амьсгаадах
 3. Дал хооронд ба далны доод хэсэгт тогшилтын авиа бүдгэрэх
 4. Уушгины авиа суларсан эсвэл тодорсон
 5. Шаржигнасан жижиг хөөслөг нойтон хэржигнүүр
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

434. Вакцин хийлгэсэн хүүхдийн ээжэд юуг сануулах ёстой вэ?

1. Хүүхэд нэг өдөр бие нь тавгүй болж, халуурч болзошгүй
 2. Энэ нь вакцинд дархлаа үүсэж буй хэвийн хариу урвал тул айх хэрэггүй, хүүхдээ сайн хөхүүлж, шингэн сайн уулга.
 3. Хэрэв хүүхэд нэгээс олон хоног халуурвал авчирч үзүүлэх хэрэгтэй.
 4. . Хэрэв хүүхэд вакцин хийлгэсэн өдрөө халуурвал котримоксазол, парацетамол хоёрыг өгөөрэй.
 5. Вакцинд харшил үүсч болзонгүй тул димедрол уулгаарай.
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

435. Ханиад шуухнаатай хүүхдийг хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг зөвлөх вэ?

1. Халуурах

2. Өвчин хүндрэх

3. Амьсгал олшрох.

4. Амьсгал саадтай болох.

5. Хөхөндөө буюу хоолондоо муудах

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

436. Синусит буюу дайвар хөндийнүүдийн үрэвслийг оношлохдоо дараахид тулгуурлана:

1. Эмнэлзүйн шинжүүд

2. Дух хацрын ясанд дарах тогшиход хөндүүрлэх

3. Нүүрний рентген зурагт дайвар хөндийд шингэний түвшин илрэх

4. Дайвар хөндийд хатгалт хийх

5. Нянгийн шинжилгээ

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

437. Шенлейн-Генохын өвчний үед судасны нэвтрэмж багасгах, цус тогтоох зорилгоор ямар эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж болох вэ?

1. Аскорбины хүчил

2. Рутин

3. Аскорутин

4. Хлорт ба глюконат кальцийн уусмал

5. Викасол

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

438. Пиелонефритээр өвдсөн хүүхдэд хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтийн ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Хоногийн давсны хэрэгцээг 1,5-3 гр. хүртэл хязгаарлана.

2. C, B бүлгийн аминдэм өгнө.

3. Бифидум бактерин эсвэл лактобактерин уулгана.

4. Сэдрэлээс сэргийлэх эмчилгээг 6 сар төгс хийнэ. Эхний 10 хоног антибиотик эсвэл уросептик хэрэглэнэ.2 дахь 10 хоногт ургамал эмчилгээг залгаж хийнэ.3 дахь 10 хоногт завсарлана.

5. Даарч хөрөхгүй байх, задгай усанд орохгүй байхыг зөвлөнө.

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

439. Рахитын улмаас толгойн ясанд гарах өөрчлөлтүүдийг зөв сонгоно уу

1. Дагзны яс зөөлрөх

2. Зулайн ирмэг зөөлрөх

3. Дух чамархайн ясанд булдруу үүсэх

4. Зулай хожуу битүүрэх

5. Зулайн ирмэг овойж, эрт битүүрэх

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

440. Мэдрэл үений эмзэгшилтэй хүүхдийн эмчилгээ сэргийлэлтэд дараах орно:

1. Пуринээр баялаг бүтээгдхүүн хязгаарлах

2. Хүчээр хооллохгүй байх

3. Биеийн тамираар хичээллэх

4. Гэнэтийн цочролоос сэргийлэх

5. Шүлтлэг рашаан, давс үе үе хэрэглэх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

441. Верльгофын өвчний эмгэгжамд гойд нөлөөтэй хүчин зүйлсийг нэрлэ.

1. Ясны чөмгөнд ялгаран хөгжөөгүй эсийн хэт төлжилт явагдах

2. VIII хүчин зүйл хомсдох

3. Ялтсан эсийн тоо цөөрөх

4. Захын цусанд ялтсан эсийн задрал ихсэх

5. Цус гоожих

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

442. Ганболд, 8 сартай, 9 кг жинтэй, алга цайсан, Хөхөө хөхөхдөө хөлөрдөг, булчин сул, сарпингийн эрхийн шинжтэй. Хоногт 5 удаа хөхөө хөхдөг, 200 гр

бантан, 200 гр каш иддэг, цай боорцогтой 1 удаа иддэг, өөр хоол өгдөггүй. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. Ямар зөвлөгөө өгөх вэ?

1. Цус багадалт. Рахит. Хооллолтын бэрхшээлтэй.- гэж ангилна.
2. Төмрийн сироп 2 мл-ээр 14 хоног уулгана.
3. Д витамин 50000 нэгжтэй шахмалаас даваа, пүрэв гариг бүрт нийт 7 удаа уулгана.
4. Хөхөө сайн хөхүүлэх, нэмэлт хоолыг 3 удаа идүүлэх ба цайны оронд хярам, жимсний шүүс, буцалсан ус уулгахыг зөвлөнө.
5. Давтан үзлэгт 5 хоноод ирэх.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

443. Зүрхний дотор бүрхүүлийн фибраэластозын үед хүүхэд төрсний дараах эхний сард илрэх шинжүүдээс дурьдана уу.

1. амьсгаадах
2. өсөлт саатах
3. амьсгалын халдвараар байнга өвчлөх
4. гуурсан хоолой бөглөрөх
5. зүрхний дутагдлын шинжүүд

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

444. Ходоодны архаг үрэвслийн үндсэн шинжүүдийг заа.

1. Өлөн үед өвдөлт илрэх.
2. Ходоод дүүрэх, цардах, юм идсэний дараа аюулхай орчим өвдөх
3. Хэвлийг тэмтрэхэд баруун хавирга дор хөндүүрлэх
4. Хэвлийг тэмтрэхэд аюулхай орчим хүндүүрлэх.
5. Керын шинж эерэг байх.

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

445. Гаждал цохиулалтын эмчилгээнд яаралтай хэрэглэх эмийн бэлдмэлүүдэд дараах

1. Зүрх, амьсгалын үйл ажиллагааг сайжруулах бэлдмэл
2. Адренерги үйлчилгээтэй бэлдмэл
3. Кортикостероид
4. Гистамины эсрэг эм
5. Фосфодиэстеразын саатуулуур

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

446. Сувд, 14 хоногтой, 3,6 кг жинтэй, арьсан дээр ганц нэг идээт цэврүү гарсан. Хоногт 9 удаа хөхөө хөхдөг. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил.

1. Хэсэг газрын нянгийн халдвар. Хооллолтын бэрхшээлгүй.-гэж ангилна.
2. Хэсэг азрын халдварыг гэрээр эмчлэхийг эхэд зааж өгнө.
3. Тохирох антибиотыг уулгана.
4. Гэрээр нярайг хэрхэн асрах талаар зааж өгнө.
5. 2 хоноод давтан үзнэ.

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

447. Шенлейн-Генохын өвчний сэдрэлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

1. архаг голомтыг эмчлэх
2. даарах, халууцах, харшил төрүүлэх хүнсний зүйл хэрэглэхээс зайлсхийх
3. харшимтгай бол урьдчилан сэргийлэх тарилга хийлгэхээс өмнө харшлын эсрэг эм уулгах
4. аспирын эмчилгээ хийх
5. гепарин бага тунгаар хэрэглэх

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

448. Улаанууд өвчний үндсэн шинжүүдийг нэрлэ:

1. Дагзны, хүзүүний арын тунгалгын зангилаа томрох
2. Арьсан дээр цайвар ягаан, жижиг толбон тууралт их биеийн ар хэсгээр давамгайлан гарах, туураолт нь хоорондоо нийлэх хандлагагүй.
3. Тууралт 2-3 хоногийн дараа үл мөргүй арилах.
4. Толбон гүвдрүүт тууралт нь хоорондоо нийлэх хандлагатай
5. Тууралтын 3 дахь өдрөөс нүүрний арьснаас эхлэн арьс гуужин нөсөөжилт үүснэ.

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

449. Нярайн тархины онцлог

1. Харьцангуй том хэмжээтэй
2. Тархины атираа намхан
3. Тархины ховил өнгөц
4. Тархины жижиг ховилууд цөөн
5. Ховдлууд том

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

450. 2 сараас 5 хүртэлх насны өвчтэй хүүхдийг үнэлж ангилахдаа эхлээд аюултай ерөнхий шинжүүдийг хэрхэн асууж шалгах вэ?

1. Хүүхэд уух буюу хөхөх чадвартай байна уу
2. Уусан бүхнээ бөөлжиж байна уу
3. Хүүхэд татсан уу
4. Унтаарсан буюу ухаангүй байна уу
5. Цээж хонхолзож байна уу

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

451. 2 сараас 5 хүртэлх насны өвчтэй хүүхдийг үнэлж ангилахдаа аюултай ерөнхий шинжүүдээс ямар шинжийг ажиглах ёстой вэ?

1. Хүүхэд уух буюу хөхөх чадвартай байна уу
2. Уусан бүхнээ бөөлжиж байна уу
3. Хүүхэд татсан уу
4. Унтаарсан буюу ухаангүй байна уу
5. Цээж хонхолзож байна уу

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

452. Баруун уушгины доод дэлбэнгийн үрэвслийн онцлог шинж юу вэ?

1. Өвчин гэнэт эхэлж, өндөр халуурах
2. Толгой өвдөж, биеийн байдал дордох
3. Өвчний эхлэл үед баруун цавь, хүйс орчмоор өвдөх
4. Бөөлжих
5. Гэдэс дүүрэх, суулгах

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

453. Бөөрний түүдгэнцрийн цочмог үрэвслийн тодорхойлолтод тохирохыг зөв сонгоно уу.

1. Стрептококкоор үүсгэгдсэн хамар залгиурын үрэвслийн дараа 10 гаруй хоногийн дараа өвөл, хаврын үед ихэвчилэн тохиолдоно
2. Ихэнхидээ сургуулийн бага насныханд тохиолдоно
3. Хөвгүүд охидоос 2 дахин өвчилнө

4. Сургуулийн насны охид 5 дахин илүү өвчилнө
5. Шээсний замын гаж хөгжлийн суурин дээр илүүтэй үүснэ

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

454. “Шингэн их алдалттай суулгалт” гэж ангилагдсан 9 сартай 9 кг жинтэй хүүхдэд ямар хэмжээний рингер лактатын уусмалыг, хэрхэн дуслаар хийх вэ?

1. 6 цагийн турш 900 мл буюу 100 мл/кг жинд Рингер лактатын уусмал судсаар дусаана
2. Эхний 1 цагт 270 мл буюу 30 мл/кг Рингер лактатын уусмал судсаар дусаана
3. Дараагийн 5 цагт 630 мл буюу 70 мл/кг Рингер лактатын уусмал судсаар дусаана
4. Хүүхдийн биеийн жинг 75 мл-т үржүүлээд гарах хэмжээгээр шингэнийг 4 цагийн турш уулган.
5. 4 цагийн турш 120 мл/кг жинд тооцоолон дуслаар шингэн юүлнэ.

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

455. Холбогч эдийн түгээмэл үрэвслийн эхлэл үед илрэх эмнэлзүйн ерөнхий шинжүүдийг нэрлэнэ үү.

1. Шалтгаангүй ядрах
2. Хөдөлгөөн сулрах
3. Турж эцэх
4. Хоолонд дургүйлхэх
5. Антибиотик, үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд халууралт намдахгүй байх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

456. 6 сар хүрээгүй хүүхдэд А аминдэмийг ямар тунгаар , ямар заалтаар өгдөг вэ?

1. 50000 нэгжтэй цагаан капсулаас нэгийг эсвэл 100000 нэгжтэй хөх капсулын талыг (3 дусал) өгнө.
2. А аминдэмийн улаан капсулаас 1 ширхэгийг өгнө.
3. Хүнд тураал буюу хүнд цус багадалт гэсэн заалтаар эсвэл улаанбурхан гэж ангилагдсан хүүхдэд А аминдэм уулгана.
4. А аминдэмийн хөх капсулаас 1 ширхэгийг өгнө.
5. Эрүүл ч гэсэн 6 сар тутамд өгнө.

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

457. Хамраас цус гоожих үед яаралтай үзүүлэх арга хэмжээ авна уу

1. Толгойг гэдийлгэж, хамарт хүйтэн жин тавих

2. Адреналин, эфедрин, аскорбины хүчил зэрэг цус тогтоохуусмалаар норгосон чихээс хамарт хийх

3. Хлорт кальци, кальци глюконат, аскорбины хүчил, викасол тарих

4. Гистамины эсрэг ба дааврын бэлдмэл хэрэглэх

5. Хүчилтөрөгч өгөх

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

458. 6 сартай хүүхэд ханиалгаж байгаад цэрээр бөөлжсөн. Эх нь түүнд эм уулгах гэсэн чинь дахин бөөлжиж эмээ гаргасан тул хөхийг нь хөхүүлээд унтуулжээ. Шөнө давтан бөөлжөөгүй. Өглөө хүүхэд сэрээд ханиалгахдаа дахин бөөлжсөн байна. Хүүхдийг үзэхэд амьсгал минутанд 42, цээж хонхозоогүй, хяхтнаа амьсгалгүй, халуураагүй, суулгаагүй, чихний өвчин байхгүй, өөр зовиур, эмгэг шинж илрээгүй. Хүүхдийг хэрхэн үнэлж, ангилах вэ?

1. Уусан бүхнээ бөөлжиж буй тул “Аюултай ерөнхий шинжтэй” гэнэ.

2. Хөхний сүүгээ бөөлжөөгүй тул аюултай ерөнхий шинжгүй гэнэ.

3. Аюултай ерөнхий шинжтэй, ханиалгасан тул “Уушгины хүнд хатгалгаа” гэнэ.

4. Аюултай ерөнхий шинжгүй, ханиалгасан, амьсгал олшроогүй, цээж хонхозоогүй, хяхтнаа амьсгалгүй тул “Ханиад шуухнаа” гэж ангилна.

5. Аюултай ерөнхий шинжгүй, ханиалгасан, амьсгал олшрирсон тул “Уушигны хатгалгаагүй ханиад шуухнаа” гэж ангилна.

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

459. Маш хүнд халууралт гэж ангилсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?

1. Үүсгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тунг өгнө

2. Цусны сахар багсахаас сэргийлж эмчилнэ. 38,5 хэмээс дээш халуунтай бол парацетамолын нэг тунг өгнө.

3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

4. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног уулгана.

5. Парацетамолыг халуун бууруулахаар 6 цаг тутам уулгахыг зөвлөнө

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

460. Халуурч буй хүүхдэд улаанбурханы ямар шинжүүдийг ажиглах ёстой вэ?

1. Түгээмэл тууралт.
2. Ханиалга.
3. . Нус гойжих.
4. Нүд улайх.
5. Халуурах

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

461. Нярай хүүхдийн зүрхний байрлал?

1. Th6-Th9 түвшинд
2. Хөндлөн байрлалтай
3. Дагуу байрлалтай
4. Th4- Th8 түвшинд
5. Ташуу байрлалтай

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

462. Мальабсорбцийн хамшинжийн шалтгаан юу вэ?

1. Гэдэс тайрагдах
2. Нарийн, бүдүүн гэдэсний архаг үрэвсэл
3. Нойр булчирхайн үрэвсэл
4. Антибиотик удаан хэрэглэх
5. Кроны өвчин

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

463. Дунд чихний цочмог үрэвслийн үед эмнэлзүйд илрэх гол шинжүүдийг нэрлэнэ үү:

1. Халуурч, сульдах
2. Нэг хэсэг хугацаанд тасралтгүй чарлах
3. Унтаж чадахгүй, уйлах
4. Хөхөх үедээ үе үе больж уйлах
5. Хамар битүүрэх

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

464. Нярай хөхүүл хүүхдийн хоол боловсруулах эсэгийн идэвх сул, хэмжээ бага учраас хөндийн хоол боловсруулалт давамгайлна.

А. Зөв, Зөв, Буруу

В. Зөв, Зөв, Зөв

С. Буруу, Зөв, Буруу

Д. Буруу, Буруу, Буруу

Е. Зөв, Буруу, Буруу

465. Хүүхдийн бөөр илүүдэл шингэнийг түргэн ялгаруулдаг тул шээсний хувийн жин бага байдаг.

А. Зөв, Зөв, Зөв

В. Буруу, Зөв, Буруу

С. Буруу, Буруу, Буруу

Д. Зөв, Буруу, Буруу

Е. Зөв, Зөв, Буруу

466. Бөөр нь биологийн идэвхт бодис ялгаруулдаг тул бөөрний эмгэгийн үед даралт ихсэх, цус багадах, цус бүлэгнэлт буурах зэрэг шинж илэрдэг.

А. Зөв, Зөв, Буруу

В. Зөв, Зөв, Зөв

С. Буруу, Зөв, Буруу

Д. Зөв, Буруу, Буруу

Е. Буруу, Буруу, Буруу

467. Хүүхдийн бөөрний цусан хангамжийн ихэнх хэсэг нь тархилаг давхаргаар өнгөрдөг тул бөөрний тархилаг ба холтослог давхаргын зааг муу ялгардаг.

А. Буруу, Буруу, Буруу

В. Зөв, Зөв, Зөв

С. Зөв, Зөв, Буруу

Д. Зөв, Буруу, Буруу

Е. Буруу, Зөв, Буруу

468. Нас ахих тутам тэнэгч мэдрэлийн зохицуулга сайжрах учраас зүрхний цохилт олширно.

А. Зөв, Буруу, Буруу

В. Зөв, Зөв, Буруу

С. Буруу, Буруу, Буруу

Д. Зөв, Зөв, Зөв

Е. Буруу, Зөв, Буруу

469. Хорей өвчний үед албадмал, эмх замбараагүй хөдөлгөөн илэрдэг учраас хүүхэд “сахилгагүй” нэр авдаг.

А. Зөв, Буруу, Буруу

В. Зөв, Зөв, Буруу

С. Зөв, Зөв, Зөв

Д. Буруу, Зөв, Буруу

Е. Буруу, Буруу, Буруу

470. Ургийн үед бөөрний эргэх үйл хямарснаас бөөрний байршлын гажиг үүснэ.

A. Буруу, Зөв, Буруу

B. Зөв, Буруу, Буруу

C. Зөв, Зөв, Буруу

D. Зөв, Зөв, Зөв

E. Буруу, Буруу, Буруу

471. Хүүхдийн бөөрний тунгалгийн судас, гэдэсний тунгалгийн судастай нягт холбоотой байдаг тул гэдэсний халдвар бөөрөнд дамжих боломжтой.

A. Буруу, Зөв, Буруу

B. Зөв, Зөв, Зөв

C. Зөв, Буруу, Буруу

D. Буруу, Буруу, Буруу

E. Зөв, Зөв, Буруу

472. Хүүхдийг их юм мэдүүлэх гэж шахах нь хортой яагаад гэвэл тархи туйлдан ядарч хүүхэд нойр, хоолондоо муудаж цаашилбал мэдрэл-сэтгэхүйн эмгэг ч үүсч болно.

A. Буруу, Буруу, Буруу

B. Зөв, Зөв, Буруу

C. Зөв, Буруу, Буруу

D. Зөв, Зөв, Зөв

E. Буруу, Зөв, Буруу

473. Ясжилтын цэг үүстэл хөндийт яс диафизийн төгсгөлийн мөгөөрсөн эдээс урган уртасна.

A. Буруу, Буруу, Буруу

B. Зөв, Зөв, Зөв

C. Буруу, Зөв, Буруу

D. Зөв, Буруу, Буруу

E. Зөв, Зөв, Буруу

474. Төмөр дутлын цус багадалтын үед ферритиний хэмжээ хэдээс доош байх вэ?

A. 30 нг/мл

B. 50 нг/мл

C. 10 нг/мл

D. 40 нг/мл

E. 20 нг/мл

475. Тураалын II зэргийн үед арьсан доорх өөхөн эд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

A. Нүүрнээс бусад хэсэгт нимгэрсэн байна

B. Хэвлий, чээжинд арилж, мөчдөөр эрс багассан

C. Нүүрэнд арилж, хэвлий чээжинд нимгэрсэн

D. Нүүр, мөчдөөр нимгэрч, бусад хэсэгт хэвийн байна

E. Бүх биеийн өөхөн давхарга арилна

476. Гүйцэт нярайн биед агуулагдах нийт төмрийн хэмжээ ямар вэ?

A. 600 мг

B. 2600 мг

C. 122 мг

D. 242 мг

E. 400 мг

477. 13 настай хүүхдийн биед агуулагдах нийт төмрийн хэмжээ ямар вэ?

- A. 122 мг
- B. 400 мг
- C. 600 мг
- D. 242 мг
- E. 2600 мг

478. Төмөр дутлын цус багадалтын үед сийвэнгийн төмөр сэлбэх чадвар хэдээс дээш болох вэ?

- A. 83 мкмоль/л
- B. 63 мкмоль/л
- C. 43 мкмоль/л
- D. 53 мкмоль/л
- E. 23 мкмоль/л

479. Тураалын II зэрэгтэй хүүхдийг хэдэн удаа хооллох вэ?

- A. 9
- B. 6
- C. 5
- D. 7
- E. 8

480. 5 настай хүүхдийн гемоглобинд агуулагдах төмөр нийт төмрийн хэдэн хувийг эзлэх вэ?

- A. 72
- B. 73
- C. 55
- D. 79
- E. 70

481. Тураалын II зэрэгтэй хүүхдийн хоолны илчлэг хоногт хэд байх вэ?

- A. 60-50 ккал/кг
- B. 80-65 ккал/кг
- C. 110-130 ккал/кг
- D. 100-95 ккал/кг
- E. 90-85 ккал/кг

482. Тураалын II зэргийн үед жингийн алдагдал ямар байх вэ?

- A. 10-15%
- B. 40-45%
- C. 11-20%
- D. 30-40%
- E. 21-30%

483. Тураалын III зэрэгтэй хүүхдийн хоолны илчлэг хоногт хэд байх вэ?

- A. 80-65 ккал/кг
- B. 60-50 ккал/кг
- C. 90-85 ккал/кг
- D. 110-130 ккал/кг
- E. 100-95 ккал/кг

484. 2 настай хүүхдийн биед агуулагдах нийт төмрийн хэмжээ ямар вэ?

- A. 122 мг

- B. 600 мг
- C. 242 мг
- D. 400 мг
- E. 2600 мг

485. Төмөр дутлын цус багадалтын үед 6 хүртэлх насны хүүхдэд Hb хэмжээ хэдээс доош байх вэ?

- A. 130 г/л
- B. 110 г/л
- C. 100 г/л
- D. 140 г/л
- E. 120 г/л

486. Тураалын I зэрэгтэй хүүхдийн хоолны илчлэг хоногт хэд байх вэ?

- A. 90-85 ккал/кг
- B. 60-50 ккал/кг
- C. 80-65 ккал/кг
- D. 100-95 ккал/кг
- E. 110-130 ккал/кг

487. Хоол хүнсэн дэх төмрийн хэдэн хувь нь шимэгддэг вэ?

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 1
- E. 2

488. Үнээний сүүг хоногт хэдэн литрээс илүү хэрэглэхэд хүүхдэд төмрийн дутагдал үүсч болох вэ?

- A. 2
- B. 0.5
- C. 3
- D. 1
- E. 0.1

489. Рахитын эхлэл үед хүүхдэд өгөх D-аминдэмийн тун ямар байх вэ?

- A. 2000-5000 ME/хоног
- B. 200000-400000 ME/курс
- C. 500-600 ME/хоног
- D. 50-100 ME/кг
- E. 100-200 ME/кг

490. Төмөр дутлын цус багадалтын үед улаан эсийн дундаж эзлэхүүн (MCV) хэдээс доош байх вэ?

- A. 90 фл
- B. 60 фл
- C. 70 фл
- D. 80 фл
- E. 90 фл

491. Төмөр дутлын цус багадалтын үед сийвэнгийн төмрийн хэмжээ хэдээс доош байх вэ?

- A. 34 мкмоль/л

- В. 10 мкмоль/л
- С. 14 мкмоль/л
- Д. 4 мкмоль/л
- Е. 24 мкмоль/л

492. Хүнд тураалтай хүүхдийн хоолонд аль нь илүү тохирох вэ?

- А. Өтгөн зутан
- В. Хөхний сүү
- С. Шингэн бантан
- Д. Үнээний сүү
- Е. Хярам

493. Хүнд тураалтай хүүхдэд хоногт нэмж өгөх магнийн хэмжээ хэд вэ?

- А. 3.0-4.0 ммоль/кг
- В. 7.0-8.0 ммоль/кг
- С. 5.0-6.0 ммоль/кг
- Д. 1.0-2.0 ммоль/кг
- Е. 0.4-0.6 ммоль/кг

494. Төмөр дутлын цус багадалтын үед хүүхдэд өгөх төмрийн хэмжээ ямар байх вэ?

- А. 3-5 мг/кг
- В. 1-2 мг/кг
- С. 0.5-0.8 мг/кг
- Д. 6-8 мг/кг
- Е. 8-10 мг/кг

495. D-аминдэмийн дутагдлын үед ясанд гарах өөрчлөлтийг заана уу?

- 1. Эпифизд ясны сийрэгжилт явагдана
- 2. Метафизд остеоид эд хэт их ургана
- 3. Өсөлтийн зон өргөснө
- 4. Мөгөөрсөн эд хайлна
- 5. Коллагены бүтэц өөрчлөгдөнө
- А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. Бүх хариулт зөв бол
- Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

496. Рахитын ид үед булчингийн тонус суларсныг илтгэх шинжүүдийг заана уу?

- 1. Хөдөлгөөний идэвх сулрах
- 2. Үе мөч нь уян, нугарамхай болох
- 3. Гэдэс цардаих
- 4. Кифоз үүсэх
- 5. Шүд хожуу ургах
- А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- В. Бүх хариулт зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

497. Тураалтай хүүхдэд гарах өөрчлөлтийг заана уу?

1. Халдвар далд бүдэг явцтай
2. Төв мэдрэлийн тогтолцооны сэрэл өөрчлөгдөнө
3. Ходоод-гэдэсний хоосрох үйл хямарна
4. Олдмол рефлекс алдагдана
5. Төрөлхийн рефлекс алдагдана

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

498. Дараахаас аль нь хүүхдийн тураалын шалтгаан болох вэ?

1. Хромосомын гажиг
2. Жирэмсэн эх өлсөх
3. Целиаки өвчин
4. Ургийн хүчилтөрөгчгүйдэл
5. Жирэмсэн эхийн хорт зуршил

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

499. Тураалын III зэрэгт ямар шинж тохирохгүй вэ?

1. Салст бага зэрэг цайвар
2. Жингийн алдагдал 20-30%
3. Чулицкийн индекс 10-15
4. Мэдрэл сэтгэцийн хөгжил насандаа тохирсон
5. Маразмын шинж

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

500. Дараах шалтгаанаас аль нь төмөр алдагдахтай холбоотой вэ?

1. Мелена
2. Гематури
3. Метрорраги
4. Гельминтоз
5. Мальабсорбци

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

501. Дараах шалтгаанаас аль нь хүнсээр авах төмөр дутахтай холбоотой вэ?

1. Нэмэгдэл хоолонд хожуу орох

2. Ургамлын гаралтай хоол удаан хэрэглэх

3. Тэжээвэр хооллолт

4. Үнээний сүү ихээр хэрэглэх

5. Мөнгөн усны архаг хордлого

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

502. Бага насны хүүхэд D-аминдэмийн дутагдалд орох шалтгааныг заана уу?

1. Нар, салхинд бага гаргах

2. Каш, ногоо их өгөх

3. Нэмэлт хоолонд хожуу оруулах

4. Дутуу төрөх

5. Бага жинтэй төрөх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

503. Тураалын I зэргийн үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?

1. Орчиндоо сонирхолгүй

2. Гэрэл асах, дуу чимээ гарахад цочиж сэрэх

3. Чулицкийн индекс 0-10

4. Арьс салст бага зэрэг цайвар

5. Хөхөө хөхөхдөө хөлрөх

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

504. Төмөр дутлын үед гарах өөрчлөлтийг заана уу?

1. Төмрийн тээвэрлэлт хямарна

2. Гемоглобины нийлэгжилт хямарна

3. Метафизд остеоид эд хэт их ургана

4. Улаан эсийн Hb-аар хангагдах явдал хямарна

5. ДНХ-ийн нийлэгжилт хямарна

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

505. Төмөр дутлын цус багадалтын үед мэдрэлийн зүгээс ямар өөрчлөлт илрэх вэ?

1. Чих шуугих

2. Нүд бүртэлзэх

3. Гаж үнэрт дуртай болох
4. Хоолонд дургүй болох
5. Элэг томрох
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

506. Тураалын I зэрэгт аль шинж тохирохгүй вэ?

1. Гэдэс цардгар
2. Амны салт тод ягаан өнгөтэй
3. Арьсан доорх өөхөн эд цээжинд арилсан
4. Биеийн жин 11-20% буурсан
5. Хэвлий орчим арьс үрчийнэ
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

507. Хүнд тураалтай хүүхдэд эмчилгээний эхний өдрүүдээс нэмж өгч болохгүй зүйлийг заан уу?

1. Кали
2. Натри
3. Аминдэм
4. Төмөр
5. Магни
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

508. Тураалын үед хүүхдэд дараахаас аль нь илрэх вэ?

1. Өөхлөг давхарга өөрчлөгдөх
2. Халдварт өртөмхий болох
3. Жин буурах
4. Мэдрэл-сэтгэцийн хөгжил хоцрох
5. Булчингийн хүчдэл сулрах
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

509. Бромгексины олон улсын нэршил

1. Амбrolитик
2. Лизомуцин
3. Ацетицистейн

- 4. Бромгексин гидрохлорид
- 5. Акрихин
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

510. Рахитын өвөрмөц эмчилгээнд аль нь хамаарах вэ?

- 1. Агаарт сайн гаргах
- 2. Массаж хийх
- 3. Кальциар баялаг хоол өгөх
- 4. Холекальциферол өгөх
- 5. Зөв хооллох
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

511. Тураалтай маш сул дорой хүүхдэд тэжээлийн холимгийг ямар аргаар өгөх вэ?

- 1. Дусаагуур
- 2. Халбага
- 3. Тариур
- 4. Угж
- 5. Аяга
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

512. 2 хүртэлх насны хүүхэд уушгины цочмог үрэвслээр эндэх шалтгаан юутай холбоотой вэ?

- 1. Уушгины завсрын эдийн хөгжил сул
- 2. Цусны судсаар баялаг
- 3. Хялгасан судас, тунгалгийн ховил өргөн
- 4. Уян эд бүрэн хөгжөөгүй
- 5. Цулцангийн хөгжил эрчимтэй явагдах
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

513. Рахитаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор D-аминдэмийг ямар тунгаар хэрэглэх вэ?

- 1. 50 мкг/хоног
- 2. 10 мкг/хоног

3. 100 МЕ/хоног
4. 500 МЕ/хоног
5. 100 мкг/хоног
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

514. Кальци, фосфорын солилцоонд D-аминдэмийн аль хэлбэр илүү идэвхтэй нөлөөлөх вэ?

1. 25-гидрохолекальциферол
2. 1.25-дигидрохолекальциферол
3. 1.25-холекальциферол
4. 24,25-дигидрохолекальциферол
5. 25-дигидроксихолекальциферол
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

515. Төмөр дутлын цус багадалтын үед ямар шинж илрэх вэ?

1. Ядрамтгай болох
2. Толгой өвдөх
3. Хэлний хөхлөг арилах
4. Өтгөн хатах
5. Элэг томрох
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

516. Тураалтай хүүхдийг хооллох зарчимд аль нь тохирохгүй вэ?

1. Чихэрлэг хоол өгөх
2. Кали нэмж өгөх
3. Магни нэмж өгөх
4. Натри нэмж өгөх
5. Аминдэм нэмж өгөх
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

517. Рахитын эхлэл үед шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

1. Гипокальциеми
2. Гипофосфатеми
3. Метаболик алкалоз

- 4. Нормокальциеми
- 5. Шүлтлэг фосфатаз буурна
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

518. Тураалын II зэргийн үед ямар шинж тэмдэг илрэхгүй вэ?

- 1. Хөдөлгөөн-сэтгэцийн хөгжил сул
- 2. Хэвлий цардгар
- 3. Өндрийн хоцрогдол 2-4 см
- 4. Маразмын шинж
- 5. Чулицкийн индекс 0-10
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

519. Хөнгөн хэлбэрийн рахитын үед гарах өөрчлөлтийг заана уу

- 1. Дотор эрхтний зүгээс өөрчлөлт илэрнэ
- 2. Мэдрэлийн тогтолцооны зүгээс өөрчлөлт илэрнэ
- 3. Цус багадалт илэрнэ
- 4. Ясанд өөрчлөлт илрэхгүй
- 5. Сэтгэц-хөдөлгөөний хөгжил саатна
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

520. Рахитын ид үед ясанд гарах өөрчлөлтөнд аль нь хамаарах вэ?

- 1. Яс зөөлрөх (остеомалыци)
- 2. Ясны зөөлөн эд ургах (остеоид гиперплази)
- 3. Краниотабес
- 4. Caput quadratum
- 5. Улаан дермографизм
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

521. Квашиоркорын үед арьс, салстанд гарах өөрчлөлтийг заана уу?

- 1. Битотын толбо
- 2. Шалбархай
- 3. Нөсөөтөл ихэссэн
- 4. Шүүдэстэй шархалт
- 5. Сувдан хэлхээ

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

522. Төмөр дутлын цус багадалт ямар хамшинжээр илрэх вэ?

- 1. Хучуур эдийн
- 2. Зүрх судасны
- 3. Мэдрэл сульдлын
- 4. Хоёрдогч дархлаа дутлын
- 5. Булчингийн

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

523. Шуугиант амьсгалтай хатгалгаагүй ханиад шуухинаа ангилсан 23 сартай хүүхдэд өгөх зөвлөгөө

- 1. 30-аас олон хоног ханиалгасан бол онош тодруулахаар эмнэлэгт хэвтүүл
- 2. хоргүй зөөлөн эмээр хоолойн өвдөлт, ханиалгыг эмчил
- 3. гуурс тэлэгч эм өг
- 4. хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлө
- 5. хэрэв сайжрахгүй бол 5 хоноод давтан үзүүл

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

524. D-аминдэмийн хордлогын үед хэрэглэх эм бэлдмэлийг заана уу?

- 1. А-аминдэм
- 2. Фенобарбитал
- 3. Холестирамин
- 4. Преднизолон
- 5. Альмагель

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

525. Төмөр дутлын цус багадалтын үед зүрх-судасны зүгээс ямар шинж илрэх вэ?

- 1. Зүрхний цохилт олширох
- 2. Цусны даралт буурах
- 3. Зүрхний хил томрох
- 4. Ядрамтгай болох
- 5. Элэг томрох

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

526. Тураалын II зэргийн үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?

- 1. Цочромхой
- 2. Хэвлий цардгар
- 3. Дотор эрхтний зүгээс өөрчлөлт гарна
- 4. Чулицкийн индекс 0-10
- 5. Маразмын шинж илэрнэ

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

527. Дараах шалтгаанаас аль нь төмрийн нөөц багатай төрсөнтэй холбоотой вэ?

- 1. Эх нь жил дараалан төрөх
- 2. Дутуу төрөх
- 3. Перинатал үедээ цус алдах
- 4. Архаг халдварт өвчин
- 5. Үнээний сүү ихээр хэрэглэх

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

528. Тураалын урьдчилан сэргийлэлтэнд аль нь хамаарах вэ?

- 1. Халдвараас хамгаалах
- 2. Нэмэгдэл хоолонд цагт нь оруулах
- 3. Жирэмсний хяналтыг сайжруулах
- 4. Суурь өвчнийг цаг тухайд нь эмчлэх
- 5. Хүүхдийг 2 нас хүртэл хөхний сүүгээр хооллох

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. Бүх хариулт зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

529. Хүүхэд тураалд ороход нөлөөлөх гадаад шалтгааныг заана уу?

- 1. Халдвар
- 2. Өлсгөлөн
- 3. Эмийн хордлого
- 4. Анхдагч дархлаа дутал
- 5. Гаж хөгжлүүд

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

530. В12-аминдэм дутагдахад ямар өөрчлөлт гарах вэ

1. Төмрийн тээвэрлэлт хямарна

2. ДНХ-ийн нийлэгжилт хямарна

3. Гемоглобины нийлэгжилт хямарна

4. Улаан эсийн хуваагдал алдагдана

5. Гэдсэнд кальцийн шимэгдэлт алдагдана

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

531. Хүүхдийн тэжээлийн архаг хямрал аль насанд илүү тохиолдох вэ?

1. Нярай үе

2. Бага нас

3. Сургуулийн өмнөх

4. Хөхүүл нас

5. Өсвөр нас

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

532. Хүүхдийн тураалд хүргэх шалтгааныг заана уу?

1. Хүрээлэн байгаа орчны хортой нөлөө

2. Ниман-Пикийн хамшинж

3. Муковисцидоз

4. Галактоземи

5. Төв мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

533. Тураалын эмгэгжамтай холбоотой гарах өөрчлөлтийг заана уу?

1. Уургийн задрал давамгайлна

2. Бодисын солилцооны хүчилшил

3. Эсийн задрал эхэлнэ

4. Гликогены нөөц буурна

5. Улаан эсийн задрал ихэснэ

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

534. Төмөр дутлын цус багадалтын эмчилгээнд аль нь хамаарах вэ?

1. Холекальциферол өгөх
2. 2 валенттай төмөр агуулсан бэлдмэл хэрэглэх
3. Кальциар баялаг хоол өгөх
4. Аскорбины хүчил хамт хэрэглэх
5. B6, B12-аминдэм хамт хэрэглэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

535. Рахитын үед ясны рентген зурагт ямар өөрчлөлт ажиглагдаж болох вэ

1. Остеопороз
2. Метафиз өргөсөх
3. Эпифиз хавтгайрах
4. Яс “ногоон мөчир” хэлбэрээр хугарна
5. “Хуурамч” хугарал үүснэ

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

536. D-аминдэмийн дутагдлын улмаас үүсэн рахитыг ямар эмгэгтэй ялган оношлох вэ?

1. Удамшлын гипофосфатеми
2. Дебре-де-Тони-Фанкони хамшинж
3. Витамин D хамааралтай I хэлбэрийн рахит
4. Фосфат диабет
5. Osteogenesis imperfecta

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

537. Рахит эдгэрэх үед ямар шинж тэмдэг ажиглагдах вэ?

1. Булчингийн тонус хэвийн болно
2. Цусан дахь кальцийн хэмжээ бага байж болно
3. Мэдрэлийн тогтолцооны зүгээс өөрчлөлтгүй болно
4. Анеми илэрч болно
5. Остеомаляцын шинж илэрнэ

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

538. Цочмог явцтай рахит дараах байдлаар илэрнэ

1. Яс зөөлрөх шинжүүд давамгайлна
2. Цусанд фосфорын хэмжээ буурна
3. Мэдрэлийн тогтолцооны зүгээс шинж тэмдэг тод илэрнэ
4. Яс ургах шинжүүд давамгайлна
5. Хордлогын шинж тэмдэг давамгайлж илэрнэ

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

539. Аль нь атопийн дерматитын үрэвслийг намдаах даавар агуулаагүй түрхлэг вэ?

А. Элидел (пимекролимус)

В. Авеено

С. Элоком

Д. Цетафил

Е. Клотримазол

540. 6-12 сартай хүүхдэд цитеризиныг ямар тунгаар өгөх вэ?

А. Хоногт нэг удаа 10 мг

В. Хоногт нэг удаа 5 мг

С. Хоногт нэг удаа 0,5 мг

Д. Хоногт нэг удаа 1,0 мг

Е. Хоногт нэг удаа 2,5 мг

541. Гуурсан хоолойн багтраа өвчний шалтгааныг илрүүлэх шинжилгээг нэрлэ

А. Хамрын салстын шүүрэлд эозинофиль тоолох

В. Өвөрмөц IgE

С. Асуумжийг хянамгай авах

Д. Ерөнхий IgE

Е. Спирографи

542. Атопийн дерматитэд хэрэглэх кортикостероид тосноос хамгийн сул хүчтэй ангилалд орох тосыг нэрлэ:

А. Бетаметазон валерат

В. Триамценолан ацетонид

С. Аклометазон

Д. Метилпреднизолон(адвантан)

Е. Гидрокортизон

543. Хөхүүл насанд ГХБ-ны шалтгаанд юу гол байр эзэлдэг вэ?

А. Хөгц мөөгөнцөр

В. Ургамлын тоос

С. Хоол хүнс

Д. Амьсгалын цочмог халдвар

Е. Гэрийн тоосны хачиг

544. Кларитин нэрээр үйлдвэрлэгддэг антигистамины химийн нэр?

- A. Цитеризин
- B. Дефингидрамин
- C. Лоратадин
- D. Левоцитеризин
- E. Дезлоратадин

545. ГХБ хөдөлсөн үед сальбутамолыг 5 настай хүүхдэд ямар хэмжээгээр өгөх вэ?

- A. 4 мг-аар өдөрт 4 удаа
- B. 3 мг-аар өдөрт 3 удаа
- C. 2 мг-аар өдөрт 3 удаа
- D. 1 мг-аар өдөрт 2 удаа
- E. 4 мг-аар өдөрт 3 удаа

546. Шүүдэст эмзэгшлээс сэргийлэхийн тулд жирэмсний сүүлийн хагаст дараах зүйлийг хэрэглэхгүйг хичээх

- 1. Зөгийн бал
- 2. Шоколад
- 3. Өндөг
- 4. Хоол амтлагч-халуун ногоо
- 5. Амьтны уураг ихээр

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

547. Шүүдэст эмзэгшилтэй хүүхдийн бодисын солилцооны онцлог:

- 1. Ус-давсны солилцоо тогтворгүй
- 2. Ус, натрийг барих хандлагатайгаас хүүхэд хөөнгө, илүү жинтэй байна.
- 3. Өвчний үед шингэн алдах нь хялбархан, жингээ хурдан алддаг.
- 4. Элэгний үйл хямралаас бодисын солилцооны хүчилшил үүсэх хандлагатай
- 5. Цусанд уураг багасах, чихэр, тослог ихсэх, аминдэм болон төмөр зэрэг бичил язгуурын дутагдалд өртөмхий

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

548. Харшлын сорилыг ямар үед тавьж болохгүй вэ?

- 1. Халуурч буй үе
- 2. Харшлын өвчин ид хөдөлсөн үе
- 3. Биеэр түгээмэл тууралттай үе
- 4. Гистамин, лейкотриены эсрэг эм уусан үе
- 5. ДОХ, сүрьеэ

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

549. Дараах эмүүдээс аль нь нойрсуулах нөлөөгүй вэ?

1. Кларотадин
2. Цитеризин
3. Телфаст
4. Левоцитеризин
5. Хлорфенирамин

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

550. Суулгалттай хүүхдийг хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөх вэ?

1. Бие нь муудах
2. Хөлрөх
3. Халуурах
4. Уухдаа муу болох
5. Баас цустай болох

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

551. Шүүдэст эмзэгшлийг сэдээгч нь дараах хоолноос аль нь байж болох вэ?

1. Үнээний сүү
2. Өндөг
3. Гүзээлзгэнэ
4. Шоколад
5. Хиам

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

552. Ужиг ГХБ-ны барих эмчилгээнд хэрэглэгддэг эмийн бүлэг:

1. Ингаляционные кортикостероиды
2. Кромогликат натрия , недокромил натрия
3. Удаан үйлчилгээтэй В2 агонисты
4. Удаашруулсан үйлчилгээтэй теофиллин
5. Лейкотриены хүлээн авуур саатуулагч

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

553. Атопийн дерматитыг сэдээгч хүчин зүйлсийг нэрлэ

1. Хоол хүнс
2. Амьсгалын замаар ордог харшилтөрөгчид
3. Нян
4. Стресс
5. Цаг уурын нөлөө

A. Бүх хариулт зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

554. Хөхүүл хүүхдийн шүүдэст эмзэгшилд өртөх нь:

1. Гистаминаза ферментийн идэвхи сул
2. Ийлдэсний бэхлэх чадвар дорой
3. Карбоксиполипептидаза, моноаминоксидаза, холинэстеразын идэвх буурсан
4. Эдүүд нь гистаминд өндөр мэдрэг
5. Хөөнгө эсээс их хэмжээний гистамин чөлөөлөх чадвартай

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

555. Преднизолон ихээр ууж тарихад гарах гаж нөлөө:

1. Хөөж таргална
2. Нүүр сар хэлбэртэй болох, үсэрхэг болох
3. Яс сийрэгжинэ.
4. Ходоодны шарх үүснэ
5. Батгаших

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

556. ГХБ өвчний үед шуугиант амьсгал үүсэх механизм

1. Гуурсан хоолой өтгөн салсаар бөглөрөх
2. Гуурсан хоолойн гилгэр булчин агчих
3. Гуурсны салст хөөж хавагнах
4. Гуурсан хоолой гаднаасаа дарагдах
5. Гуурсан хоолойд гадны биет орох

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

557. Гуурсан хоолойн багтраа өвчнийг дараах өвчнүүдийн алинаас нь ялган оношилох хэрэгтэй вэ?

1. Сүрьеэ
 2. Уушгинд гаднын биет орох
 3. Гуурсанцрын үрэвсэл
 4. Муковисцидоз
 5. Зүрхний багтраа
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

558. Ветта2–хүлээн авуурт сонгомлоор үйлчилдэг эмүүд:

1. Сальбутамол
 2. Фенотерол
 3. Тербуталин
 4. Адrenalин
 5. Эуфиллин
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

559. Гистамины эсрэг I үеийн эмийн гаж нөлөө

1. Үйлчилгээ богино
 2. Салст хуурайшуулах
 3. Нойр хүргэх
 4. Дасал болох
 5. Шээс багасах
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

560. Дараах зүйлсээс аль нь анафилаксийн шок үүсгэх чадвартай вэ?

1. Пенициллин
 2. Рентген тодосгогч бодис
 3. Инсулин
 4. Новокайн
 5. Урьдчилан сэргийлэх тарилга
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

561. Атопийн дерматитын тууралтын онцлог:

1. Загатнаа ихтэй
2. Нас насанд өөр өөр байрлалтай байх

3. Халдварт өртөмхий
4. Олон дахин сэдэрдэг
5. Гэнэт туурч гэнэт алга болдог
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

562. Гуурсан хоолойн багтрааны эмнэлзүйн гол шинж:

1. Халуурах
2. Бөгшүүлэн ханиах
3. Хяхтнаа амьсгал
4. Шуугиант амьсгал
5. Чээжээр өвдөх
- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

563. ГХБ өвчнийг хүнд хөнгөнөөр нь яаж ангилдаг вэ?

1. Цочмог хөнгөн
2. Ужиг хөнгөн
3. Ужиг хүндэвтэр
4. Ужиг хүнд
5. Cor pulmonium үүссэн
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

564. Архаг В-гастрит үүсэхэд холбогдолгүй шалтгаан

- A. Элэгний вирүст үрэвсэл
- B. Нугалуурын салстад H.p үржих
- C. Дээд гэдэс, ходоодны сөрөг урсгал
- D. Салстын нөхөн төлжилт хямрах
- E. Үрэвслийн эсрэг эм удаан уух

565. Шархлаа өвчний хүндрэлүүдээс аль нь мэс заслын яаралтай эмчилгээ шаардахгүй вэ?

- A. Пенетраци
- B. Шарх цоорох
- C. Перивисцерит
- D. Нугалуурын нарийсалт
- E. Цус алдалт (их)

566. Өсвөр насныханд тохиолдох шархлаа (шарх) хамгийн олонтаа байрлах газар нь:

- A. Дээд гэдэсний булцуу

- B. Ходоодны антрал хэсэг
- C. Ходоодны их махир
- D. Ходоодны бага махир
- E. Булцууны дараах хэсэгт

567. Хэдэн хоног суулгасан бол ужиг суулгалт гэж үнэлэх вэ?

- A. 12 хоног
- B. 14 хоног буюу түүнээс дээш
- C. 10 хоног
- D. 14 хоног хүртэл
- E. 7 хоног

568. Ходоодны эмгэгийг илрүүлэхэд хамгийн үр дүнтэй шинжилгээ:

- A. Ходоод хаймсуурдах хэсэгчилсэн шинжилгээ
- B. Чанд авиан шинжилгээ
- C. Ходоодны доторх рН тодорхойлох
- D. Тодосгогчтой рентген шинжилгээ
- E. Уян дурангийн шинжилгээ

569. Хепатоцитын цитоплазмын сарьс гэмтэхэд ямар фермент ихсэх вэ?

- A. Нуклеаза
- B. Хүчиллэг фосфатаза
- C. Урокиназа
- D. Шүлтлэг фосфатаза
- E. Алат, Асат

570. Аюулхай дор өвдөлттэй үед чанд авианы шинжилгээ, оношилгооны ач холбогдол бага өвчин:

- A. Цочмог панкреатит
- B. Цөсний хүүдийн хөдөлгөөний хямрал
- C. Цөс чулуужих өвчин
- D. Архаг гепатит
- E. Шархлаа өвчин

571. Эссенциал ямар үйлчилгээтэй вэ?

- A. Хепатоцитын сарьс бэхжүүлэх, элэгний эсийг төлжүүлэх
- B. Мезенхимийн урвалыг саатуулах
- C. Цөс хөөх
- D. Аутоиммун урвалыг дарах
- E. Элэгний эсийн тэжээлийг сайжруулах

572. Ходоод-улаан хоолойн сөрөг урсгал, улаан хоолойн архаг үрэвслээр хүндэрсэн үед өвчтөнд хориглохгүй зүйл:

- A. Бүсээ чанга бүслэх
- B. Тонгойж, бөхийх дасгал хийх
- C. Хүнд юм өргөх
- D. Өглөө эрүүл ахуйн гимнастик хийх
- E. Унтахынхаа өмнөхөн хоол идэх

573. Бүдүүн гэдэсний нянгийн хэдэн хувь нь агааргүйтэн бэ?

- A. 0.3
- B. 0.7
- C. 85-89%

D. 0.8

E. 96-99%

574. В төлөвлөгөөгөөр эмчилж буй хүүхэд ууж чадах болмогц ямар шингэнийг ямар тунгаар уулгах вэ?

A. ШСД-ны уусмал 5 мл/кг/цагт тооцож уулгах

B. ШСД-ны уусмал 10 мл/кг-аар цагт тооцож уулгах

C. Буцалсан ус хүссэнээр нь уулгах

D. Мойлны шүүс 5 мл/кг/хоногт тооцож уулгах

E. Физиологийн уусмал 10 мл/кг-д тооцон уулгах

575. Архаг гастрит оношлогдсон анхны жилд хүүхдийг үзлэгт оруулах хугацаа:

A. 6 сард нэг удаа

B. 2 жилд нэг удаа

C. Сар бүр

D. Жилд нэг удаа

E. 3 сард нэг удаа

576. Шархлаа өвчин үүсэхэд эмгэг жамын хамгийн их ач холбогдолтой нь:

A. Салстын тэсвэрлэх чадвар буурах

B. Сэтгэл санааны ачаалал

C. Дисбактериоз

D. Харшлах байдал

E. Хоолны дэглэм алдагдах

577. Ходоод-улаан хоолойн сөрөг урсгалыг багасгах нь

A. Но-шпа

B. Папаверин

C. Анестезин

D. Церукал

E. Атропин

578. Шарх булцуунд байрлаж байгаа үед илрэх өвөрмөц бус шинж:

A. 1.5-2 цагийн дараа дахин өвдөх

B. Гашуун юмаар хэхрэх

C. Өглөөгүүр огиулах

D. Өлөн элгэн дээр өвдөлт их

E. Дотор хорсох

579. Анхдагч гастрит үүсэхэд хамгийн их нөлөөтэй нь:

A. Чихэр их идэх

B. Гэдэсний халдвараар өвчлөх

C. Эрт унтах

D. Хооллолтын хүчин зүйл

E. Эм байнга уух

580. Улаан хоолойн архаг үрэвслийн эмчилгээнд үл хэрэглэх эмчилгээ

A. Метоклопрамид

B. Хоол эмчилгээ

C. Мотилум

D. Хүчлийн эсрэг эм

E. Холиноспазмолитикүүд

581. Ходоодны шүүрэл багасгах нөлөөгүй эм:

- A. Фосфолюгель
- B. Викалин
- C. Гастрофарм
- D. Алмагель
- E. Де-нол

582. Гүш хорхойн байрладаг, өндөглөдөг газар:

- A. Уушги
- B. Дээд гэдэс
- C. Нарийн гэдэс
- D. Цөсний суваг
- E. Бүдүүн гэдэс

583. Гастродуоденитийн үе дэх өвдөлтийн байрлалыг заа

- A. Хүйсний хавьд
- B. Зүүн сүврэгдэс
- C. Баруун сүврэгдэс
- D. Аюулхай дор
- E. Нугалуур, дээд гэдэсний бүсэд

584. Шархлаа өвчний рентген шинжилгээнд шууд илрэх шинж:

- A. Шүүрэл ихсэх
- B. Шарх “Ниша” харагдах
- C. Ходоодноос тодосгогч бодис түргэн гарах, хоосрох
- D. Булцуунд зогсонгиших
- E. Дээд гэдэсний хөдөлгөөн түргэсэх

585. 1-15 хүртэлх насны хүүхдийн үүдэн шүднээс ходоодны амсар хүртэлх хэмжээг олох Н.Гэндэнжамцын томьёо аль нь вэ? * X- 1-15 хүртэлх насны хүүхдийн үүдэн шүднээс ходоодны амсар хүртэлх зай, n- Хүүхдийн насалсан жил

- A. $X=25+(n-1)$
- B. $X=20+(n-1)$
- C. A. $X=15+(n-1)$
- D. $X=22+(n-1)$
- E. $X=18+(n-1)$

586. Шархлаа өвчнийг оношилсон эхний жилд хүүхдийг тогтмол үзэх наад захын хугацаа:

- A. Сар бүр
- B. Үзэх шаардлагагүй
- C. Жилд нэг удаа
- D. Гурван сард нэг удаа
- E. Зургаан сард нэг удаа

587. Гүш хорхой хаана бие гүйцдэг вэ?

- A. Тахир гэдсэнд
- B. Нарийн гэдэс
- C. Цусанд
- D. Элгэнд
- E. Хөрсөнд

588. Ходоод угааж болохгүй заалт

- A. Угаадастай хамт цус гарах
- B. ХБЗ-ын химийн түлэгдэлт
- C. Ухаангүй байдал
- D. Эсрэг заалт байхгүй
- E. Зүрхний шигдээс

589. 6 сар хүртэлх насны хүүхдийн жин хоногт хэдэн грамм нэмэгдэж байвал тураалд орохгүй вэ?

- A. 10.0 г
- B. 15.0 г
- C. 20.0 г
- D. 5.0 г
- E. 25-30.0 г

590. Аль үеийг сурган хүмүүжүүлэгчид хүүхэд хүмүүжүүлэх хамгийн чухал үе гэж үздэг вэ?

- A. Хөхүүл үе
- B. Дунд сургуулийн үе
- C. Сургуулийн насны өмнөх үе
- D. Бага сургуулийн үе
- E. Сургуулийн өмнөх насны урьдал үе

591. Аюулхай орчмын өвдөлттэй холбоогүй өвчин

- A. Архаг гастродуоденит
- B. Бүдүүн гэдэсний архаг үрэвсэл
- C. Архаг гастрит
- D. Нойр булчирхайн үрэвсэл
- E. Цэсний үйл хямрал

592. Эрүүл хүүхдийн арьсны хуниас ямар хугацаанд арилах вэ?

- A. 2 секундын дараа
- B. 3 секундын дараа
- C. 1 минутын дотор
- D. 2 минутын дотор
- E. 1 секунд хүрэхгүй

593. Аль нь маразмын шинж вэ?

- 1. Хаван
- 2. Хөгшин царай
- 3. Өндрийн өсөлт илүү хоцрох
- 4. Элбэг өмдний шинж
- 5. Цус багадалт

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

594. Өмхий биж ямар хоолноос шалтгаалах вэ?

- 1. Үнээний цэвэр сүү
- 2. Ээдэм

3. Мах
4. Өндөг
5. Цөцгий

- A. Бүх хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

595. Зөв өгүүлбэрийг сонго

1. Нярайн ходоодны шүүсний pH-4.0
2. Нярайн ходоодны шүүсний pH-6.8
3. Нэг настай хүүхдэд ходоодны шүүсний pH-2.0
4. Нэг настай хүүхдэд ходоодны шүүсний pH-4.6
5. Хүүхдийн ходоодны шүүс насны хамааралгүй

- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Бүх хариулт зөв бол

596. Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэлд үл тохиолдох хүндрэл:

1. Гэдэснээс цус алдах
2. Гэдэс цоорох
3. Хордлого
4. Бөөр устгах (гидронефроз)
5. Гэдэс нарийсах

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

597. Сметлагийн талаар зөв мэдээллийг сонго

1. Бүрхэх чанараар онцгой сайн
2. Салстын хамгаалалтыг тогтворжуулдаг.
3. Салстын амьдрах хугацааг уртасгадаг.
4. Шингээх чанар маш сайн
5. Протоны шахуургыг хориглоно.

- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

598. Буруу хариултыг ол

1. Хялгасан хорхой хагас жилийн настай.
2. Гүш хорхой тахир гэдсэнд амьдарна.
3. Хялгасан хорхой зүрх хордоох сонгомол хор ялгаруулдаг.
4. Хялгасан хорхойтох өвчний гол шинж хязан, хошного орчим загатнах

5. Хялгасан хорхой мухар олгойн үрэвслийн шалтгаан болж болно.

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

599. ХГЗ-аас цус алдах шалтгаан болдог өвчнийг заа.

1. Цусан суулга

2. Бүдүүн гэдэсний шархлаат өвчин

3. Верльгофийн өвчин

4. Элэгний хатуурал

5. Цөсний үйл хямрал

A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

600. Гүш хорхойг мебендазолоор эмчлэхэд хүнснээс хасах бүтээгдэхүүн

1. Өөхтэй мах

2. Байцаа

3. Вандуй

4. Жимсний шүүс

5. Тараг, сүү

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

601. Бижийн баасны байдалд үл тохирох шинжийг ол.

1. Баах тоо хоногт 8-10 удаа

2. Баас салс, залхаг ихтэй

3. Шингэн их алдалтын шинжтэй

4. Баахад дүлэлт ихтэй

5. Тахир гэдэс тэмтрэгдэнэ

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

602. Зөв хариултыг сонго

1. Гүш хорхой геогельмент

2. Хялгасан хорхой нэг эзэнтэй

3. Гүш хорхой уушгинд нүүдэллэх үед тэнд эозинофилийн нэвчдэс үүсдэг.

4. Гүш хорхой хоёр эзэнтэй

5. Хошногыг дурандаж гүш хорхойг оношилно.

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

- В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Д. Бүх хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

603. Хүүхэд 8 сартай жин 7 кг, усархаг шингэнээр өдөрт 8< удаа суулгасан. Үзэхэд нүд хонхойсон, зулай хонхор, хэл ам хуурай, арьсны хуниас маш удаан арилна. Хэвлий дүүрэнгэ. Онош тогтоохын тулд нэмж ямар шинж шалгах вэ?

1. Баасны өнгийг харна
2. Шингэн уулгаж үзнэ.
3. Баасанд ямар хольц байгааг ажиглана.
4. Орчны харьцааг шалгана.
5. Суганы халууныг хэмжинэ.

- А. Бүх хариулт зөв бол
- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

604. Аль нь бага насны хүүхдийн энгийн бижийн шалтгаан биш вэ?

1. Хэтэрхий их хоол өгөх
2. Гэдэсний савханцар
3. Нэмэгдэл хоолыг гэнэт их өгөх
4. Ротавирусийн халдвар
5. Хүйтэн хоол өгөх

- А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. Бүх хариулт зөв бол

605. Зөв хариултыг сонго

1. Эмэгчин гүш хорхой 15-25 см урт
2. Гүш хорхой нэг жил хүртэл насална.
3. Гүш хорхойтохыг эмчлэхэд мебедазол 0.05 г-аар 1 л удаа уулгана.
4. Хялгасан хорхой хүүхдийн нарийн, бүдүүн гэдэсний дээд хэсэгт амьдарна.
5. Хялгасан хорхой гэдэсний салстад механик үйлчилгээ үзүүлэхгүй.

- А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. Бүх хариулт зөв бол

606. Ямар өвчний үед Моиниханы хэмнэлт өвдөлт гарах вэ?

1. Ходоодны хүчил багассан гастрит
2. Ходоодны хүчил ихэссэн В-гастрит
3. Ходоод-улаан хоолойн сөөргөө
4. Ходоодны шархлаа өвчин
5. Нарийн гэдэсний цочмог үрэвсэл

- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

607. Төмрийн бэлдмэлийн эмчилгээний тун ямар байх вэ?

- A. 0.5-1 мг/кг
- B. 12-15 мг/кг
- C. 2-3 мг/кг
- D. 8-10 мг/кг
- E. 4.5-6 мг/кг

608. Цусархаг эмзэгшлийн үед хэвтрийн дэглэм хэд хоног баримтлах вэ?

- A. 1 сар
- B. 10-14 хоног
- C. 7-10 хоног
- D. 3-5 хоног
- E. 5-7 хоног

609. Төмөр дутлын цус дутагдлын үед дараах эмчилгээнүүдээс аль нь онц шаардлагагүй вэ

- A. Зэсийн бэлдмэл
- B. B12-аминдэм
- C. Төмрийн бэлдмэл
- D. Хоол эмчилгээ
- E. C-аминдэм

610. Ялтас эсийн үйл хямрах үед үүсэх эмнэлзүйн хамгийн түгээмэл илрэл

- A. Цустай шээх
- B. Үенд цус хурах
- C. Салстаас цус алдах,арьсаар цусархаг тууралт гарах
- D. Тархи, уушги, элэгнээс аяндаа цус алдах
- E. Ходоод-гэдэснээс цус алдах

611. Шенлейн-Хенохын өвчинд ямар насны хүүхдүүд илүү өртөмтгий вэ?

- A. 12-15 нас
- B. 2-8 нас
- C. 10-12 нас
- D. 0-1 нас
- E. 8-10 нас

612. Төлжилтгүйдлийн цус багадалт (гипо, апластик)-ын үед эритроцитын амьдрах хугацаа яаж өөрчлөгдөх вэ?

- A. 1.5 дахин уртасна
- B. Бараг 2 дахин багасна
- C. 4 дахин багасна
- D. Бараг 3 дахин богиносно
- E. Өөрчлөгдөхгүй

613. Цусархаг эмзэгшлийн үед преднизолоныг дунджаар ямар тунгаар хэрэглэх вэ?

- A. 20 мг/кг

- В. 1-2 мг/кг
- С. 15 мг/кг
- D. 5-7 мг/кг
- Е. 10-15 мг/кг

614. Шенлейн-Хенохын өвчнөөр өвчилсөн хүүхдийг хэдэн жил диспансерийн хяналтанд байлгах вэ?

- A. 10 жил
- В. 6 сар
- С. 1 жил
- D. 1-3 жил
- Е. 5 жил

615. Хурц явцтай тромбоцитопени хэдэн сар үргэлжилдэг вэ?

- A. 6 сар
- В. 1 жил
- С. 1 сар
- D. 2 жил
- Е. 3 сар

616. Цочмог лейкоз өвчний оношийг батлах гол шинжилгээг заа

- A. Миелограммын шинжилгээ
- В. Дархлалын эсүүдийг тоолох
- С. Цусны биохимийн шинжилгээ
- D. Захын цусанд залуу эс тоолох
- Е. Цитохимийн шинжилгээ

617. Төмөр дутагдлын цус багадалт үүсэх шалтгаан

- 1. Дутуу төрөх
- 2. Эх жирэмсэн үедээ цус багадалттай байх
- 3. Нэмэгдэл хоолонд хожуу оруулах
- 4. Цочмог болон архаг халдварт өвчин
- 5. Шимэгч хорхойтох
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- В. Бүх хариулт зөв бол
- С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

618. Геморрагический васкулит үүсэхэд ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлөх вэ?

- 1. Архаг голомт
- 2. Удамшил
- 3. Харшил
- 4. Цочмог халдвар
- 5. Шимэгч хорхойтох
- A. Бүх хариулт зөв бол
- В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

619. Төлжилтгүй цус багадалтын үед миелограммд

1. Залуу эс ихсэхгүй
 2. Мөхлөгт эс эрс буурах
 3. Бие гүйцсэн саармаг эс багасах
 4. Эритро-нормобласт багасах
 5. Мегакариоцит тодорхойлогдохгүй
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

620. Шенлейн-Хенохын өвчний үед тууралтын байрлал ямар онцлогтой вэ?

1. Гар, хөлийн гадна талд гарна
 2. Гар хөлөөр гарсан тууралт 2 талдаа ижил
 3. Тууралт дарахад арилахгүй
 4. Тууралт дарахад арилна
 5. Тууралт бүх биеэр гарна
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

621. Геморрагический васкулитыг ямар зарчмаар ангилдаг вэ?

1. 1. Үе шат
 2. 2. Идэвхжил
 3. 3. Эмнэлзүйн хэлбэр
 4. 4. Явц
 5. 5. Хүндрэл
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

622. Төмөр дутагдлын цус багадалтын үед доорх шинжүүдээс аль нь ажиглагдахгүй вэ?

1. Арьс салст цайх
 2. Гаж үнэрт дуртай болох
 3. Хумс өөрчлөгдөх
 4. Цусархаг хамшинж гарах
 5. Хэл амны салт шархлах
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

623. Хамраас цус алдсан үед үзүүлэх яаралтай тусламж

1. Толгой гэдийлгэж хамарт хүйтэн жин тавих

2. Цус тогтоох уусмалаар норгосон чихээс хийх
3. Судасны нэвтрэмж багасгах эм хэрэглэх
4. Цус тогтонгшил сайжруулах эм хэрэглэх
5. Дааврын бэлдмэл хэрэглэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

624. Микроцитар цус багадалт ямар үед болох вэ?

1. Төмөр дутагдлын цус багадалт

2. Зэс дутагдлын цус багадалт

3. Хар тугалгын хордлого

4. Талассеми

5. Фолийн хүчил дутагдлын цус багадалт

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

625. Төлжилгүйдлийн цус багадлын үед ямар эмчилгээ хийх вэ?

1. Цус сэлбэх

2. Циклоспорин А

3. Даавар эмчилгээ

4. Ясны чөмөг шилжүүлэн суулгах

5. Ялтас эсийн цул сэлбэх

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

626. Гемофилийн эмнэлзүйн гол шинж тэмдэг юу вэ?

1. Үенд цус хурах

2. Булчинд цус хурах

3. Арьсан дор цус хурах

4. Булчин завсар цус хурах

5. Арьсаар тэгш хэмтэй тууралт гарах

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

627. Мегалобласт цус багадалт ямар үед болох вэ?

1. Төмөр дутагдлын цус багадалт

2. В12 дутагдлын цус багадалт

3. Хар тугалгын хордлого

4. Фолийн хүчил дутагдлын цус багадалт

5. Зэс дутагдлын цус багадалт

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

628. Төлжилтгүй цус багадалтын үед

1. Зөвхөн улаан эсийн үүсэх үйл ажиллагаа дарангуйлагдах

2. Зөвхөн цагаан эсийн үүсэх үйл ажиллагаа дарангуйлагдах

3. Зөвхөн ялтсан эсийн үүсэх үйл ажиллагаа дарангуйлагдана

4. Цус төлжүүлэх ясны хэмийн үйл ажиллагаа бүрэн дарангуйлагдах

5. Цус төлжүүлэх ясны хэмийн үйл ажиллагаа ихсэх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

629. Лимфогрануломатозын онош, эмчилгээг тогтоох хамгийн чухал шинжилгээ

1. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ

2. Рентген шинжилгээ

3. Эхо

4. Гистологийн шинжилгээ

5. КТГ

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

630. Тромбоцит багаслын олдмол хэлбэрийн гол шалтгааныг заана уу?

1. Цочмог халдварт өвчнүүд

2. Урьдчилан сэргийлэх тарилгууд

3. Эмэнд харшилтай байх

4. Хэт цадах

5. Хэт өлсөх

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

631. Нейтропени болсон үед эмнэлзүйн ямар шинж тэмдэг давамгайлах вэ?

1. Халуурч, тунгалгийн булчирхай томрох

2. Амны хөндий шархалж үрэвсэх

3. Амьсгалын замын өвчнөөр өвдөх нь ихсэх

4. Халуурахгүй, тунгалгийн булчирхай томрох

5. Хааяа үе мөч, ясаар өвдөх
A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

632. Нейтрофилёз нь ямар өвчний үед ажиглагдах вэ?

1. Цочмог үрэвсэл
2. Миелолейкоз
3. Ревматоид артрит
4. Хэрэх өвчин
5. Цочмог стресс
A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

633. Гемофилийн үед хийгдэх хамгийн чухал шинжилгээ юу вэ?

1. Эхо
2. Рентген
3. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
4. Факторын шинжилгээ
5. КТГ
A. Бүх хариулт зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

634. Гемофили А, С үед хэддүгээр факторын дутагдал үүсэх вэ?

1. XII
2. VIII
3. X
4. XI
5. IX
A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. Бүх хариулт зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

635. Гемартрозын шинж тэмдгийг заана уу?

1. Үе томрох
2. Үеэр өвдөх
3. Албадмал байрлалд орох
4. Үений хөдөлгөөн чөлөөтэй байх
5. Үенд үлдэцгүй эдгэрэх
A. Бүх хариулт зөв бол

- В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

636. Төмрийн бэлдмэлийн эмчилгээний хоногийн тун

- 1. 1-2 мг/кг
- 2. 2-3 мг/кг
- 3. 7-9 мг/кг
- 4. 4-6 мг/кг
- 5. 9-10 мг/кг

- А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. Бүх хариулт зөв бол
- Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

637. Орчин үед лейкозын эмчилгээний үр дүн хэдэн хувь хүрч байна вэ?

- 1. 50% хүртэл
- 2. 50-60%
- 3. 65-75%
- 4. 85-95%
- 5. 1

- А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Д. Бүх хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

638. Верльгофын өвчний үеийн тууралтын шинж чанар ямар байх вэ?

- 1. Хэмжээгээр янз бүр
- 2. Дарахад арилахгүй
- 3. Өнгө нь янз бүр
- 4. Бүх биеэр тууралт гарна
- 5. Ихэвчлэн хөлийн шилбээр гарна
- А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. Бүх хариулт зөв бол

639. Лейкоз, хавдрын үед ямар эм хэрэглэхэд онош тогтооход бэрхшээлтэй болдог вэ?

- 1. Антибиотик
- 2. Цус тогтоох эмчилгээ эмчилгээ
- 3. Шинж тэмдгийн эмчилгээ
- 4. Даавар эмчилгээ
- 5. Дархлаа дарангуйлах
- А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

640. Төлжилтгүй цус багадалтын эмнэлзүйн гол шинж тэмдэг

1. Цус багадалт

2. Халууралт

3. Цусархаг хамшинж

4. Элэг дэлүү томрох

5. Тунгалгийн булчирхай томрох

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

641. Анхдагчаар тромбоцит цөөрөх нь ямар шалтгаантай байж болох вэ?

1. Изоиммун

2. Тромбоцитын тоо чанарын дутмагшил

3. Трансиммун

4. Халдварт өвчнүүд

5. Харшлын өвчнүүд

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

642. Хүүхдийн суганы халуун 37.5оС бол хэрхэн ангилах вэ?

A. Халууралт

B. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаан бурхан

С. Улаан бурхан

D. Хүнд хүндрэл бүхий улаан бурхан

E. Маш хүнд халууралт өвчин

643. Амны шархлааг юугаар эмчлэх вэ?

A. 0,25%-ийн генцианвиолетын уусмал

B. 2% содын уусмал

С. Буцалсан ус

D. 5% марганцын уусмал

E. Фурациллины уусмал

644. В төлөвлөгөөгөөр хамар ходоодны хаймсуураар шингэн сэлбэхдээ ямар хэмжээгээр хэдэн цагийн турш сэлбэх вэ?

A. Цагт 20 мл/кг 6 цагийн турш

B. Цагт 50 мл/кг 5 цагийн турш

С. Цагт 30 мл/кг 3 цагийн турш

D. Цагт 40 мл/кг 4 цагийн турш

E. Цагт 10 мл/кг 6 цагийн турш

645. Нэмэгдэл хоолыг хэдэн сартайгаас эхэлж өгөх вэ?

A. 4 сартайгаас

- B. 3 сартайгаас
- C. 7 сартайгаас
- D. 6 сартайгаас
- E. 8 сартайгаас

646. Шингэн их алдалттай 10 кг жинтэй хүүхдийг ууж чаддаг болмогц нь 1 цагийн дотор хэдий хэмжээний шингэн уулгах вэ?

- A. 70 мл
- B. 75 мл
- C. 30 мл
- D. 50 мл
- E. 40 мл

647. Цочмог суулгалт гэж юу вэ?

- A. Суулгалт цочмог эхэлж 7 хоногийн дотор намдаж байвал
- B. Суулгалт цочмог эхэлж 21 хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилж байвал
- C. Суулгалт цочмог эхэлж 14 хоногоос дээш хугацаагаар үргэлжилж байвал
- D. Суулгалт цочмог эхэлж 10 хоногийн дотор намдаж байвал
- E. Суулгалт цочмог эхэлж 14 хоногийн дотор намдаж байвал

648. Шингэн их алдалттай 12 сар хүртэлх насны хүүхдэд хураагуур судсаар дараагийн 5 цагийн дотор хэдий хэмжээний шингэн хийх вэ?

- A. 90 мл/кг
- B. 70 мл/кг
- C. 30 мл/кг
- D. 100 мл/кг
- E. 120 мл/кг

649. Хүүхдэд цус багадалт байгаа эсэхийг үнэлэхдээ

- A. Хоёр хөлд хаван шалгана
- B. Хэрэв хүүхэд 6 сар хүрсэн бол бугалганы тойргийг хэмжнэ
- C. Насанд тохирох жинг тодорхойлно
- D. Илт хүнд тураалыг ажиглана
- E. Алганы цайлтыг ажиглана

650. Цусан суулгалтыг ямар эмээр эмчлэх вэ?

- A. Кларитромицин
- B. Ампициллин
- C. Тетрациклин
- D. Амоксациллин
- E. Ципрофлосаци

651. Цээж хонхолзох шинж гэж юу вэ?

- A. Амьсгал авах үед цээжний доод хэсэг дотогш татагдах
- B. Амьсгал авахад цээж нэлэнхүйдээ дотогш татагдах
- C. Амьсгал авахад цээж бүхэлдээ тэлэгдэх
- D. Нярай хүүхдийн цээжний доод хэсэг ялимгүй дотогш татагдах
- E. Хавирга хоорондын завсар татагдах

652. Шарлалттай нярайг хэзээ давтан үзэх вэ?

- A. 2 хоноод
- B. 30 хоноод
- C. 14 хоноод

D. 5 хоноод

E. 1 хоноод

653. Уушгины хатгалгаа, чихний халдвар буюу маш хүнд өвчний үед үүсгэгчийн эсрэг 1-р сонголтын эмийг сонгоно уу?

A. Амоксациллин

B. Тетрациклин

C. Пенициллин

D. Кларитромицин

E. Ампициллин

654. Аль нь уулгадаг вакцин вэ?

A. Сахуу

B. Улаан бурхан

C. Тавт

D. Хөхүүл ханиад

E. Саа

655. Хүнд цус багадалтын шинжийг нэрлэнэ үү ?

A. Насанд тохирсон жин бага

B. Арьс цонхийсон

C. 2 хөл хавантай

D. Алга цайсан

E. Алга хувхай цагаан

656. Нэг настай 10 кг жинтэй суулгаж буй хүүхдэд Б төлөвлөгөөний дагуу 4 цагийн турш хэдий хэмжээний шингэн өгөх вэ?

A. 450-800 мл

B. 800-960 мл

C. 50-100 мл

D. 200-450 мл

E. 100-200 мл

657. Ужиг суулгалт гэж юу вэ?

A. Баасны тоо олшрох

B. Хоногт 3-аас дээш устай суулгах

C. 14 хоногоос удаан суулгах

D. Эмгэг хольцтой баах

E. Баас шингэрч, бөөлжих

658. Шуугиантай амьсгалтай 5 сартай хүүхдэд салбутамолыг ямар тунгаар өгөх вэ?

A. 0.5 мг

B. 2 мг

C. 1 мг

D. 4 мг

E. 3 мг

659. 2 настай, 12 кг хүртэлх жинтэй суулгаж буй хүүхдэд Б төлөвлөгөөний дагуу 4 цагийн турш хэдий хэмжээний шингэн өгөх вэ?

A. 800-960 мл

B. 450-800 мл

C. 100-200 мл E. 100-200 мл

- D. 200-450 мл
- E. 960-1600 мл

660. Шингэн их алдалттай үед судсаар сэлбэх нэн тохиромжтой уусмал аль нь вэ?

- A. 5% -ийн глюкозын уусмал
- B. 10%-ийн NaCl
- C. физиологийн уусмал
- D. Рингер Лактатын уусмал
- E. 10%-ийн глюкозын уусмал

661. Суулгалт өвчний гэрийн зөв эмчилгээ (суулгалт эхэлмэгц)

- A. Ердийн үеийнхтэй ижил хэмжээний шингэн уулгаж, бага багаар хооллоно
- B. Зөвхөн ердийнхөөс илүү шингэн уулгана
- C. Ердийн үеийнхээс илүү шингэн уулгаж, хүүхдийн хоолыг сойлгүй, суулгалтын эсрэг эм уулгана
- D. Ердийн үеийнхээс илүү шингэн уулгаж, хүүхдийн хоолыг сойлгүй, шингэн алдалтын шинжийг ажиглана
- E. Ердийн үеийнхээс илүү шингэн уулгаж, хүүхдийн хоолыг сойж, шингэн алдалтын шинжийг ажиглана

662. Дараах хүнсний бүтээгдэхүүнээс аль нь төмрөөр илүү баялаг вэ?

- A. Өндөгний шар
- B. Төмс
- C. Хүүхдийн будаа
- D. Үхрийн элэг
- E. Лууван

663. Шингэн их алдалттай 11 сартай хүүхдэд хураагуур судсаар 1 цагийн дотор хэдий хэмжээний шингэн хийх вэ?

- A. 20 мл кг/жинд
- B. 40 мл/кг жинд
- C. 30 мл/кг жинд
- D. 50 мл/кг жинд
- E. 70 мл/кг жинд

664. Цус багадалттай хүүхдийг хэд хоноод давтан үзэх вэ?

- A. 10 хоноод
- B. 2 хоноод
- C. 5 хоноод
- D. 30 хоноод
- E. 14 хоноод

665. Шингэн их алдалттай, 15 кг жинтэй, 3 настай хүүхдэд хураагуур судсаар эхний 30 минутанд хэдий хэмжээний шингэн хийх вэ?

- A. 500мл
- B. 450 мл
- C. 550 мл
- D. 400 мл
- E. 300 мл

666. 2 настай хүү, 1 хоног халуурсан, аюултай ерөнхий шинж илрээгүй, ханиалгаагүй, суулгаагүй, улаан бурханы шинж илрээгүй, хүзүү хөшингө байв. Хүүхдийг ХӨЦМ-ийн дагуу ангил

- A. Аюултай ерөнхий шинжгүй халууралт
- B. Халууралт
- C. Аюултай ерөнхий шинж бүхий халууралт
- D. Маш хүнд халууралт өвчин
- E. Хүнд халууралт өвчин

667. Нүдний халдварыг ямар эмээр эмчлэх вэ?

- A. Ung Tetracyclini 5%
- B. Ung Prednizoloni 5%
- C. Ung Tetracyclini 1%
- D. Sol Penicillini 1-2%
- E. Ung Albucidi 20%

668. 6 сартай, 8 кг жинтэй суулгаж буй хүүхдэд Б төлөвлөгөөний дагуу 4 цагийн турш хэдий хэмжээний шингэн өгөх вэ?

- A. 50-100 мл
- B. 800-960 мл
- C. 450-800 мл
- D. 200-450 мл
- E. 100-200 мл

669. Дараахаас аль нь хүнд тураалын шинж вэ?

- A. Алга цайсан
- B. Жин бага
- C. Алга хувхай цагаан
- D. 2 хөл хавантай
- E. артерийн даралт бага

670. Чихний архаг халдварын үед ямар шинж илрэх вэ?

- A. Чихэнд булаг харагдах ба 14 хоноогүй
- B. Биеийн халуун ихэссэн
- C. Чихний ард хавдсан, хөндүүр
- D. Чихэнд булаг харагдах ба 14 хонгоос удаан гоожсон
- E. Чих өвдөнө

671. ХӨЦМ-ээр ямар насны хүүхдийг нярай хүүхэд гэж тооцдог вэ?

- A. 21 хоногтой
- B. 3 сар хүртэлх
- C. 1 сартай
- D. 2 сар хүртэлх
- E. 28 хоногтой

672. Аль нь төмрийн шимэгдэлтийг сайжруулах вэ?

- A. Тараг
- B. Кофе
- C. Жимсний шүүс
- D. Сүү
- E. Цай

673. Шингэн их алдалттай суулгалт В төлөвлөгөөгөөр эмчлэгдэж буй хүүхэд уух чадвартай болмогц ямар хэмжээний шингэнийг цаг тутам уулгах вэ?

- A. 5 мл/кг
- B. 30 мл/кг
- C. 20 мл/кг
- D. 15 мл/кг
- E. 15 мл/кг

674. 3 сартай хүүхэд 1 хоног толгойгоо шөргөөж уйлна. Түүний чихэнд хүрэхэд маш эмзэг, чанга уйлна. Чихний ард хөндүүр биш, хавдаргүй байв. Хэрхэн ангилах вэ?

- A. Маш хүнд өвчин
- B. Хөхлөг ургацгийн үрэвсэл
- C. Чихний цочмог халдвар
- D. Чихний архаг халдвар
- E. Аюултай ерөнхий шинжтэй

675. Чихэнд булагтай, булаг гараад 20 хонож байгаа хүүхдийн өвчнийг ангилж, эмчилгээг тогтоо

- 1. Чихний архаг халдвар
- 2. Кюнолоныг 14 хоног чихэнд дусаах
- 3. Чихийг чихээсээр хуурайшуул
- 4. 5 хоноод давтан үзүүл
- 5. Парацетамолыг өг
- A. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. Бүх хариулт зөв бол
- E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

676. 6 сар хүртэлх эрүүл ба өвчтэй хүүхдийн хооллолтын зөвлөмж?

- 1. Хүүхдийг хүссэн үед нь аль болох олон удаа өдөр шөнөгүй хоногт 8-аас доошгүй хөхүүл
- 2. Хүүхэд цадаж хөхөхөө больтол нь хөхүүл
- 3. Эхний 6 сар дан хөхөөр хоолло
- 4. Өөр хоол буюу шингэн бүү өг
- 5. Шөнө хөхүүлэх шаардлагагүй
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- B. Бүх хариулт зөв бол
- C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

677. Суулгалт өвчин эхэлмэгц

- 1. Суулгалтыг хүндрүүлэх учраас шингэн уулгахаа болих
- 2. Хөхөө олон дахин хөхүүлэх
- 3. Суулгалтын эсрэг эм уулгах
- 4. Гэрээр зөвлөдөг шингэн уулгах
- 5. Хоол сойх
- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. Бүх хариулт зөв бол

С. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

678. Чихэнд булагтай, булаг гараад 10 хонож байгаа хүүхдийн өвчнийг ангилж, эмчилгээг тогтоо

1. Чихний цочмог халдвар

2. Тохирох антибиотикийг 5 хоног өг

3. Чихийг чихээсээр хуурайшуул

4. 5 хоноод давтан үзүүл

5. Парацетамолыг өг

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

679. Аюултай ерөнхий шинжүүдийг сонгоно уу?

1. Уух буюу хөхөх чадваргүй

2. Татах

3. Унтаарсан буюу ухаангүй

4. Хяхатнаж амьсгалах

5. Амьсгал олшрох

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

680. Чихний өвчинг хэрхэн үнэлэх вэ?

1. Чих өвдөж байгаа эсэхийг асууна

2. Чихнээс булаг гарч байгаа эсэхийг асууна

3. Чихний ард хөндүүр, хавдсан эсэхийг тэмтэрч үзнэ

4. Чихнээс хэд хоног булаг гарч байгааг тодруулна

5. Чихний ард хавдсан эсэхийг асууна

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

681. Суулгалтын үеийн гэрийн эмчилгээний зарчмыг хэлнэ үү?

1. Шингэн илүү уулга

2. Үргэлжлүүлэн хоолло

3. Хэзээ эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлө

4. Цайрын бэлдмэл өг

5. Хоолыг тодорхой хугацаагаар сой

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

682. Нярайд ямар шинж илэрвэл нянгийн хэсэг газрын халдвар гэж ангилах вэ?

1. Чээж хүчтэй хонхолзох

2. Хүй улайсан буюу идээ гарсан

3. Ханиалгах, халуурах

4. Арьсан дээгүүр идээт цэврүү гарах

5. Унтаарсан буюу ухаангүй

A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

683. Хүүхэд сүүлийн 3 сард эсвэл одоо улаанбурхантсан бол хэрхэн үнэлэх вэ?

1. Амны шархлааг ажиглана

2. Нүдний эвэрлэг бүдгэрсэн эсэх шалгана

3. Нүднээс нуух гарч байгаа эсэх ажиглана

4. А-аминдэм өгнө

5. Парацетамол өгнө

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. Бүх хариулт зөв бол

684. Дараах шинжүүдээс аль нь хүнд хүндрэл бүхий улаан бурхан гэж ангилах шинж вэ?

1. Аюултай ерөнхий шинжээс аль нэг нь илрэх

2. Эвэрлэг бүдгэрсэн

3. Амны гүнзгий, өргөн шархлаа

4. Нүднээс нуух гоожих

5. Халуурах

A. Бүх хариулт зөв бол

B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

685. Халууралтыг хэрхэн үнэлэх вэ?

1. Нүднээс нуух гарч байгаа эсэхийг ажиглана

2. Түгээмэл тууралтыг ажиглана

3. Нүдний эвэрлэг бүдгэрсэн эсэхийг шалгана

4. Хүзүүний хөшингийг шалгана

5. Амны шархлааг шалгана

A. Бүх хариулт зөв бол

- В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

686. Хөхөө зөв үмхсэний шинжийг нэрлэнэ үү?

- 1. Эрүү хөхөнд хүрсэн
- 2. Амаа том ангайсан
- 3. Доод уруул цорвойсон
- 4. Хөхний нөсөөт хэсэг амны дээр илүү харагдана
- 5. Доод уруул дотогш эргэсэн

А. Бүх хариулт зөв бол

- В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Д. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

687. Халууралт гэж ангилсан бол

- 1. 38.5оС дээш халуунтай бол парацетамол өгнө
- 2. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөнө
- 3. Хэрэв хүүхэд 5 буюу түүнээс олон хоног халуурсан бол онош тодруулахаар эмнэлэгт хэвтүүлнэ
- 4. Халууралт намжихгүй бол 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө
- 5. Халуурсан тохиолдол бүрт халуун бууруулах эм өгнө

А. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Е. Бүх хариулт зөв бол

688. Суулгалттай хүүхдийг хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөх вэ?

- 1. Халуурах
- 2. Уухдаа муу болох
- 3. Баас цустай болох
- 4. Бие нь муудах
- 5. Хөлрөх

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

- В. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- С. Бүх хариулт зөв бол
- Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
- Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

689. 3 настай ханиалгаж байгаа хүүхдийн амьсгал 1 мин-д 48 байв. Түүний амьсгал олширсон уу? Хэрхэн ангилах вэ?

- 1. Амьсгал олшроогүй
- 2. Амьсгал олширсон
- 3. Ханиад шуухинаа
- 4. Уушгины хатгалгаа
- 5. Уушгины хүнд хатгалгаа

А. Бүх хариулт зөв бол

- В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
- С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
- Д. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
- Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

690. Ямар тохиолдолд МАШ ХҮНД ХАЛУУРАЛТ гэж ангилах бэ?

- 1. Хүүхэд амны өргөн гүнзгий шархлаатай
- 2. Хүзүүний хөшингө илэрсэн
- 3. Хүүхдийн халуун 40С хүрсэн
- 4. Унтаарсан байдалтай
- 5. Хүүхэд унаж татдаг

А. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

691. Түгээмэл тууралттай, нүднээс нуух гоожсон хүүхдийн эмчилгээг тогтоо.

- 1. А аминдэм өг
- 2. Тетрациклины тосоор нүдны халдварыг эмчил
- 3. 2 хоноод давтан үзүүл
- 4. Хэрэв татвал яаралтай эргэж ирэх
- 5. Хэрэв халуун буурахгүй бол эргэж ир

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

692. 6-12 сар хүртэлх эрүүл ба өвчтэй хүүхдийн хооллолтын зөвлөмж?

- 1. Хүүхдийг хүссэн үед нь аль болох олон удаа хөхүүл
- 2. Нэг удаад ойролцоогоор 200 мл тохирсон хоолыг бэлтгэж өгөх
- 3. Хүүхэд хөхөөр хооллодог бол 6-8 сартайд 2-3 удаа нэмэлт хоол өгөх
- 4. Хүүхэд хөхөөр хооллодог бол 9-12 сартайд 3-4 удаа нэмэлт хоол өгөх
- 5. Хөхөөр хооллодоггүй бол өдөрт 5 удаа нэмэлт хоол өгөх

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

С. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

Д. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Бүх хариулт зөв бол

693. Хүнд тураал гэж ангилах шинжүүдийг сонгоно уу?

- 1. Илт туранхай
- 2. Хоёр хөлд хавантай
- 3. Бугалганы тойрог <110 мм
- 4. Алга хувхай цагаан
- 5. Насанд тохирох жин бага

А. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

694. Цусан суулгалттай хүүхдийг ямар тохиолдолд эмнэлэгт хэвтүүлэх вэ?

1. 12 сар хүрээгүй

2. Шингэн алдалттай

3. Сүүлийн 3 сард улаанбурханаар өвчилсөн

4. Тэжээвэр

5. Урьд нь суулгалтаар өвчилж байсан

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

695. А төлөвлөгөөгөөр суулгалт бүрийн дараа буюу хооронд хэдий хэмжээний шингэн уулгах вэ?

1. 2 нас хүртэл 100-200 мл

2. 2 нас хүртэл 50-100 мл

3. 2-оос дээш насны хүүхдэд 100-200 мл

4. 2 буюу түүнээс дээш 100-200 мл

5. Хүссэн хэмжээгээр нь өгөх

A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

B. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

D. Бүх хариулт зөв бол

E. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

696. Амьсгал олширсоны босго аль нь вэ?

1. 2 сар хүртэлх нярайд 60 буюу түүнээс олон

2. 2 сараас 12 сар хүртэл 50 буюу түүнээс олон

3. 12 сараас 5 хүртэлх насанд 40 буюу түүнээс олон

4. 2 сараас 12 сар хүртэл 40 буюу түүнээс олон

5. 12 сараас 5 хүртэлх насанд 50 буюу түүнээс олон

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

C. Бүх хариулт зөв бол

D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

697. Шингэн алдалт бүхий суулгалттай хүүхдийг яаж эмчлэх вэ?

1. Б төлөвлөгөөгөөр эмчил

2. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлө

3. Сайжрахгүй бол 5 хоноод давтан үзүүл

4. А төлөвлөгөөгөөр эмчил

5. В төлөвлөгөөгөөр эмчил

A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

B. Бүх хариулт зөв бол

C. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

698. Хэрэв маш хүнд халууралт өвчин гэж ангилсан бол

1. Тохирох антибиотикийн эхний тунг өгнө
2. Цусны чихэр багасахаас сэргийлж эмчилнэ
3. Өндөр халуунтай бол парацетамол өгнө
4. Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хэвтүүлнэ
5. Гэрээр антибиотикоор эмчилнэ

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

699. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаан бурхан гэж ангилсан бол

1. А-аминдэм өгнө
2. Хэрэв нүднээс нуух гоожсон бол тетрациклины тосоор нүдний халдварыг эмчилнэ
3. Хэрэв амны шархлаатай бол генцианвиолетээр эмчилнэ
4. 2 хоноод давтан үзнэ
5. Эхэд хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг зөвлөнө

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

700. Ямар шинжүүдийг үндэслэн чихний цочмог халдвар гэж ангилах вэ?

1. Чихнээс булаг 14 хоногоос удаан гоожсон
2. Чих өвдөх
3. Халуурах
4. Чихэнд булаг харагдах ба булаг гараад 14 хоноогүй
5. Чихний ард хавдсан, хөндүүр

А. Бүх хариулт зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

Е. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

701. ХӨЦМ-ийн дагуу ханиад шуухинаа гэж ангилсан хүүхдэд ямар шинж илэрвэл яаралтай үзүүлэхийг зөвлөх вэ?

1. Уух буюу хөхөхдөө муудах
2. Өвчин хүндрэх
3. Халуурах
4. Амьсгал олшрох
5. Амьсгал саадтай болох

А. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

В. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

С. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

Д. Бүх хариулт зөв бол

Е. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол

702. А төлөвлөгөөний үед эхэд зөвлө

1. Шингэнийг аяганаас бага багаар ойр ойрхон шимүүлж өг
 2. Хүүхэд бөөлжвөл 10 хүлээгээд илүү аажим үргэлжлүүлэн өг
 3. Суулгалт зогсох хүртэл шингэнийг өг
 4. Цайрын бэлдмэл 14 хоног өг
 5. ШСД-ны уусмал 4 цагийн турш өг
- A. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
B. Бүх хариулт зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол

703. Төрөх тасагт буюу 24-48 цагийн дотор хийх вакцин аль нь вэ?

1. Сүрьеэ
 2. Халдварт саа
 3. Хепатит В
 4. Тавт вакцин
 5. Сахуу, хөхүүл ханиад, татран
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

704. Уушгины хатгалгаатай хүүхдийн эмчилгээг тогтооно уу?

1. Тохирох антибиотикийг 3-5 хоног өгөх
 2. Хоргүй зөөлөн эмээр хоолойн өвдөлт ханиалгыг эмчлэх
 3. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөх
 4. 2 хоноод давтан үзүүлэх
 5. Сайжрахгүй бол 2 хоноод давтан үзүүлэх
- A. Бүх хариулт зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
D. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
E. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол

705. 1-2 нас хүртэлх эрүүл ба өвчтэй хүүхдийн хооллолтын зөвлөмж?

1. Хүүхдийг хүссэн үед нь аль болох олон удаа хөхүүл
 2. Нэг удаад 250-300 мл тохирсон хоолыг бэлтгэж өгөх
 3. Гэрийнхний хоолны өтгөн хэсгийг жижиглэж нухаад өгөх
 4. Ногоо жимс өгөх
 5. Өдөрт 3-4 удаа нэмэгдэл хоол, 1-2 удаа зууш өгөх
- A. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
B. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
C. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
D. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол
E. Бүх хариулт зөв бол

706. Хэрэв хүүхдийг хүнд тураал буюу хүнд цус багадалт гэж ангилсан бол дараах арга хэмжээг авна

1. Төмрийн бэлдмэл өндөр тунгаар өгнө
2. Цусны чихэр багасахаас сэргийлж эмчилнэ
3. Бичил тэжээлийн холимог өгнө
4. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ
5. Судсаар тэжээлийн уусмал яаралтай хийнэ

- A. 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол
B. 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол
C. Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол
D. Бүх хариулт зөв бол
E. 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол

707. Уушгины хүнд хатгалгааны үед уушги хөшүүн болох учраас цээж хонхолзоно.

- A. Зөв, Зөв, Зөв
B. Зөв, Зөв, Буруу
C. Буруу, Зөв, Буруу
D. Буруу, Буруу, Буруу
E. Зөв, Буруу, Буруу

708. Уушгины хатгалгааны үед хангалттай хүчилтөрөгч авч чадахгүй учраас хүүхдийн амьсгалын тоо олширно.

- A. Зөв, Буруу, Буруу
B. Буруу, Зөв, Буруу
C. Буруу, Буруу, Буруу
D. Зөв, Зөв, Буруу
E. Зөв, Зөв, Зөв

709. Тайван биш цочромхой, ховдоглон ууж байгаа суулгалттай хүүхдийг шингэн алдалттай гэж ангилах учраас эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.

- A. Буруу, Буруу, Буруу
B. Зөв, Зөв, Зөв
C. Зөв, Буруу, Буруу
D. Буруу, Зөв, Буруу
E. Зөв, Зөв, Буруу

710. Нярай хүүхдийн баас цустай гарах нь зөвхөн цусан суулгын шинж учраас гэрт нь эмчилнэ.

- A. Зөв, Зөв, Зөв
B. Зөв, Зөв, Буруу
C. Буруу, Зөв, Буруу
D. Зөв, Буруу, Буруу
E. Буруу, Буруу, Буруу

711. Маш хүнд өвчний үед цусны чихэр багсах учраас эмнэлэгт хэвтүүлэхийн өмнө чихэртэй ус уулгана.

- A. Буруу, Буруу, Буруу
B. Зөв, Буруу, Буруу
C. Зөв, Зөв, Буруу
D. Буруу, Зөв, Буруу

Е. Зөв, Зөв, Зөв

712. Төрөх замаар төрсөн нярай нүдний халдварт өртөх эрсдэлтэй байдаг тул нүдэнд нь тетрациклины нүдний тос хавчуулна.

А. Зөв, Зөв, Буруу

В. Буруу, Зөв, Буруу

С. Буруу, Буруу, Буруу

Д. Зөв, Зөв, Зөв

Е. Зөв, Буруу, Буруу

713. Рахитын үед яс зөөлөрснөөс “сампингийн эрхи”-ийн шинж илэрнэ.

А. Зөв, Зөв, Буруу

В. Буруу, Буруу, Буруу

С. Буруу, Зөв, Буруу

Д. Зөв, Зөв, Зөв

Е. Зөв, Буруу, Буруу

714. Уушгины хатгалгааны үед уушги хөшүүн болох учраас шуугиантай амьсгалтай амьсгал сонсогдоно.

А. Зөв, Буруу, Буруу

В. Зөв, Зөв, Зөв

С. Буруу, Буруу, Буруу

Д. Буруу, Зөв, Буруу

Е. Зөв, Зөв, Буруу

715. Хүнд цус багадалтын үед цусны онкос даралт буурснаас гарын алга хувхай цайна.

А. Буруу, Буруу, Буруу

В. Зөв, Буруу, Буруу

С. Буруу, Зөв, Буруу

Д. Зөв, Зөв, Буруу

Е. Зөв, Зөв, Зөв